



Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.ucn.es

Universidad de Córdoba

España

Sousa, F.; Lorenzo, J.M.; Iglesias, A.; Cantalapiedra, J.; Franco, D.  
Características de la canal de terneros de la Denominación de Origen Protegida  
Mirandesa

Archivos de Zootecnia, vol. 65, núm. 250, junio, 2016, pp. 253-258  
Universidad de Córdoba  
Córdoba, España

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49545852022>

- ▶ [Como citar este artigo](#)
- ▶ [Número completo](#)
- ▶ [Mais artigos](#)
- ▶ [Home da revista no Redalyc](#)

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal  
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

# Características de la canal de terneros de la Denominación de Origen Protegida Mirandesa

Sousa, F.<sup>1</sup>; Lorenzo, J.M.<sup>2@</sup>; Iglesias, A.<sup>3</sup>; Cantalapiedra, J.<sup>4</sup> y Franco, D.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Escola Superior Agrária. Instituto Politécnico de Bragança. Portugal.

<sup>2</sup>Centro Tecnológico de la Carne de Galicia. Ourense. Spain.

<sup>3</sup>Departamento de Anatomía y Producción Animal. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo. Spain.

<sup>4</sup>Farm Counselling Services. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Lugo. Spain.

## RESUMO

### PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Raza autóctona.

Medidas morfométricas.

Despiece de la canal.

Quinto cuarto.

El objetivo de este trabajo fue evaluar las características de la canal de la raza Mirandesa. Para llevar a cabo este estudio, un total de 20 animales de la raza Mirandesa fueron sacrificados a los 315 días. 24 horas tras el sacrificio, se determinó el peso canal y rendimiento canal, se realizaron las medidas morfométricas (longitud de la canal, longitud de la pierna, espesor de la pierna, profundidad interna del pecho y perímetro máximo de la pierna), se calcularon los siguientes índices: índice de compacidad de la canal e índice longitudinal transversal de la pierna y se realizó el despiece de los principales cortes comerciales. Los animales de la raza Mirandesa presentaron un peso vivo de 293,7 kg, un peso canal de 152 kg y un rendimiento canal de 60,5%. En relación a las medidas morfométricas, la raza Mirandesa mostró una longitud de canal de 110 cm, una longitud de pierna de 69 cm y un perímetro de pierna de 89,8 cm. Los valores para el índice de compacidad de la canal y el índice longitudinal transversal de la pierna fueron de 1,4 y 3,7, respectivamente. Con respecto al quinto cuarto, la piel presentó los mayores porcentajes seguida de la cabeza y pies. Finalmente, la composición de las canales de la raza Mirandesa fue: 74,9% de carne, 18,1% de hueso y 7,0% de grasa.

## Carcass characteristic of calves from Protected Designation of Origin Mirandesa breed

### SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the carcass characteristics of Mirandesa breed. To carry out this study, a total of 20 animals of Mirandesa breed were slaughtered at 315 days. After 24 hours of slaughter, carcass weight and dressing percentage were determined, and morphometric measurements (carcass length, leg length, leg width, leg perimeter, chest external depth, chest internal depth and leg maximum perimeter) were performed and the following indexes were calculated: carcass compactness index and hindlimb compactness index and the main commercial cuts were obtained. Animals from Mirandesa breed presented a 293.7 kg live weight, a 152 kg carcass weight and a dressing percentage of 60.5%. Regarding morphometric measurements, animals from Mirandesa breed showed a carcass length of 110 cm, leg length of 69 cm and leg perimeter of 89.8 cm. The values for the carcass compactness index and hindlimb compactness index were 1.4 and 3.7, respectively. Respecting fifth quarter, skin showed the highest percentages following by head and feet. Finally, the percentages of Mirandesa breed's carcass quartering were 74.9% for meat, 18.1% for bone and 7.0% for fat.

### ADDITIONAL KEYWORDS

Autochthonous breed.

Morphometric measurements.

Quartering of the carcass.

Fifth quarter.

### INFORMACIÓN

Cronología del artículo.

Recibido/Received: 02.12.2015

Aceptado/Accepted: 14.03.2016

On-line: 11.06.2016

Correspondencia a los autores/Contact e-mail:

jmlorenzo@ceteeca.net

### INTRODUCCIÓN

En los últimos 15 años el uso de la DOP (Denominación de Origen Protegida) ha constituido el mejor instrumento de conservación de las razas bovinas en peligro de extinción, así como de sus sistemas de producción. En el año 2007, la carne de bovino co-

mercializada bajo el sello de las 9 DOP que existían en Portugal suponía el 2,3% respecto del total producido, pero mientras la producción de carne de bovino a nivel europeo se ha ralentizado desde el año 2011 (FAOSTAT, 2013), la producción de carne con DOP tiene una aceptación mayor porque las preferencias de los consumidores por productos naturales, producidos

bajo sistemas tradicionales y respetuosos con el medio ambiente han crecido (Hermansen, 2003). Además, la calidad de los productos que aporta la raza bovina Mirandesa está contrastada, como en el caso de la *Posta Mirandesa*, un plato muy apreciado dentro de la gastronomía portuguesa, y por el hecho de que dentro del ranking de carne de bovino con DOP en Portugal es la que alcanza los precios más altos para los productores (5,25 €/kg) (Sousa *et al.*, 2012).

En la bibliografía se pueden encontrar numerosos trabajos relacionados con los rendimientos productivos, la calidad de la canal y de la carne de distintas razas autóctonas (Albertí *et al.*, 2001, 2005, 2008; Piedrafita *et al.*, 2003) pero apenas se dispone de información de la raza Mirandesa. Esta raza es originaria del noreste de Portugal (Trás-os-Montes), cerca de la frontera española. En la década de los 80, la raza Mirandesa sufrió un enorme descenso de sus efectivos, siendo clasificada en peligro de extinción en al año 1994. Posteriormente, en el año 1995, se aprobó la Denominación de Origen Protegida de la Carne de Mirandesa, situándose en el año 2007 como la segunda dentro de las carnes portuguesas con DOP, con un volumen del 13% y 254 tn (Sousa y Sánchez, 2009). En aquel momento, la Asociación Profesional de la Raza Mirandesa la constituyan 630 ganaderos y un rebaño de 6000 vacas. Actualmente el sistema de producción se basa en pequeñas explotaciones familiares que emplean sistemas tradicionales basados en la alimentación con leche materna suplementada con pienso, maíz, patatas, silo de maíz y forrajes producidos en la explotación familiar o de pastoreo donde los animales son finalizados con concentrado (2-4 meses). La venta de los terneros se lleva a cabo a edades comprendidas entre 5 y 8 meses cuando los animales son destetados (Fragata y Sousa, 1997).

Hoy en día, la creciente preocupación por encontrar formas de producción sustentables y en equilibrio con el medio ambiente, sumado a la preservación de la cultura tradicional y el patrimonio histórico, han dado sentido para que se tomen las medidas oportunas para que esta raza bovina siga existiendo. Para preservar este patrimonio es necesario profundizar en el estudio de las características que hacen de ella una raza de interés económico. En base a lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de la canal (medidas morfométricas, despiece y composición del quinto cuarto) de terneros machos de raza Mirandesa sacrificados como posible producto distingible mediante una marca de calidad, orientada hacia el turismo y restauración.

## MATERIAL Y MÉTODOS

Se emplearon 20 animales machos enteros de la raza Mirandesa (inscritos en el libro genealógico de la raza Mirandesa) con una edad al sacrificio aproximada de 10 meses y medio. Los animales fueron criados en un sistema de producción extensivo, donde los animales, después del destete, fueron sometidos a un periodo de finalización de 120 días en el puesto Zootécnico de Malhadas, bajo el control de técnicos de la *Denominación de Origen Mirandesa*. Todos los animales fueron pesados empleando una báscula electrónica (TRU TEST)

con capacidad hasta 1 000 kg, precisión de 100 g y un error del 1%, obteniéndose el peso vivo (PV) antes del sacrificio. Durante el periodo de acabado fueron alimentados con heno de pradera *ad libitum*, avena y una mezcla de harinas; la mezcla tenía la siguiente formulación: 70 kg centeno, 440 kg de cebada, 200 kg de maíz, 210 kg de bagazo de soja, 30 kg de melaza y núcleo de 50 kg (vitamina A, D, E, minerales correctivos y aceite de palma hidrogenado). Desde el día anterior al sacrificio los animales estuvieron en ayunas, siendo transportados desde Malhadas (Portugal) a las 8 de la mañana hasta un matadero acreditado en Miranda de Douro (Portugal) situado a 8 kilómetros. Todos los animales fueron sacrificados antes de las 10 de la mañana para minimizar posibles problemas de estrés pre-sacrificio. Se obtuvo el peso de la canal caliente (PCC) a los 45 minutos y el peso canal fría (PCF) después de un periodo de refrigeración de 24 h a 2 °C. A continuación se tomaron las medidas morfométricas en la canal propuestas por De Boer *et al.* (1974) y Carballo *et al.* (2000): longitud de la canal (LC), longitud de la pierna (LP) espesor de la pierna (EP), profundidad interna del pecho (PIP) y perímetro máximo de la pierna (PL). Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se calcularon los siguientes índices (Espejo *et al.*, 2000): índice de compacidad de la canal (ICC) = (PCF/LC) e índice longitudinal transversal de la pierna (ILTP) = (LP/EP). El peso vivo vacío (PVV) fue calculado como: PV día del sacrificio -[Peso reservorios gástricos llenos (kg)- Peso reservorios gástricos vacíos (kg)- Peso intestinos llenos (kg)- Peso intestinos vacíos (kg)]. El rendimiento canal verdadero (RCC) y las perdidas por oreo (PO), expresadas en porcentaje, se calcularon de acuerdo a las siguientes ecuaciones: RCC= (PCF/PV) x 100 y PF= [1- (PCF/PCC)] x 100, respectivamente. Posteriormente, se procedió al despiece de la media canal izquierda, anotándose el peso de cada pieza comercial y calculando el porcentaje que representaba respecto a la canal, agrupándose posteriormente según los tipos de tejidos y categorías de las piezas comerciales. La metodología empleada en el despiece es la descrita por Soares (1959). Para la determinación de la composición tisular, las piezas fueron preparadas de acuerdo con las buenas prácticas comerciales, manteniéndose la cobertura de grasa intermuscular y de tejido conectivo normal. Los huesos fueron limpiados de acuerdo con las prácticas comerciales, manteniendo algunos fascias, eliminando la grasa perirrenal. Todo ello con el objetivo de estimar, en términos porcentuales, la porción de carne, hueso y grasa comerciales que comprende la canal. De acuerdo con la metodología indicada por Carballo *et al.* (2000), en la porción de lomo extraído a las 48 horas *post-mortem* y sobre papel de acetato y con un rotulador de punta fina, se dibujó el perímetro del músculo *L. thoracis* de las costillas 6<sup>a</sup> y 10<sup>a</sup>. Posteriormente, se determinó su superficie con un planímetro digital Koisumi KP-90 Placom, dando los resultados en cm<sup>2</sup>. El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el programa estadístico SPSS (versión 19.0) realizando previamente un análisis de los datos mediante diagrama de cajas para comprobar la existencia de valores anómalos.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La **tabla I** muestra la media, desviación estándar, máximo y mínimo de las características de la canal de machos de la raza Mirandesa. Los valores de peso del

animal vivo y canal fría oscilaron entre 231-393 kg y 116-208 kg, respectivamente. Estos resultados fueron similares a los observados por Aveiro (1998) y Ferreira (1998) para animales de la misma raza sacrificados a los 260 días. Franco *et al.* (2010) también observaron valores similares para terneros de la raza Limiá (301 y 136 kg para los pesos vivo y canal, respectivamente) sacrificados entre 7 y 11 meses y para terneros de la raza Vianesa (273 y 129 kg para los pesos vivo y canal, respectivamente) sacrificados a 9 meses de edad. Sin embargo, estos resultados fueron inferiores a los encontrados por Carballo *et al.* (2004) quienes observaron valores de 323 y 185 kg para el peso vivo y el peso canal, respectivamente, en animales de la raza Rubia Gallega con edades comprendidas entre los 8 y 10 meses de edad. Estas diferencias pueden ser debidas a la diferente aptitud cárnea entre ambas razas y al sistema de acabado. El rendimiento canal en matadero mostró un valor medio del 60,5% con máximos, en algunos casos, superiores al 64%, lo cual es una cifra muy notable. Estos rendimientos canal fueron superiores a los encontrados por Simões *et al.* (2005) en razas Portuguesas de menor tamaño como la Arouquesa (53%), Barrosa (54%), Maronesa (55%) y Mertolenga (56%) sacrificados con un peso vivo de 300 kg; y para razas de mayor formato como la Alentejana (55%), Mirandesa (58%) y la Marinhoa (58%) sacrificados a 400 kg. Para alcanzar rendimientos canal superiores al 60% es necesario, en las razas indicadas, sacrificar a mayor peso vivo, como en el caso de animales de la raza Mirandesa y de Marinhoa sacrificados con 650 kg, que alcanzaron rendimientos canal del 62 y 63%, respectivamente. Los rendimientos canal en el presente trabajo también fueron superiores a los obtenidos por Carballo *et al.* (2004) en Rubia Gallega (57,3%), Arthur *et al.* (1995) para Angus (55,7%), Hereford (56,6%) y Charolesa (55,6%) y por Piedrafita *et al.* (2003) para Asturiana de la Montaña (56,3%), Avileña Negra Ibérica (58,1%), Morucha (57,2%), Retinta (57,5%), Aubrac (59,9%) y Salers (58,5%). Estas diferencias en el rendimiento canal entre razas podrían ser debidas a las diferentes edades de sacrificio a las que fueron sacrificados los animales, sistema de producción y tasas de crecimiento inherentes a cada raza.

Cuando se sacrifica un animal, además de la canal se obtiene un conjunto de productos y vísceras a los que, en el pasado, los productores daban poca importancia, porque habitualmente no se pagaban. Sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado y ha aumentado la necesidad de avanzar en la cadena

de valor para seguir siendo competitivos, por lo que las vísceras y subproductos tienen un valor comercial cada vez más significativo. En la **tabla II** se muestran los valores porcentuales, respecto al peso vivo de los principales subproductos y vísceras de los terneros de raza Mirandesa. La piel es el subproducto de mayor importancia (11,2%), lo que también coincide por ser el de mayor valorización e interés comercial que despierta en el productor. Los valores medios porcentuales de cabeza (4,8%) del presente trabajo fueron muy superiores a los mostrados por Simões *et al.* (2005) en diferentes razas Portuguesas con valores extremos de 2,4% para Alentejana y de 2,8% para Mertolenga. Lo mismo ocurre con el porcentaje de pies (2,9%) superior también en los animales de este trabajo en comparación con los obtenidos por Simões *et al.* (2005) (1,8-2,2%). Cuando se compara el tracto digestivo, suma de estómagos e intestinos, los valores medios obtenidos para la raza Mirandesa (3,6%) fueron inferiores a los descritos por Simões *et al.* (2005) quienes observaron valores entre 4,1% y 5,4% para la raza Arouquesa y Barrosa, respectivamente. Con respecto al porcentaje de vísceras, calculado como la suma de pulmón, corazón, hígado, bazo y riñones, nuestros resultados (4,2%) fueron ligeramente superiores a los observados por Simões *et al.* (2005) para la raza Mirandesa (3,8%). Por último, destacar que las comparaciones deben hacerse con cautela debido a las diferencias de edad lo que genera diferencias alométricas en los diferentes tejidos entre los animales, además de ligeras diferencias metodológicas que pudieran darse.

En la **tabla III** se presentan los valores medios, desviación estándar, máximo y mínimo de las medidas objetivas de la canal. Los valores medios de la longitud oscilaron entre 104 y 120 cm, con un valor medio de 110,1 cm. Estos resultados coinciden con los publicados previamente por Albertí *et al.* (2005) quienes mostraron valores medios de longitud de canal de 109,8 cm en siete razas españolas y por Franco *et al.* (2010) para terneros de la raza Vianesa y Limiá (108,5 cm). Sin embargo, Albertí *et al.* (2008) encontraron valores de longitud de canal ligeramente superiores en animales con un peso canal similar al nuestro: Casina (121,1 cm), Highland (119,1 cm) y Jersey (119,8 cm) y Sánchez *et al.* (2005) para Nelore (126 cm). Respecto a las variables relacionadas con el volumen de la pierna como el perímetro y espesor, también fueron ligeramente superiores en los terneros de este trabajo que en razas Gallegas (Franco *et al.*, 2010).

**Tabla I.** Media, desviación estándar, máximo y mínimo de las características de la canal de machos de la raza Mirandesa (n=20) (Mean, standard deviation, maximum and minimum of carcass characteristics from male Mirandesa breed (n=20).

	Media	SD	MAX	MIN
Edad (días)	312,80	23,30	364,00	280,00
Peso vivo (kg)	293,65	46,98	393,00	231,00
Peso vivo vacío (kg)	250,53	39,94	333,20	200,90
Peso canal caliente(kg)	154,94	28,61	212,10	118,20
Peso canal fría (kg)	151,99	27,80	208,40	116,80
Rendimiento canal verdadero (%)	60,48	1,72	64,10	57,49
Pérdidas por oreo (%)	1,87	0,83	3,55	0,61

**Tabla II.** Media, desviación estándar máximo y mínimo de los componentes del porcentaje del quinto cuarto (respecto al peso vivo vacío) de machos de la raza Mirandesa (n=20) (Mean, standard deviation, maximum and minimum of the percentage of fifth quarter components (relative to live weight empty) from male Mirandesa breed (n=20).

	Media	SD	MAX	MIN
Peso canal fría (kg)	151,99	27,80	208,40	116,80
Piel	11,19	0,53	12,44	9,94
Intestinos*	1,73	0,37	2,36	0,78
Cabeza	4,83	0,16	5,11	4,58
Estómagos*	1,90	0,29	2,26	0,90
Pies	2,90	0,17	3,23	2,60
Hígado	1,45	0,15	1,70	1,14
Pulmón	1,66	0,33	2,28	1,19
Corazón	0,43	0,06	0,54	0,31
Lengua	0,41	0,07	0,54	0,30
Rabo	0,39	0,04	0,50	0,27
Riñón	0,29	0,05	0,40	0,18
Bazo	0,36	0,07	0,49	0,26

\*Intestinos y estómagos sin su contenido.

El índice de compacidad de la canal, que denota la compacidad de la misma y que se muestra como un buen discriminador para los distintos grados de conformación al ser mayor en las mejores categorías, presentó un valor medio de 1,38. Los valores para el índice de compacidad de la canal de los terneros de las razas Limiá y Vianesa fueron cercanos y de media 1,25 y 1,17 respectivamente, para animales de conformación media O. En línea con esto, Carballo *et al.* (2004) observaron que el índice de compacidad de la canal aumentaba a medida que mejoraba la conformación, pasando de 1,38 a 1,95 en terneros de raza Rubia Gallega de conformaciones O y E, respectivamente. Con respecto

al índice longitudinal transverso de la pierna, nuestros valores medios fueron de 3,70 (4,25-3,36), mejores que los mostrados por Franco *et al.* (2010) para terneros de las razas Limiá y Vianesa con valores de 4,31 y 4,51, respectivamente; pero inferiores a los obtenidos por Carballo *et al.* (2004) en terneros de raza Rubia Gallega con valores de 3,11 para terneros de conformación R y O y con valores de 2,67 y 2,77 para conformaciones E y U, respectivamente. Es este sentido, Varela (2002) afirmó que las diferencias en el ILTP son consecuencia lógica de las diferencias en el espesor de la pierna y que pueden ser consecuencia de una mejor conformación de la raza.

Un método indirecto para valorar la calidad de la canal radica en las medidas de área de músculo *Longissimus thoracis* a diferentes niveles (sexta y décima costilla, véase **tabla III**), información que además se puede emplear para determinar el desarrollo de la masa muscular. En nuestro estudio obtuvimos valores medios de 31,3 y 57,5 cm<sup>2</sup> para la sexta y décima costilla, respectivamente. Según los trabajos llevados a cabo por Carballo *et al.* (2004) estas áreas se corresponderían con una categoría comercial O. Estos mismos autores han señalado que el área de la décima costilla ofrecía mejores resultados en términos de clasificación de canales que la sexta costilla. Sin embargo, en nuestro estudio no se pudo comprobar dicha afirmación ya que no dispusimos de la conformación de las canales.

La **tabla IV** muestra los valores medios, desviación estándar, máximo y mínimo de los valores obtenidos del despiece de la media canal izquierda, expresado en porcentaje, así como la composición tisular. La canal es la principal unidad de transacción entre los sectores productivos y comercializador de carne de bovino, por lo que es fundamental conocer su composición y rendimiento de las diferentes partes que la integran para poder así estimar su verdadero valor comercial. La variabilidad de sus componentes físicos y su distinta distribución en la canal da lugar a que las piezas

**Tabla III.** Media, desviación estándar, máximo y mínimo de las medidas morfométricas de la canal de machos de la raza Mirandesa (n=20) (Mean, standard deviation, maximum and minimum of morphometric measurements from male Mirandesa breed (n=20).

	Media	SD	Max	Min
Peso canal fría (kg)	151,99	27,80	208,40	116,80
<b>Medidas morfométricas (cm)</b>				
Longitud canal	110,10	4,45	120,00	104,00
Longitud pierna	69,03	2,21	75,00	66,00
Perímetro pierna	89,78	4,15	97,50	82,00
Profundidad interna pecho	28,65	1,18	31,00	26,00
Espesor pierna	18,70	1,27	21,50	16,00
<b>Índices de la canal</b>				
ICC	1,38	0,20	1,75	1,09
ILPT	3,70	0,19	4,25	3,36
<b>Área del m. <i>Longissimus thoracis</i> (cm<sup>2</sup>)</b>				
6 <sup>a</sup> costilla	31,28	5,16	42,89	22,32
10 <sup>a</sup> costilla	57,49	9,71	79,92	43,93

ICC= Índices compacidad canal.

ILPT= Índice longitudinal transversal de la pierna.

**Tabla IV.** Media, desviación estándar, máximo y mínimo del despiece de la canal (%) de machos de la raza Mirandesa (n=20) (Mean, standard deviation, maximum and minimum of the quartering of the carcass (%) from male Mirandesa breed (n=20).

	Media	SD	Max	Min
Peso canal fría (kg)	151,99	27,80	208,40	116,80
Lomo	7,47	0,55	8,70	6,56
Solomillo	2,24	0,2	2,70	1,82
Cadera	3,89	0,36	4,45	3,04
Tapa	7,06	0,53	8,43	6,29
Babilla	4,12	0,37	4,86	3,53
Contra	5,08	0,37	5,93	4,50
Redondo	1,80	0,21	2,31	1,50
Jarrete	3,66	0,41	5,05	3,24
Espalda	7,84	1,15	12,32	7,01
Aguja+Pescuezo	10,34	0,91	12,17	8,43
Pecho	5,24	0,92	6,58	3,73
Jarrete	3,25	0,38	3,84	2,47
Composición tisular (%)				
Carne	74,85	2,24	78,32	71,39
Hueso	18,12	0,98	19,81	15,65
Grasa	7,03	1,75	9,33	4,12
Carne/hueso	4,15	0,33	5,00	3,70

que se obtienen de ella presenten distintas aptitudes culinarias, lo que se traduce en un precio comercial diferenciado. Los valores medios obtenidos del despiece de las canales de la raza Mirandesa fueron de 74,9% para carne, 18,1% para hueso y 7,0% para grasa. Esta proporción de carne se encuentra en la parte superior del intervalo de valores (70-76%) observado por otros autores (Piedrafita *et al.*, 2003; Albertí *et al.*, 2008; Franco *et al.*, 2010) para razas autóctonas españolas (Cacheña, Caldelá, Limiá, Vianesa, Asturiana de los Valles, Morucha, Pirenaica y Retinta). Para terneros de la raza Rubia Gallega de conformación alta (U y E) se llegan a rendimientos de carne de 78,4% y 80,5%, respectivamente; mientras que conformaciones inferiores (R y O) no superan el 75% (Carballo *et al.*, 2004). Sin embargo, Simões y Mendes (2003) obtuvieron porcentajes de carne en la canal del 67,8% para la raza Mirandesa. Con respecto a los porcentajes de hueso y grasa, nuestros valores medios están dentro del intervalo encontrado por Albertí *et al.* (2001) quienes obtuvieron porcentajes de 16-19% y 7-10% para hueso y de grasa, respectivamente. Por el contrario, Simões y Mendes (2003) encontraron porcentajes ligeramente inferiores de hueso (15,4-17,4%) y del doble para la grasa (13,1-16,0%) en la raza Mirandesa.

Por otro lado, el cuarto trasero de la canal que representa aproximadamente 2/3 de la carne vendible, y es donde se encuentran las piezas de mayor valor comercial, tanto de categoría extra (lomo y solomillo) como piezas de primera (cadera, tapa, babilla, contra y redondo), representaron un 9,7% y 21,9% del peso de la canal, respectivamente. Respecto a las piezas de segunda (espalda, aguja y pescuezo) y las piezas de tercera (jarretes delantero y trasero y el pecho), se obtuvieron porcentajes respecto de la canal del 18,2% y

12,2%, respectivamente. Por último, la relación carne/hueso fue similar a la mostrada por terneros de raza Rubia Gallega de conformación R (4,09) (Carballo *et al.*, 2004), superior a la mostrada por razas autóctonas Gallegas (Franco *et al.*, 2010) con valores no superiores a 3,21 e inferior a la presentada por terneros de raza Rubia Gallega de conformación alta (U y E con valores de 4,97 y 5,43, respectivamente) (Carballo *et al.*, 2004).

## CONCLUSIONES

No existen demasiados datos en la bibliografía relativos a la calidad de canal de la raza Mirandesa, siendo esta una de las razas autóctonas de Portugal de mayor formato junto con la Alentejana y Marinhoa, por lo que los resultados que aquí se presentan sirven para caracterizar mejor esta raza. A la luz de los mismos, podemos concluir que estamos ante una raza que presenta unos notables rendimiento canal en algunos individuos con valores superiores al 64%, teniendo en cuenta la rusticidad de la raza y los pesos de sacrificio a los que se consigue dicho rendimiento. Asimismo, el despiece nos permitió comprobar que estamos ante una raza que proporciona terneros con un alto porcentaje de carne (valores próximos al 75%) lo cual es de sumo interés para la industria a la hora de fomentar esta raza, y con relaciones carne/hueso equivalentes a las mostradas en terneros de razas de aptitud cárnea como la Rubia Gallega.

## BIBLIOGRAFÍA

- Albertí, P.; Lahoz, F.; Tena, R.; Jaime, S.; Sañudo, C.; Olleta, J.L.; Campo, M.M.; Pinea, B. y Pardos, J.J. 2001. Producción y rendimiento carnícola de siete razas bovinas españolas faenadas a distintos pesos.

- Dirección General de Tecnología Agraria. Zaragoza. *Informaciones Técnicas*, 101: 1-16.
- Albertí, P.; Panea, B.; Sañudo, C.; Olleta, J. L.; Ripoll, G.; Ertbjerg, P. and Williams, J.L. 2008. Live weight, body size and carcass characteristics of young bulls of fifteen European breeds. *Livest Sci*, 114: 19-30.
- Albertí, P.; Ripoll, G.; Goyache, F.; Lahoz, F.; Olleta, J.L.; Panea, B. and Sañudo, C. 2005. Carcass characterisation of seven Spanish beefbreeds slaughtered at two commercial weights. *Meat Sci*, 71: 514-521.
- Arthur, P.D.; Hearnshaw, H.; Jonhston, D. and Stephenson, P.D. 1995. Evaluation of Angus, Charolais and Hereford as terminal sire breeds on Hereford and first-cross cows. II.- Carcasses characteristics and retail yield of progeny. *Aust J Agric Res*, 46: 1245-1258.
- Aveiro, D.M.M. 1998. Os bovinos de raça Mirandesa, avaliação dos resultados dos testes de performance em bezerros nos anos de 1997/1998. *Curso de Produção Animal*. Instituto Politécnico de Bragança.
- Carballo, J.A.; Monserrat, L. y Sánchez, L. 2000. Composición de la canal bovina. En: Cañeque, V. y Sañudo, C. (Eds.) *Metodología para el estudio de la calidad de la canal y de la carne en rumiantes*. Instituto Nacional Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid. Monografía INIA: Serie Ganadera, 1: 107-123.
- Carballo, J.A.; Oliete, B.; Moreno, T.; Sánchez, L. y Monserrat, L. 2004. Categorización de las canales de ternero producidas en Galicia. *Arch Zootec*, 53: 119-128.
- De Boer, H.; Dumont, B.L.; Pomeroy, R.W. and Weniger, J.H. 1974. Manual on E.A.P.P. reference methods for the assessment of carcass characteristics in cattle. *Livest Prod Sci*, 1: 151-154.
- Espejo, M.; García, S.; López, M.M.; Izquierdo, M.; Robles, A. y Costela, A. 2000. Morfología de la canal bovina. En: Cañeque, V. y Sañudo, C. (Eds.). *Metodología para el estudio de la calidad de la canal y de la carne*. Instituto Nacional Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid. Monografía INIA: Serie Ganadera, 1: 69-80.
- FAOSTAT. 2013. Agriculture, forestry and fishery statistics. In: Coyette, C. and Schenk, H. (Ed.). Publications Office of the European Union. Luxembourg. 256 pp.
- Ferreira, M.J.M. 1998. Os bovinos de raça Mirandesa: contribuição para o estudo do crescimento entre o nascimento e o desmame – Evolução do peso vivo. Relatório final de estágio do bacharelato em Produção Animal. Escola Superior Agrária de Bragança.
- Fragata A. and Sousa F. 1997. Mirandesa cattle breed: Farm structure, management and marketing. In: J.T. Sorensen (Ed.). *Livestock farmin systems. More than food production*. Wageningen Pers. Wageningen. pp. 212-216.
- Franco, D.; Fernández, M.; Justo, J.R.; Lorenzo, J.M.; González, L.; Rivero, C.J.; Lama, J.; García-Fontán, M.C.; Bispo, E.; Carracedo, S. and Moreno, T. 2010. Meat characterization of four endangered Galician cattle breeds. 56th International Congress of Meat Science and Technology. 15-20 Agosto. Jeju. Korea.
- Hermansen, J. E. 2003. Organic livestock production systems and appropriate development in relation to public expectations. *Livest Prod Sci*, 80: 3-15.
- Piedrafita, J.; Quintanilla, R.; Sañudo, C.; Olleta, J. L.; Campo, M. M. and Panea, B. 2003. Carcass quality of 10 beef cattle breeds of the Southwest of Europe in their typical production system. *Livest Prod Sci*, 82: 1-13.
- Sánchez, L.; Carballo, J. A.; Sánchez, B. y Montserrat, L. 2005. Características de la canal y de la carne de machos procedentes del cruce de Rubia Gallega con Nelore. *Arch Zootec*, 54: 485-489.
- Simões, J. and Mendes, I. 2003. Distribution of tissues in carcasses at the same proportion of total fat in Portuguese cattle breeds. *Anim Res*, 52: 287-298.
- Simões, J.A.; Mira, J.F.F.; Lemos, J.P.C. and Mendes, I.A. 2005. Dressing percentage and its relationship with some components of the fifth quarter in Portuguese cattle breeds. *Livest Prod Sci*, 96: 157-163.
- Soares, I. 1959. Definição anatômica das peças de talho (cortes de Lisboa e do Porto). Junta Nacional dos Produtos Pecuários.
- Sousa, F.; Aguiar, C. and Aveiro, D. 2012. Mirandesa meat PDO: The strategies of family farm systems for their governance. International Farming Systems Association (IFSA). 1-4 July 2012. Aarhus. Denmark.
- Sousa, F. y Sánchez, L. 2009. Mirandesa. Ed. Asociación de los Criadores de Bovinos de Raza Mirandesa. pp. 1-341.
- Varela, A. 2002. Estudio de las variables que afectan a la producción del tipo cebón. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.