



Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Spellenberg, Richard; Rodriguez, Sergio

Números cromosómicos en algunas especies de Astragalus (Fabaceae) y una enmienda a la descripción de *A. zacatecanus* (Rydb.) Barneby.

Acta Botánica Mexicana, núm. 18, junio, 1992, pp. 17-20

Instituto de Ecología, A.C.

Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57401803>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

NUMEROS CROMOSOMICOS EN ALGUNAS ESPECIES DE ASTRAGALUS
(FABACEAE) Y UNA ENMIENDA A LA DESCRIPCION DE
A. ZACATECANUS (RYDB.) BARNEBY

RICHARD SPELLENBERG Y SERGIO RODRIGUEZ T.

Department of Biology
New Mexico State University
Las Cruces, NM 88003-0001, U.S.A.

RESUMEN

Se dan a conocer los números cromosómicos de 18 taxa de *Astragalus* (Fabaceae) del norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Los datos correspondientes a las 12 especies siguientes se revelan por primera vez: CONTEOS PROVENIENTES DE BOTONES FLORALES: ($\varpi = 11$) *A. cyaneus*, *A. eremiticus*, *A. insularis* var. *harwoodii*, *A. proximus*; ($\varpi = 14$) *A. hartwegii*; ($\varpi = 15$) *A. goldmanii*, *A. zacatecanus*; CONTEOS PROVENIENTES DE SEMILLAS: ($2\varpi = 22$) *A. cottamii*, *A. holmgreniorum*, *A. humillimus*, *A. wittmanii*; ($2\varpi = 28$) *A. vaccarum*. Seis conteos confirmar citas anteriores, a mencionar: CONTEOS PROVENIENTES DE BOTONES FLORALES: ($\varpi = 11$) *A. cobrensis* var. *maguirei*, *A. fucatus*, *A. lentiginosus* var. *variabilis*, *A. longissimus*, *A. mollissimus* var. ?; ($\varpi = 15$) *A. diphacus*. Se informa sobre la segunda y tercera colectas y el primer registro para Durango de *A. zacatecanus*, una especie anteriormente conocida solamente del tipo. Se hace una enmienda de la descripción con base en la morfología de las nuevas colectas. Se incluye una discusión sobre la significación de los números cromosómicos observando que en Norteamérica los números cromosómicos más grandes son característicos de ciertos grupos mexicanos de *Astragalus*.

ABSTRACT

Chromosome numbers are reported for 18 taxa of *Astragalus* (Fabaceae) from northern Mexico and the southwestern United States. Twelve are reported for the first time and are as follows: COUNTS FROM BUDS: ($\varpi = 11$) *A. cyaneus*, *A. eremiticus*, *A. insularis* var. *harwoodii*, *A. proximus*; ($\varpi = 14$) *A. hartwegii*; ($\varpi = 15$) *A. goldmanii*, *A. zacatecanus*; COUNTS FROM SEEDS: ($2\varpi = 22$) *A. cottamii*, *A. holmgreniorum*, *A. humillimus*, *A. wittmanii*; ($2\varpi = 28$) *A. vaccarum*. Six confirm earlier reports and are: COUNTS FROM BUDS: ($\varpi = 11$) *A. cobrensis* var. *maguirei*, *A. fucatus*, *A. lentiginosus* var. *variabilis*, *A. longissimus*, *A. mollissimus* var. ?; ($\varpi = 15$) *A. diphacus*. Second and third records for the species, and a new record for Durango, are reported for *A. zacatecanus*, a species formerly known only from the type collection. An emendation of the description is made based on the morphology of the new collections. A brief discussion regarding the significance of the chromosome numbers is presented, noting that higher chromosome numbers are characteristic for certain Mexican groups of *Astragalus*.

Se dan a conocer en este trabajo varios números cromosómicos correspondientes a colectas de *Astragalus* realizadas en el campo. Los cromosomas se observaron por el método de aplastamiento (squash) de botones florales o extremos de raíces en preparaciones elaboradas por métodos convencionales (Spellenberg, 1976). Para los ejemplares de respaldo se señalan los herbarios en que éstos se depositaron (en esta

lista ESAHE = Escuela Superior de Agricultura "Hermanos Escobar", en Ciudad Juárez, Chihuahua). Aquellos conteos que son los primeros para un taxón determinado se marcan con un asterisco (*), a los provenientes de botones florales corresponde la indicación \ddagger , y a los provenientes de extremos de raíces $2\ddagger$. El total comprende conteos de 18 taxa, de los cuales 12 son nuevos registros; todos los números obtenidos para los restantes taxa confirman los conteos publicados anteriormente.

A. cobrensis A. Gray var. *maguirei* Kearney. \ddagger = 11. USA, Arizona, Morse Canyon on W side of Chiricahua Mountains, 6 Apr 1980, Spellenberg and Soreng 5448 (NMC). De 152 células en anafase I tardía o telofase I temprana, 5 tienen vestigios de un puente de anafase I.

*A. *cottamii* Welsh. $2\ddagger$ = 22. USA, New Mexico, San Juan Co., ca. 4 mi. SW of Waterflow, 31 May 1985, Spellenberg and Corral D. 8203 (NMC, NY, RSA).

*A. *cyaneus* A. Gray. \ddagger = 11. USA, New Mexico, Rio Arriba Co., NW of Embudo, 5 May 1978, Spellenberg 4983 (NMC, NY).

A. diphacus S. Wats. \ddagger = 15. México, Durango, 7 mi. S of Súchil. 22 Jul 1990, Spellenberg and González E. 10268 (ESAHE, ID, MEXU, NMC, NY).

*A. *eremiticus* Sheld. \ddagger = 11. USA, New Mexico, Hidalgo Co., Riley Peaks near Virden, 6 Apr 1986, Spellenberg et al. 8401 (NMC, NY).

A. fucatus Barneby. \ddagger = 11. USA, New Mexico, Socorro Co., 13.6 mi N of Magdalena, 8 May 1977, Spellenberg 4653 (NMC).

*A. *goldmanii* M. E. Jones. \ddagger = 15. México, Chihuahua, 27 km W of Parral on road to Guadalupe y Calvo, 12 Jul 1986, Spellenberg 8534 (ESAHE, MEXU, NMC, NY).

*A. *hartwegii* Benth. \ddagger = 14. México, Durango, ca. 60 air km SE of Durango at La Reserva Biosfera "La Michilia", 27 Jul 1990, Spellenberg and González E. 10376 (NMC).

*A. *holmgreniorum* Barneby. $2\ddagger$ = 22. USA, Arizona, 13.5 km airline distance S of St. George, Utah, 25 May 1979, Holmgren, Holmgren and Barneby 9175. El conteo fue obtenido de semillas provenientes del isotipo en NMC.

*A. *humillimus* A. Gray ex Brandeg. $2\ddagger$ = 22. USA, New Mexico, San Juan Co., The Hogback, 10 Aug 1986, Spellenberg and Ward 1986 (COLO, K, NMC, NY).

*A. *insularis* Kell. var. *harwoodii* Munz & McBurney ex Munz. \ddagger = 11. México, Sonora, 29 mi. by road S of Desemboque, S of Puerto Libertad, 22 Mar 1978, Spellenberg 4949 (NMC).

A. lentiginosus Dougl. var. *variabilis* Barneby. \ddagger = 11. USA, California, San Bernardino Co., ca. 1 mi. N of Hinckley, 3 Apr 1986, Strother 1348 (NMC, UC).

A. longissimus (Torr.) Barneby. $\text{2n} = 11$. México, Chihuahua, Mpio. Ocampo, 4 mi. E of Ocampo, 25 Sep 1988, Spellenberg 9748 (NMC, MEXU) (corola azul-púrpura, pálida y ocroleuca, alas dobladas hacia afuera); $2\text{n} = 22$. Chihuahua, Mpio. Gómez Farías, 9 mi. S of Peña Blanca, 3 Aug 1988, Spellenberg et al. 9666 (MEXU, NMC) (corola de color amarillo claro, alas dobladas hacia adentro en forma de cuchara).

A. mollissimus Torr. var. *?. $\text{2n} = 11$. México, Chihuahua 27 km W of Parral on road to Guadalupe y Calvo, 12 Jul 1986, Spellenberg 8535 (NMC). La identidad infraespecífica de esta colecta no ha sido aún determinada. Se han realizado varias visitas al sitio de colecta, pero no se ha encontrado suficiente material en fructificación para hacer la determinación. No se han observado corolas amarillas para esta especie en la localidad indicada.

*A. *proximus* (Rydb.) Woot. & Standl. $\text{2n} = 11$. USA, New Mexico, San Juan Co., 4 mi. NNE of La Plata, 5 Jun 1984, Spellenberg and Ruzzo 7794 (ASU, ID, NMC, NY).

*A. *vaccarum* A. Gray. $2\text{n} = 28$. USA, New Mexico, Hidalgo Co., Las Playas Springs, 10 Oct 1982. Soreng and Spellenberg 2035 (NMC).

*A. *wittmanii* Barneby. $2\text{n} = 22$. USA, New Mexico, Harding Co., 2 mi W of Mills. Spellenberg et al. 5991 (COLO, ISC, NMC, NY).

*A. *zacatecanus* (Rydb.) Barneby. $\text{2n} = 15$. México, Durango, ca. 47 air km SSW of Vicente Guerrero, in Sierra Urica, 26 Jul 1990, Spellenberg and González E. 10354 (MEXU, NMC, NY). Esta colecta, y otra (Durango, mpio. Súchil, San Juan de Michis, rumbo al Cerro "Chihuahuilla", 14 Aug 1984, F. Chávez 53, CIIDIR, NMC, NY) son aparentemente la tercera y segunda, respectivamente, para la especie y representan una extensión de su distribución conocida hacia el norte de unos 120 kilómetros dentro del estado de Durango. La planta se conocía solamente del suroeste de Zacatecas de 1897 (Barneby, 1964). Como es frecuente en las colectas antiguas, el hábitat no se ha registrado en la etiqueta del ejemplar y permaneció desconocido para Barneby al tiempo de su revisión del género. La colecta tipo no tiene frutos maduros, y como era de esperarse, los individuos de esta segunda población difieren ligeramente de los de la primera. Las muestras colectadas por Spellenberg y González E. en Durango provienen de la orilla de un viejo camino maderero en suelo arenoso-arcilloso claro, a una altitud de 2630 m. La población de la orilla del camino se originó aparentemente a partir de plantas que crecían (pero no estaban aún en floración) sobre una ladera descubierta entre pastos perennes amacollados. El bosque, como Barneby lo supuso, era mixto de encino y pino.

En la siguiente ampliación de la descripción de *A. zacatecanus*, las características conocidas por Barneby se indican entre paréntesis. Las plantas de Durango son erectas o fuertemente ascendentes (aparentemente decumbentes); las superficies adaxiales de los folíolos son esparsidamente estrigosas (glabras, pero Barneby (comunicación personal) observó unos pocos tricomas en las superficies adaxiales de los folíolos en el holotipo en NY); cáliz de 5 mm de longitud (6.1-7 mm); corola verdosa-amarillenta (ocroleuca); estandarte de 7 mm de largo y 3.5 mm de ancho (8.3-9 x 3.7-4.5 mm); las alas y la quilla

son también más pequeñas que las descritas por Barneby (1964, p. 167) en aproximadamente la misma proporción. Al momento de colectar las plantas de Durango (Spellenberg and González E. 10354) éstas estaban en floración temprana, pero las vainas (NMC) que quedaron de la temporada anterior eran de 7 mm de diámetro (5-6 mm); la dehiscencia comienza en la base y continúa hacia el ápice en la mitad proximal de la sutura adaxial y el septo (dehiscencia desconocida); a este respecto la dehiscencia de la vaina se parece mucho a la de su congénere *A. strigulosus* Kunth ex H.B.K. Los óvulos varían en número de 10 a 18 (20-24).

Las dos colectas de Durango de *A. zacatecanus*, y muchas otras de *A. strigulosus* que se han hecho desde 1964 en otros lugares en México, indican que *A. zacatecanus* podría ser incluida como parte de la variación de *A. strigulosus*, esta última considerada como una especie más amplia. Tal opinión ha sido expresada por el Sr. Barneby después de haber revisado un duplicado de la colecta de Chávez, en una carta dirigida a Spellenberg (25 enero 1992, depositada con la muestra Chávez 53 en NMC). Aparentemente el grupo necesita una revisión moderna.

Astragalus goldmanii, *A. hartwegii*, y *A. vaccarum* son miembros de *Micranthi* una pequeña sección con cinco especies, según Barneby. Previamente, sólo se conocía el número cromosómico de un miembro de este grupo (*A. clevelandii*) Green, $\texttt{n} = 13$, Spellenberg, 1976). Los números adicionales presentados aquí apoyan la hipótesis de Barneby, quien considera que *A. clevelandii* está relacionada con las especies mexicanas, muchas de las cuales, incluyendo las de la sección *Micranthi*, tienen números cromosómicos de $\texttt{n} = 14$ y 15 (Spellenberg, 1976). Los conteos de $\texttt{n} = 11$ para especies de secciones cuya distribución se ubica principalmente en el oeste de Norteamérica está en concordancia con los patrones citológicos previamente conocidos (Spellenberg, 1976).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Rupert Barneby por su ayuda en la revisión del tipo de *A. zacatecanus* y en la confirmación de la identificación de la especie de la nueva colecta. Extendemos un especial agradecimiento a la Dra. Socorro González Elizondo, quien aportó el transporte y experiencia botánica durante una excursión de varios días a la Reserva de la Biosfera "La Michilla" en Durango. Bradd Shulke, estudiante de New Mexico State University, realizó los conteos para las dos diferentes formas florales de *A. longissimus*.

LITERATURA CITADA

- Barneby, R.C. 1964. Atlas of North American *Astragalus*. Mem. New York Bot. Gard. 13 (2 parts): 1-1188.
Spellenberg, R. 1976. Chromosome numbers and their cytotaxonomic significance for North American *Astragalus* (Fabaceae). Taxon 25: 463-476.