

Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Valiente Banuet, Alfonso; González Medrano, Francisco; Piñero Dalmau, Daniel

La vegetación selvática de la región de Gómez Farias, Tamaulipas, México

Acta Botánica Mexicana, núm. 33, octubre, 1995, pp. 1 - 36

Instituto de Ecología, A.C.

Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57403301>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en [redalyc.org](http://redalyc.org)

LA VEGETACION SELVATICA DE LA REGION DE GOMEZ FARIAS,  
TAMAULIPAS, MEXICO<sup>1</sup>

ALFONSO VALIENTE-BANUET

Centro de Ecología, UNAM  
Ciudad Universitaria  
Apdo. Postal 70-275  
04510 México, D.F.

FRANCISCO GONZALEZ MEDRANO

Departamento de Botánica  
Instituto de Biología, UNAM  
Apdo. Postal 70-233  
04510 México, D.F.

DANIEL PIÑERO DALMAU

Centro de Ecología, UNAM  
Ciudad Universitaria  
Apdo. Postal 70-275  
04510 México, D.F.

RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis descriptivo de la vegetación selvática, acuática y riparia de la región de Gómez Farías, localizada en el sur del estado de Tamaulipas en un complejo fisiográfico de la Sierra Madre Oriental, entre los 100 y 900 metros sobre el nivel del mar.

Los bosques tropicales fueron estudiados por medio de muestreos de campo analizando su estructura y composición florística, mientras que las comunidades acuáticas y riparias fueron caracterizadas solamente con base en esta última.

Se describen seis tipos de vegetación, de los cuales cuatro corresponden a diferentes clases de selvas tropicales. Esta variedad de cubierta vegetal parece estar asociada a la diversidad microambiental producto de la heterogeneidad fisiográfica. En un trabajo previo realizado en la zona de estudio, se señaló la presencia del Bosque Tropical Siempre Verde, sin embargo nuestro estudio indica que esta comunidad se encuentra restringida a sitios protegidos por la fisiografía.

Las diferencias registradas entre los sitios de muestreo, tales como densidad del sotobosque, grado de diversidad, así como patrones de distribución agregada de algunas especies, están asociados a la heterogeneidad microambiental así como al posible efecto perturbador de tormentas y ciclones tropicales comunes en esta parte de México.

Se inventarió un total de 286 especies de angiospermas para la zona de estudio.

<sup>1</sup> La versión original de este trabajo fue presentada por el primer autor como requisito para obtener el título de Biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1984.

## ABSTRACT

In this work a descriptive vegetational analysis of the tropical forests, as well as of aquatic and riparian communities in the Gómez Farías municipality is presented. The study area is located in the southern part of the state of Tamaulipas in a physiographical complex of the Sierra Madre Oriental, between 100 and 900 meters above the sea level.

The tropical forests were described by means of field samplings analyzing their structure and composition, whereas aquatic and riparian communities were characterized considering a floristic composition criterion.

From the six vegetation types encountered in the study site, four corresponded to tropical forests, whose distribution can be associated to the effect of the microenvironmental diversity produced by physiographical heterogeneity. A previous study reported the existence of a Tropical Evergreen Forest for this part of Mexico, but our work indicates that only in areas protected by the physiography, it is possible to find this vegetation variant.

Vegetation differences among sampling sites such as understorey densities, diversity levels and clumped distribution patterns of some species are associated to microenvironmental heterogeneity and possible disturbance effects of tropical storms that are common in this part of Mexico.

A total of 286 species of angiosperms are reported for the zone.

## INTRODUCCION

En el presente trabajo se hace un análisis descriptivo de la vegetación de las porciones inferiores de la región de Gómez Farías, localizada en el sur del estado de Tamaulipas. Se trata de una zona selvática en donde, según Martín (1958), predomina el Bosque Tropical Siempre Verde ("Tropical Evergreen Forest"). Sin embargo, al discutir el límite boreal del Bosque Tropical Siempre Verde en América Continental, Rzedowski (1963) considera que el "Tropical Evergreen Forest" citado por Martín (1958) para la región de Gómez Farías, no corresponde en realidad a tal formación vegetal. El mencionado autor argumenta que la distribución de este tipo de vegetación en la parte nordeste de México es discontinua y está restringida a cañadas y sitios protegidos. Señala además, que existe una mezcla de elementos del Bosque Tropical Deciduo, que los árboles están ramificados al nivel del suelo y que las especies dominantes del bosque, tales como *Brosimum alicastrum* y *Mirandaceltis monoica* no sobrepasan los veinte metros de altura.

En este trabajo se presenta una descripción detallada de la vegetación de la zona selvática de la región de Gómez Farías. Se consideró pertinente realizarla debido a que el trabajo de Martín (1958), por estar enfocado principalmente al estudio de los anfibios y reptiles de la región y no a la cubierta vegetal, resulta limitado. Por otro lado, las contribuciones de Puig (1976, 1989), Puig y Bracho (1987) no incluyeron una descripción de la vegetación de esta zona.

Para la caracterización de los bosques tropicales se emplearon criterios estructurales, fisonómicos y florísticos, mientras que la descripción de las comunidades de ambientes acuáticos y riparios se hizo exclusivamente con base en listados florísticos.

## EL AREA DE ESTUDIO

La región estudiada con una área aproximada de 400 km<sup>2</sup>, abarca gran parte del municipio de Gómez Farías y se encuentra ubicada casi en el límite septentrional de la

zona conocida como la Huasteca en el estado de Tamaulipas ( $23^{\circ}00' - 23^{\circ}10' N$  y  $99^{\circ}05' - 99^{\circ}11' W$ ; Fig. 1). Se trata de una amplia faja de vegetación selvática, establecida en un segmento de la Sierra Madre Oriental, constituido por la Sierra de Guatemala y la Sierra Chiquita. Ocupa una franja altitudinal entre los 100 y 900 m, cubierta por rocas sedimentarias del Cretácico, que producen una topografía cárstica (López, 1972), con suelos superficiales y ricos en materia orgánica (Cuadro 1). En la región existen dos ríos con escurreimientos permanentes, el Sabinas y el Frio. El cuadro 2 presenta la información correspondiente a la precipitación y las temperaturas medias anuales registradas en seis estaciones meteorológicas. Actualmente, la zona estudiada se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera "El Cielo" dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Cuadro 1. Valores de algunas características de los suelos de la región de Gómez Farías, Tamaulipas (tomado de Valiente, 1984).

| CARACTERISTICA                 | INTERVALO DE VALORES ENCONTRADOS |
|--------------------------------|----------------------------------|
| pH                             | 6.5 - 6.7                        |
| Porcentaje de materia orgánica | 10.8 - 51.6                      |
| Porcentaje de nitrógeno total  | 1.1 - 2.3                        |
| Fósforo kg/ha<br>ppm/kg        | 68.2 - 148.2<br>37.1 - 74.1      |
| Potasio meq/100 gr             | 70.8 - 220.5                     |
| Calcio meq/100 gr              | 13.3 - 31.4                      |
| Color en seco                  | 10 YR 2/2 - 5 YR 2.5/2           |
| Textura                        | Migajón arenoso - Migajón limoso |

## MATERIALES Y METODOS

### Muestreos y su localización

Para describir la vegetación selvática se delimitaron tres parcelas de muestreo de  $1200\text{ m}^2$  y uno de  $1600\text{ m}^2$ . La determinación de cada sitio de muestreo se hizo estratificando la zona de estudio con base en un criterio fisiográfico, distinguiendo diferencias geomórficas y tomando en cuenta la exposición de las localidades con respecto a la radiación solar y a los vientos. Cada parcela fue dividida en subunidades de 100, 25 y  $1\text{ m}^2$  en las cuales se inventariaron respectivamente: áboles (individuos mayores de 2 m y con un diámetro a la altura del pecho, D.A.P.  $\geq 3.18\text{ cm}$ ), arbustos (individuos menores de 2 m y D.A.P. inferior a  $3.18\text{ cm}$ ) y herbáceas (individuos de tamaño menor de 0.5 m). De esta manera, el área total de muestreo en cada parcela para los áboles fue su superficie total ( $1200 - 1600\text{ m}^2$ ); para los arbustos fue de  $300\text{ m}^2$  y; para las plantas herbáceas de  $12\text{ m}^2$ . A cada árbol se le midió la altura máxima y la de la primera ramificación, dos diámetros de cobertura y el D.A.P. A los arbustos y a las especies herbáceas se les determinó la elevación y dos diámetros de cobertura.




Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio.

Cuadro 2. Resumen de datos climáticos de seis estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio (tomado de Valiente, 1984).

| ESTACION      | LOCALIZACION               | ALTITUD<br>(m s.n.m.) | TEMP.<br>MEDIA<br>ANUAL<br>(°C) | PRECIPITACION<br>TOTAL ANUAL<br>(mm) | CLIMA            |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Ahuatlulco    | 22°57'21" N<br>99°07'45" O | 100                   | 24.8                            | 1625                                 | A(w")w(e)g       |
| Chamal Nuevo  | 22°49'24" N<br>99°13'57" O | 250                   | 23.9                            | 1297                                 | (A)C(w)wa(e)g    |
| Gómez Farías  | 23°02'01" N<br>99°15'00" O | 400                   | 22.8                            | 1690                                 | (A)C(m)(w")a(e)g |
| Joya de Salas | 23°10'35" N<br>99°11'20" O | 1560                  | 15.9                            | 928.5                                | C(w")b(e)g       |
| La Boquilla   | 22°47'00" N<br>99°12'30" O | 250                   | 23.7                            | 1271                                 | (A)C(w")w)a(e)g  |
| Sabinas       | 23°02'42" N<br>99°07'57" O | 100                   | 25.5                            | 1289                                 | A w"(e)g         |

Un segundo tipo de muestreo, sin delimitación de área, fue usado para describir la vegetación localizada en sitios de difícil acceso y con fuertes pendientes (riscales). En este caso se utilizó el método denominado "Cuadrantes Centrados en un Punto" de Cottam y Curtis (1956). Se hicieron las mismas mediciones que se especifican en los muestreos descritos en la página anterior para los individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos. En el cuadro 3 se resumen las características ambientales de los sitios de muestreo.

#### La dominancia de las especies

Para determinar el grado de dominancia de las especies arbóreas, cada árbol fue asignado a una categoría de altura o estrato como sigue:

- i) Estrato bajo: árboles menores o iguales a 8 m de altura.
- ii) Estrato medio: árboles mayores de 8 m y menores de 18 m.
- iii) Estrato alto: árboles mayores de 18 m de altura.

La dominancia de las especies se determinó para cada estrato reconocido, de acuerdo con el índice de Sarukhán (1968):

$$I.D. = i.d. \times A.B.$$

donde: I.D. = índice de distribución; i.d. = frecuencia (%) de la especie en las diferentes subunidades del muestreo x densidad de la especie y; A.B. = área basal total de la especie en cada estrato.

Cuadro 3. Resumen de las características ambientales de los sitios de muestreo.

| LOCALIZACION  | ALTITUD<br>(m s.n.m.) | PENDIENTE | % DE ROCA |
|---|-----------------------|-----------|-----------|
| I.- 2 km al este de Gómez Farías.<br>Ladera de orientación oeste<br>sobre la Sierra Chiquita  | 500                   | 26°       | 52        |
| II.- 4 km al norte del ejido La Libertad.<br>Ladera de orientación este<br>"Nacimiento del Río Sabinas"                                 | 200                   | 15°       | 43        |
| III.- 3 km al oeste de Gómez Farías.<br>Ladera de orientación este<br>sobre la Sierra de Cucharas                                       | 520                   | 19°       | 81        |
| IV.- 12 km al sur de Gómez Farías.<br>"Bocatoma". Nacimiento del Río Frío.<br>Ladera de orientación este<br>sobre la Sierra de Cucharas | 140                   | 22°       | 50        |
| V.- 1.5 km al este de Gómez Farías.<br>Ladera de orientación suroeste<br>sobre la Sierra Chiquita                                       | 350                   | 35°       | 90        |

Para los arbustos y las plantas herbáceas se usó el "Índice de Valoración de Importancia", el cual se obtiene sumando los valores de cobertura, abundancia y frecuencia en escala porcentual para cada especie (Curtis y McIntosh, 1951).

Cálculo de la diversidad para los diferentes muestreos

Se calcularon los índices de diversidad de Shannon-Wiener ( $H$ ) y de equitabilidad ( $E$ ), según Krebs (1972). El cálculo de  $H$  se hizo de la siguiente manera:

$$H = - \sum_{i=1}^s (p_i) (\ln p_i)$$

donde:  $p_i$  = proporción de la muestra total de la  $i$ ésima especie;  $s$  = número de especies y;  $\ln$  = logaritmo de base e.

La equitabilidad ( $E$ ) se calculó como  $E = H/H_{\max}$

donde:  $H_{\max} = \ln s$

#### Análisis de la distribución espacial de los organismos

Para determinar el patrón de distribución espacial de las especies encontradas en las parcelas de muestreo, cada árbol y arbusto por separado fueron localizados en un croquis a escala 1 cm : 1 m. El método de análisis empleado fue el de Clark y Evans (1954), que se basa en la medición de las distancias entre individuos más cercanos de la misma especie y forma de vida. La media de las distancias que se esperaría si éstos tuvieran una distribución aleatoria, se comparó con la media observada. Con base en ésto se obtuvo una medida de la forma y el grado en que una población se aparta de la aleatoriedad. De tal manera la distancia media observada se calculó:

$$r_o = \sum r / N$$

y la distancia esperada  $r_e = 1 / 2\sqrt{p}$

donde  $r$  es la distancia entre cada individuo y su vecino más cercano para una población de  $N$  individuos que tienen una densidad específica  $p$ . El cociente  $R = r_o/r_e$  se empleó como medida de la desviación con respecto a la aleatoriedad. Por lo tanto, en una distribución aleatoria  $R = 1$ , mientras que bajo condiciones de máxima agregación  $R = 0$ . Cuando se presenta una condición de máximo espaciamiento  $R = 2.149$ . La valoración de significancia se hizo por medio de una prueba de  $C$ , el desvío estándar de la curva normal, el cual se calcula de la siguiente manera:

$$C = (r_o - r_e) / \delta r_e$$

donde  $\delta r_e$  es el error estandar de la distancia media al vecino más cercano en una población distribuida al azar, con la misma densidad que la población observada. En este paso  $r_e$  se calcula de la siguiente forma (Clark y Evans, 1954):

$$r_e = 0.26136 / \sqrt{Np}$$

donde  $N$  es el número de distancias medias y  $p$  la densidad. Los valores de  $C$  de 1.96 y 2.58 representan respectivamente 5% y 1% del nivel de significancia.

#### Vegetación acuática y riparia

La vegetación acuática del nacimiento de los ríos Sabinas y Frío fue caracterizada por medio de una representación diagramática de la distribución de las especies a distintas profundidades. De la vegetación riparia sólo se anotaron las especies censadas.

#### Listado florístico

El listado florístico que se presenta en el apéndice 2 se elaboró con base en el material colectado durante el desarrollo del trabajo (mayo de 1984 a mayo de 1987). Los ejemplares se encuentran depositados en el Herbario Nacional del Instituto de Biología de la UNAM (MEXU).

## RESULTADOS

### Vegetación

El área estudiada comprende un complejo fisiográfico muy heterogéneo con varios tipos de vegetación distribuidos en mosaico. Una síntesis se presenta a continuación siguiendo el sistema de clasificación de la vegetación de Miranda y Hernández, X. (1963), se menciona su equivalencia con el de Rzedowski (1978) y con el empleado por Puig (1976). Para revisar los datos estructurales detallados véase el apéndice 1.

1.- Selva Baja Caducifolia (Fig. 2; muestreo V), Bosque Tropical Caducifolio (Rzedowski, 1978) o Forêt Tropicale Caducifoliée (Puig, 1976). Se encuentra en zonas de fuertes pendientes y alta pedregosidad conocidos comúnmente como riscales. En estos sitios dominan los árboles *Pseudobombax ellipticum*, *Neobuxbaumia euphorbioides* y *Bursera simaruba*, cuyos doselos nunca sobrepasan los 10 metros de altura. Elementos arbustivos como *Agave lophantha* y *Hechtia* sp., y herbáceos como *Syngonium podophyllum* y *Pilea serpyllifolia* son los más conspicuos en el sotobosque. Sin lugar a dudas éste es el tipo de vegetación más xerófilo de los encontrados, el cual alterna con otras comunidades a manera de mosaico y su presencia se asocia con fuertes pendientes, poca cantidad de suelo y exposición a vientos y desecación.

2.- Selva Mediana-Baja Subcaducifolia (Fig. 3; muestreo IV), Bosque Tropical Subcaducifolio-Caducifolio (Rzedowski, 1978), Forêt Tropicale Moyenne Semi-caducifoliée (Puig, 1976). Se le encuentra en los lomeríos de la parte sur del área de estudio en las cercanías de río Frío. Los elementos arbóreos dominantes son *Bursera simaruba*, *Piscidia piscipula*, *Enterolobium cyclocarpum*, *Savia sessiliflora* y *Acacia coulteri*. El sotobosque está constituido principalmente por *Bromelia pinguin* y *Acalypha schiedeana*.

3.- Selva Mediana Subperennifolia (Fig. 4; muestreo I), Bosque Tropical Subcaducifolio (Rzedowski, 1978), Forêt Tropicale Moyenne Subsempervivente (Puig, 1976). Es el tipo de vegetación preponderante en la región. Los elementos arbóreos dominantes son *Bursera simaruba*, *Lysiloma divaricata*, *Savia sessiliflora*, *Drypetes lateriflora*, *Acalypha schiedeana*, *Randia laetevirens* e *Hybanthus mexicanus*. Se presenta un fuerte desarrollo del sotobosque con elementos dominantes como *Drypetes lateriflora*, *Acalypha schiedeana* y *Chamaedorea radicalis*. Otra variante de esta comunidad es la que corresponde al muestreo III, en donde los árboles alcanzan alturas un poco mayores y el estrato superior es más cerrado. Se localiza en zonas parcialmente protegidas dentro de cañadas. Los árboles dominantes son *Brosimum alicastrum* y *Mirandaceltis monoica*. De los elementos del sotobosque importantes se encuentran *Acalypha schiedeana*, *Urera caracasana* y *Syngonium podophyllum*.

4.- Selva Mediana Perennifolia (Fig. 5; muestreo II), Bosque Tropical Subcaducifolio (Rzedowski, 1978) Forêt Tropicale Moyenne Semi-caducifoliée (Puig, 1976). Es el tipo de vegetación más exuberante en la zona estudiada, que por la altura de los árboles de hasta 30 metros es similar a una Selva Alta Perennifolia. Esta variante del bosque se encontró en las cercanías del nacimiento del río Sabinas y en los márgenes del río Frío. El estrato




Fig. 2. Perfil diagramático de la vegetación (Cuadro V). Arboles: Bs = *Bursera simaruba*, Pe = *Pseudobombax ellipticum*, Ne = *Neodouglasbaumia euphorbioides*, Fc = *Ficus cotinifolia*, As = *Acalypha schiediana*, Ce = *Colubrina elliptica*, Fp = *Jatropha curcas*, Pt = *Phoebe tampsicensis*. Arbustos: Jc = *Eugenia fragrans*, Ag = *Agave lophantha*, Cn = *Cnidoscolus multijugos*, Hc = *Hechtia* sp., Lt = *Louteridium tamaulicense*, Bg = *Bonplandia geminiflora*.




Fig. 3. Perfil diagramático de la vegetación (Cuadro IV). Arboles: Bs = *Bursera simaruba*, Ac = *Acacia coulteri*, Pp = *Piscidia piscipula*, Ss = *Savia sessiliflora*, Ce = *Colubrina elliptica*, Pa = *Pisonia aculeata*, Pb = *Phyllostylon brasiliense*, Exc = *Exostema caribaicum*, Jc = *Jatrophia curcas*. Arbustos: Pt = *Pithecellobium*, Sav = *Savia sessiliflora*, Ch = *Chamaedorea radicalis*, Cnid = *Cnidoscolus multioibus*, Mor = *Morisonia americana*, Eyth = *Erythrina herbacea*.




Fig. 4. Perfil diagramático de la vegetación (Cuadro 1). Árboles: Bs = *Bursera simaruba*, Ld = *Lysiloma divaricata*, Ct = *Chlorophora tinctoria*, Ss = *Savia sessiliflora*, D1 = *Drypetes lateriflora*, Rd = *Robinsonella discolor*, C = *Coccoloba* sp., Cm = *Cnidoscolus multiflorus*, As = *Acalypha schiediana*, R1 = *Randia laetevirens*, Hm = *Hybanthus mexicanus*. Arbustos: □ *Drypetes lateriflora*, ▲ *Acalypha schiediana*, ▽ *Hippocratea acapulcensis*, △ *Chamaedorea aff. radicalis*, V *Petrea volubilis*, ✓ *Annona globiflora*, ✕ *Croton niveus*, ♀ *Psychotria erythrocarpa*.




Fig. 5. Perfil diagramático de la vegetación (Cuadro 2). Árboles: Ba = *Brosimum alicastrum*, Ss = *Savia sessiliflora*, Chm = *Chione mexicana*, An = *Achatocarpus nigricans*, As = *Acalypha schiediana*, R1 = *Randia laetevirens*. Arbustos: *Hippocratea acapulcensis*, *Randia laetevirens*, *Eugenia* sp., *Petrea volubilis*, *Petrea volubilis*, *Psychotria erythrocarpa*, *Acalypha schiediana*.

arbóreo se encuentra constituido principalmente por *Brosimum alicastrum*, *Savia sessiliflora* y *Achatocarpus nigricans*; y el sotobosque por *Hippocratea acapulcensis*, *Randia laetevirens*, *Syngonium podophyllum* y *Pseuderanthemum alatum*.

5.- Como vegetación riparia encontramos los llamados Bosques de Galería, cuyos elementos arbóreos característicos son *Taxodium mucronatum* con alturas máximas de 20 metros, así como *Ficus segoviae* e *Inga vera* var. *spuria*.

6.- La vegetación acuática se encuentra principalmente en los recodos y nacimientos de los ríos Frío y Sabinas. Tal como lo muestra la figura 6, las plantas acuáticas no se encuentran más allá de los dos metros de profundidad, siendo la especie más abundante *Nuphar luteum* subsp. *macrophyllum* y las asociadas a cuerpos de agua *Cyperus* aff. *giganteus* y *Xanthosoma robustum*.

A manera de síntesis, la figura 7 presenta el perfil general de la vegetación en la zona de estudio.

#### La estructura vertical de las selvas

La figura 8 muestra los histogramas de frecuencia de alturas para los cinco muestreos realizados. Con base en ellos, es evidente que en los sitios I, IV y V las categorías modales de mayor tamaño se encuentran entre 4 y 8 metros, con pocos individuos mayores de 20 metros y con un marcado desarrollo del sotobosque. En cambio, los muestreos III y II, presentan una mayor frecuencia de elementos arbóreos altos, más parecidos a los de una selva alta perennícola.

#### Indices de diversidad

En todos los muestreos los estratos arbustivo y arbóreos medio y bajo señalan los valores de diversidad más altos (Cuadro 4). Para el estrato arbustivo, el máximo valor encontrado es el registrado en la parcela I.

Cuadro 4. Valores de los índices de diversidad ( $H$ ), diversidad máxima ( $H_{max}$ ) y equitabilidad ( $E$ ) para los estratos arbustivo y arbóreos bajo, medio y alto, registrados para los 5 sitios de muestreo.

| ESTRATO       | SITIOS DE MUESTREO |      |      |      |      |
|---------------|--------------------|------|------|------|------|
|               | I                  | II   | III  | IV   | V    |
| H             |                    |      |      |      |      |
| Arbustivo     | 3.06               | 2.88 | 2.55 | 1.99 | 2.58 |
| Arbóreo Bajo  | 2.16               | 1.76 | 2.40 | 1.74 | 1.98 |
| Arbóreo Medio | 2.20               | 1.19 | 2.32 | 2.32 | —    |
| Arbóreo Alto  | 1.29               | 1.64 | 1.13 | 1.33 | —    |

Cuadro 4. Continuación.

| ESTRATO           | I    | II   | III  | IV   | V    |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| H máxima          |      |      |      |      |      |
| Arbustivo         | 3.55 | 3.61 | 3.22 | 3.33 | 3.09 |
| Arbóreo Bajo      | 2.99 | 2.40 | 2.99 | 3.26 | 2.71 |
| Arbóreo Medio     | 3.18 | 1.95 | 2.56 | 2.83 | —    |
| Arbóreo Alto      | 1.61 | 2.30 | 1.61 | 1.39 | —    |
| Equitabilidad (E) |      |      |      |      |      |
| Arbustivo         | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 1.85 | 0.83 |
| Arbóreo Bajo      | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.53 | 0.73 |
| Arbóreo Medio     | 0.69 | 0.61 | 0.90 | 0.82 | —    |
| Arbóreo Alto      | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.60 | —    |

#### Patrones de distribución de las especies

Todas las especies arbóreas analizadas en los diferentes muestreos presentan una distribución aleatoria (Cuadro 5). En el caso de los arbustos, en la parcela I, *Acanthocereus pentagonus*, *Hippocratea acapulcensis*, *Drypetes lateriflora*, *Savia sessiliflora* y *Croton niveus* tienen un patrón agregado, mientras que otras plantas como *Chamaedorea radicalis*, *Petrea volubilis*, *Psychotria erythrocarpa* y *Acalypha schiedeana* están repartidas aleatoriamente. En la parcela II, *Hippocratea acapulcensis*, *Randia laetevirens*, *Pisonia aculeata*, *Eugenia fragrans*, *Petrea volubilis*, *Psychotria erythrocarpa* y *Acalypha schiedeana* exhiben una distribución aleatoria, pero en la parcela III, *Acalypha schiedeana*, *Urera caracassana*, *Petrea volubilis* y *Brosimum alicastrum* la tienen agregada.

#### Listado florístico

La identificación del material colectado permitió registrar un total de 286 especies de fanerógamas agrupadas en 83 familias (Apéndice 2).

#### DISCUSIÓN

La heterogeneidad ambiental presente en la región, producida en gran parte por la fisiografía y el clima, es quizás el factor que explicaría la existencia de diferentes comunidades vegetales en una área relativamente pequeña. Este aspecto ya había sido observado anteriormente por Martin (1958).




Fig. 6. Representación de la distribución de las plantas acuáticas y de las asociadas a cuerpos de agua, en la región de Gómez Farías, Tamaulipas.

|   |              |
|---|--------------|
| 1. <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Ell.                                  | H.S.         |
| 2. <i>Nuphar luteum</i> subsp. <i>macrophyllum</i> (Small) E. O. Bernal | H.H.F., H.S. |
| 3. <i>Polygonum lapathifolium</i> L.                                    | A            |
| 4. <i>Cyperus aff. giganteus</i> Vahl                                   | H.E.         |
| 5. <i>Potamogeton</i> sp.   | H.S.         |
| 6. <i>Lobelia cardinalis</i> L.   | A            |
| 7. <i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunberg                             | H.S.         |
| 8. <i>Stellaria cuspidata</i> Willd.                                    | A            |
| 9. <i>Dichromena colorata</i> (L.) Hitchc.                              | A            |
| 10. <i>Eleocharis caribaea</i> (Rottb.) Blake                           | A            |
| 11. <i>Xanthosoma robustum</i> Schott                                   | A            |

Abreviaturas:

- H.S. = Hidrófita sumergida  
 H.H.F. = Hidrófita hojas flotantes  
 A = Asociada  
 H.E. = Hidrófita emergente




Fig. 7. Perfil sintético de la vegetación en Gómez Farias, Tamaulipas (Muestreos I, II, III, IV y V; VA = Vegetación acuática y riparia).




Fig. 8. Distribución de las frecuencias de altura de los árboles en los muestreros realizados.

Cuadro 5. Resultados del análisis de distribución de los árboles y arbustos en los diferentes muestreos. N = número de individuos de la especie, R = valor de la desviación de la aleatoriedad, C = valor del desvío estandar de la curva normal.

| ESPECIE                         | N   | R    | C     | DISTRIBUCION |
|---------------------------------|-----|------|-------|--------------|
| ARBOLES                         |     |      |       |              |
| MUESTREO I                      |     |      |       |              |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 35  | 1.02 | 0.27  | Aleatoria    |
| <i>Hybanthus mexicanus</i>      | 26  | 0.96 | -0.34 | Aleatoria    |
| <i>Randia laetevirens</i>       | 38  | 0.88 | -1.35 | Aleatoria    |
| <i>Bursera simaruba</i>         | 18  | 1.21 | 1.68  | Aleatoria    |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 28  | 0.82 | -1.80 | Aleatoria    |
| MUESTREO II                     |     |      |       |              |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 51  | 0.96 | -0.54 | Aleatoria    |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 23  | 1.00 | -0.03 | Aleatoria    |
| MUESTREO III                    |     |      |       |              |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 36  | 1.02 | 0.21  | Aleatoria    |
| MUESTREO IV                     |     |      |       |              |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 22  | 0.95 | -0.42 | Aleatoria    |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 122 | 1.09 | 1.82  | Aleatoria    |
| ARBUSTOS                        |     |      |       |              |
| MUESTREO I                      |     |      |       |              |
| <i>Drypetes lateriflora</i>     | 133 | 0.61 | -8.52 | Agregada     |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 116 | 1.09 | 1.94  | Aleatoria    |
| <i>Croton niveus</i>            | 70  | 0.78 | -3.43 | Agregada     |
| <i>Chamaedorea radicalis</i>    | 61  | 0.96 | -0.54 | Aleatoria    |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 50  | 0.83 | -2.32 | Agregada     |
| <i>Psychotria erythrocarpa</i>  | 49  | 0.97 | -0.40 | Aleatoria    |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 45  | 0.67 | -4.26 | Agregada     |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 41  | 0.89 | -1.31 | Aleatoria    |
| <i>Acanthocereus pentagonus</i> | 32  | 0.40 | -6.43 | Agregada     |
| MUESTREO II                     |     |      |       |              |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 125 | 1.08 | 1.80  | Aleatoria    |
| <i>Randia laetevirens</i>       | 86  | 0.91 | -1.51 | Aleatoria    |

Cuadro 5. Continuación.

| ESPECIE                        | N   | R    | C     | DISTRIBUCION |
|--------------------------------|-----|------|-------|--------------|
| ARBUSTOS                       |     |      |       |              |
| MUESTREO II                    |     |      |       |              |
| <i>Pisonia aculeata</i>        | 51  | 0.82 | -2.41 | Agregada     |
| <i>Eugenia</i> sp.             | 49  | 0.85 | -1.97 | Aleatoria    |
| <i>Petrea volubilis</i>        | 45  | 0.99 | -0.09 | Aleatoria    |
| <i>Psychotria erythrocarpa</i> | 42  | 1.15 | 1.88  | Aleatoria    |
| <i>Acalypha schiedeana</i>     | 40  | 0.94 | -0.67 | Aleatoria    |
| MUESTREO III                   |     |      |       |              |
| <i>Brosimum alicastrum</i>     | 89  | 0.98 | -0.26 | Aleatoria    |
| <i>Acalypha schiedeana</i>     | 114 | 0.88 | -2.30 | Agregada     |
| <i>Urera caracasana</i>        | 42  | 0.80 | -2.38 | Agregada     |
| <i>Petrea volubilis</i>        | 46  | 0.58 | -5.46 | Agregada     |

La Selva Mediana Subperennifolia es el tipo de vegetación predominante en la región, misma que dependiendo del grado de protección fisiográfica, puede llegar a parecerse fisonómica y estructuralmente a una Selva Alta Perennifolia. Esta variante encontrada en las parcelas II y III, muy probablemente corresponde a lo que Martin (1958) denominó "Tropical Evergreen Forest", con árboles de más de 25 metros de alto que se ramifican por encima del segundo tercio de su talla y con un alto porcentaje de especies perennifolias. Efectivamente, tal y como ha sido señalado por Rzedowski (1963), esta variante de la vegetación se encuentra restringida a cañadas y sitios protegidos y presenta una composición florística mucho más pobre al comparársele con la riqueza específica del "Tropical Rain Forest" de Richards (1952) o "Bosque Tropical Lluvioso" de Rzedowski (1978). De hecho, los valores de diversidad calculados a partir de los muestreos indican que las selvas estudiadas, aparte de tener un número menor de especies por unidad de área, también presentan valores de diversidad inferiores a los registrados para selvas altas (Meave, 1983, 1990). Una tendencia similar es evidente al observar los valores de 100 m<sup>2</sup> o más del área basal arbórea para selvas altas (Meave, 1983), en tanto que en las comunidades estudiadas en este trabajo no son mayores de 50 m<sup>2</sup> por hectárea.

Cabe señalar sin embargo, que la Selva Mediana Perennifolia en la zona estudiada es muy similar en composición y fisonomía a la localizada en el estado de San Luis Potosí, señalada por Rzedowski (1963) como la que representa el extremo boreal del Bosque Tropical Siempre Verde en América continental. Este autor menciona como especies dominantes en el estrato superior a *Brosimum alicastrum* y en algunos casos como codominante a *Mirandaceltis monoica*, con coberturas mayores de 75% para el estrato arbóreo más alto, lo cual concuerda con lo encontrado en este trabajo, pero con la diferencia estructural de que en Tamaulipas no se alcanzan alturas superiores a los 30 m.

Un tipo de vegetación de tendencia más xerófila que los anteriores, es el encontrado en el sur de la zona de estudio, la Selva Baja-Mediana Subcaducifolia. Su presencia puede estar relacionada con el clima, ya que según los datos meteorológicos presentados en este trabajo, hacia el sur a partir del poblado de Gómez Farías hay un gradiente decreciente de humedad y creciente de temperatura. Fisonómica, florística y estructuralmente, esta variante de la vegetación es más parecida a las selvas bajas de los alrededores de Ciudad Mante mencionadas por González (1972) y Puig (1976).

Según los datos de la estación climática Gómez Farías, la Selva Baja Caducifolia de la zona de estudio comparte el régimen climático de la Selva Mediana Subperennifolia. Su presencia al parecer está asociada al tipo de sustrato en que se desarrolla, ya que ocupa unidades topográficas conocidas localmente como riscales, en los que existe una gran cantidad de roca aflorante, poco suelo y fuertes pendientes, y es en donde se encuentran especies xerófilas como *Hechtia* sp., *Neobuxbaumia euphorbioides* y *Pseudobombax ellipticum*, entre otras.

Las comunidades acuáticas se establecen únicamente en los recodos o en las cabeceras de los ríos Frío y Sabinas, en donde el agua se encuentra en relativa calma, en tanto que la vegetación riparia se localiza a lo largo de sus cauces.

Los altos valores de diversidad encontrados en este trabajo, así como los patrones de distribución agregada de algunas especies en los estratos arbustivos y arbóreo, son características de la vegetación que han sido asociadas a la dinámica de renovación natural de las selvas. Este proceso ocurre cuando claros en el dosel del bosque, creados por la caída de ramas y/o árboles completos, son colonizados por plantas formando agregaciones de individuos e incrementando la entrada de otras especies (Martínez, 1980; Hartshorn, 1980; Whitmore, 1982; y Brokaw, 1982 entre otros). Cabe señalar que la caída de un árbol o partes de él, están asociados a la presencia de vientos fuertes los cuales son comunes en Tamaulipas debido a la alta incidencia de ciclones y tormentas tropicales en el noreste de México (Jáuregui, 1967). De particular importancia, según los pobladores de Gómez Farías, fue el ciclón Inés, registrado en octubre de 1966, el que provocó fuertes cambios en la vegetación en zonas expuestas. De esta manera, la cubierta vegetal de la región de Gómez Farías se ve afectada comúnmente por alteraciones de índole meteorológica que pueden ser la clave para entender su estado actual así como su dinámica. Futuros trabajos ecológicos en esta región podrían poner a prueba estas hipótesis.

#### AGRADECIMIENTOS

El primer autor desea agradecer a Rosalinda Medina su apoyo en la identificación de material botánico así como en la elaboración de las figuras de este trabajo. A la Dra. María del Coro Arizmendi y al M. en C. Alejandro Casas Fernández se deben las gracias por su ayuda en la revisión del texto. La escritura de este artículo se hizo con apoyo económico de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM a través del proyecto IN-207993.

#### LITERATURA CITADA

- Brokaw, N. V. L. 1982. Treefalls: frequency, timing and consequences. In: Leigh, G. E., A. Rand y D. M. Windsor (eds.). *The ecology of a tropical forest*. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C. pp. 101-108.
- Clark, P. y F. C. Evans. 1954. Distance of nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. *Ecology* 35: 445-453.
- Cottam, G. y T. J. Curtis. 1956. The use of distance measures in phytosociological sampling. *Ecology* 37: 451-460.
- Curtis, J. T. y R. P. McIntosh. 1951. An upland forest continuum in the prairie-forest border region of Wisconsin. *Ecology* 32: 476-496.
- González M., F. 1972. Excursión al centro y noreste. In: Guías botánicas de excusiones en México. Sociedad Botánica de México. México, D.F. pp. 225-228.
- Hartshorn, S. G. 1980. Neotropical forest dynamics. *Biotropica* 12: 23-30.
- Jáuregui O., E. 1967. Las ondas del este y los ciclones tropicales en México. *Revista de Ingeniería Hidráulica* 21: 1-70.
- Krebs, J. C. 1972. *Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance*. Harper & Row Publishers. Nueva York. 678 pp.
- López R., E. 1972. Carta geológica del estado de Tamaulipas. Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
- Martin, P. S. 1958. Biogeography of reptiles and amphibians in the Gomez Farias region, Tamaulipas, Mexico. *Museum of Zoology. University of Michigan. Misc. Publ.* 101: 1-102.
- Martínez R., M. 1980. Aspectos sinecológicos del proceso de renovación natural de una selva alta perennifolia. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 181 pp.
- Meave del C., J. 1983. Estructura y composición de una selva alta perennifolia en los alrededores de Bonampak, Chiapas. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 140 pp.
- Meave del C., J. 1990. Estructura y composición de la selva alta perennifolia de los alrededores de Bonampak. Instituto Nacional de Antropología. Colección Científica, Serie Arqueología. México, D.F. 147 pp.
- Miranda, F. y E. Hernández X. 1963. Los tipos de vegetación de México y su clasificación. *Boletín de la Sociedad Botánica de México*. 28: 29-178.
- Puig, H. 1976. Végétation de la Huasteca, Mexique. Mission Archoéologique et Ethnologique Française au Mexique. Collection Etudes Mesoaméricaines. Vol. 5. México, D.F. 527 pp.
- Puig, H. 1989. Análisis fitogeográfico del bosque mesófilo de Gómez Fariás. *Biotam* 1: 34-53.
- Puig, H. y R. Bracho. 1987. El bosque mesófilo de montaña de Tamaulipas. Instituto de Ecología, A.C. México, D.F. 186 pp.
- Richards, P. W. 1952. *The tropical rain forest. An ecological study*. Cambridge University Press. Cambridge. 450 pp.
- Rzedowski, J. 1963. El extremo boreal del bosque tropical siempre verde en Norteamérica continental. *Vegetatio* 11: 173-198.
- Rzedowski, J. 1978. *Vegetación de México*. Ed. Limusa. México, D.F. 432 pp.
- Sarukhán K., J. 1968. Análisis sinecológico de las selvas de *Terminalia amazonia* en la planicie costera del Golfo de México. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados. Chapingo, México. 300 pp.
- Valiente B., A. 1984. Análisis de la vegetación de la región de Gómez Fariás, Tamaulipas. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 110 pp.
- Whitmore, T. C. 1982. On pattern and process in forests. In: Newman, E. J. (ed.). Special publication Series of the British Ecological Society, No. 1. Blackwell Scientific Publications. Oxford. pp. 45-59.

APENDICE 1

Resumen de las características estructurales de la vegetación en los muestreos realizados. Se anotan únicamente las 10 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas más importantes.

Muestreo I: 1200 m<sup>2</sup>

| Especie                           | Número individuos | Cobertura total (m <sup>2</sup> ) | Área basal (m <sup>2</sup> ) | Índice de dominancia (I.D.) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ARBOLES                           |                   |                                   |                              |                             |
| Estrato bajo                      |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Drypetes lateriflora</i>       | 45                | 220.2                             | 0.312                        | 0.877                       |
| <i>Acalypha schiedeana</i>        | 37                | 225.8                             | 0.226                        | 0.696                       |
| <i>Randia laetevirens</i>         | 37                | 260.8                             | 0.177                        | 0.499                       |
| <i>Hybanthus mexicanus</i>        | 26                | 163.5                             | 0.162                        | 0.292                       |
| <i>Savia sessiliflora</i>         | 11                | 76.5                              | 0.020                        | 0.008                       |
| <i>Acalypha schlechtendaliana</i> | 6                 | 41.0                              | 0.032                        | 0.004                       |
| <i>Bursera simaruba</i>           | 4                 | 16.60                             | 0.018                        | 0.002                       |
| <i>Croton niveus</i>              | 4                 | 27.4                              | 0.014                        | 0.001                       |
| <i>Annona globiflora</i>          | 4                 | 22.5                              | 0.006                        | 0.007                       |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>      | 1                 | 12.4                              | 0.003                        | 0.0002                      |
| Estrato medio                     |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>         | 16                | 547.5                             | 0.55                         | 0.363                       |
| <i>Robinsonella discolor</i>      | 8                 | 370.5                             | 0.37                         | 0.101                       |
| <i>Bursera simaruba</i>           | 8                 | 388.7                             | 0.40                         | 0.087                       |
| <i>Drypetes lateriflora</i>       | 7                 | 175.8                             | 0.25                         | 0.072                       |
| <i>Coccoloba</i> sp.              | 4                 | 163.6                             | 0.65                         | 0.072                       |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>      | 2                 | 118.8                             | 0.24                         | 0.006                       |
| <i>Guazuma ulmifolia</i>          | 2                 | 53.4                              | 0.10                         | 0.002                       |
| <i>Exostema mexicanum</i>         | 2                 | 53.5                              | 0.05                         | 0.001                       |
| <i>Lysiloma divaricata</i>        | 2                 | 99.9                              | 0.08                         | 0.001                       |
| <i>Ficus cotinifolia</i>          | 1                 | 20.6                              | 0.01                         | 0.0006                      |
| Estrato alto                      |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Bursera simaruba</i>           | 6                 | 507.8                             | 0.78                         | 0.130                       |
| <i>Lysiloma divaricata</i>        | 2                 | 205.6                             | 0.15                         | 0.002                       |
| <i>Savia sessiliflora</i>         | 1                 | 86.6                              | 0.07                         | 0.0005                      |
| <i>Chlorophora tinctoria</i>      | 1                 | 76.2                              | 0.06                         | 0.0004                      |
| <i>Sapindus saponaria</i>         | 1                 | 56.8                              | 0.05                         | 0.0004                      |

Muestreo I. Continuación.

| Especie                         | Número de individuos | Cobertura (%) | Indice valor de importancia (I.V.I.) |
|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| ARBUSTOS (300 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Drypetes lateriflora</i>     | 42                   | 15.30         | 41.60                                |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 26                   | 15.70         | 28.14                                |
| <i>Chamaedorea radicalis</i>    | 21                   | 4.10          | 22.65                                |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 16                   | 12.21         | 22.40                                |
| <i>Croton niveus</i>            | 15                   | 7.66          | 19.45                                |
| <i>Randia laetevirens</i>       | 8                    | 5.30          | 17.10                                |
| <i>Psychotria erythrocarpa</i>  | 14                   | 1.62          | 16.10                                |
| <i>Annona globiflora</i>        | 8                    | 7.40          | 16.00                                |
| <i>Hybanthus mexicanus</i>      | 5                    | 9.20          | 15.43                                |
| <i>Acanthocereus pentagonus</i> | 16                   | 4.23          | 15.43                                |
| HERBACEAS (12 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Syngonium podophyllum</i>    | 60                   | 83.43         | 192.81                               |
| <i>Pseuderanthemum alatum</i>   | 8                    | 6.34          | 26.21                                |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 2                    | 0.75          | 10.00                                |
| <i>Zebrina pendula</i>          | 2                    | 2.94          | 8.77                                 |
| <i>Peperomia granulosa</i>      | 1                    | 1.19          | 5.40                                 |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 1                    | 0.72          | 5.40                                 |
| <i>Chamaedorea radicalis</i>    | 1                    | 0.68          | 5.32                                 |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 1                    | 0.64          | 5.28                                 |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 1                    | 0.64          | 5.28                                 |
| <i>Meloea quadrivalvis</i>      | 1                    | 0.58          | 5.22                                 |

Muestreo II: 1200 m<sup>2</sup>

| Especie                       | Número individuos | Cobertura total (m <sup>2</sup> ) | Área basal (m <sup>2</sup> ) | Índice de dominancia (I.D.) |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ARBOLES                       |                   |                                   |                              |                             |
| Estrato bajo                  |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>     | 17                | 130.7                             | 0.05                         | 0.0031                      |
| <i>Achatocarpus nigricans</i> | 6                 | 59.4                              | 0.02                         | 0.0030                      |
| <i>Chione mexicana</i>        | 5                 | 64.1                              | 0.02                         | 0.0003                      |
| <i>Acalypha schiedeana</i>    | 3                 | 12.9                              | 0.01                         | 0.0003                      |
| <i>Wimmeria concolor</i>      | 2                 | 9.2                               | 0.004                        | 0.0001                      |
| <i>Randia laetevirens</i>     | 3                 | 17.0                              | 0.004                        | 0.0001                      |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 2                 | 3.3                               | 0.005                        | 0.00007                     |
| <i>Citrus</i> sp.             | 1                 | 4.1                               | 0.005                        | 0.00003                     |
| <i>Trophis racemosa</i>       | 1                 | 4.8                               | 0.004                        | 0.00003                     |
| <i>Morisonia americana</i>    | 1                 | 5.4                               | 0.004                        | 0.00003                     |
| Estrato medio                 |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>     | 25                | 446.5                             | 0.312                        | 0.4867                      |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 5                 | 233.5                             | 0.70                         | 0.0954                      |
| <i>Chione mexicana</i>        | 3                 | 58.5                              | 0.04                         | 0.0025                      |
| <i>Citrus</i> sp.             | 2                 | 53.5                              | 0.024                        | 0.0003                      |
| <i>Achatocarpus nigricans</i> | 1                 | 28.3                              | 0.012                        | 0.00008                     |
| No identificada 1             | 1                 | 15.6                              | 0.007                        | 0.00005                     |
| No identificada 2             | 1                 | 6.9                               | 0.002                        | 0.00001                     |
| Estrato alto                  |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 16                | 1276.8                            | 2.704                        | 2.6364                      |
| <i>Savia sessiliflora</i>     | 9                 | 266.0                             | 0.243                        | 0.0610                      |
| <i>Chione mexicana</i>        | 2                 | 146.4                             | 0.140                        | 0.0040                      |
| <i>Exostema mexicanum</i>     | 2                 | 118.0                             | 0.105                        | 0.0030                      |
| <i>Guazuma ulmifolia</i>      | 1                 | 56.7                              | 0.109                        | 0.0008                      |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>  | 1                 | 49.3                              | 0.064                        | 0.0004                      |
| <i>Lysiloma divaricata</i>    | 1                 | 82.5                              | 0.063                        | 0.0004                      |
| <i>Cupania dentata</i>        | 1                 | 33.7                              | 0.040                        | 0.0003                      |
| <i>Bursera simaruba</i>       | 1                 | 23.8                              | 0.032                        | 0.0002                      |

Muestreo II. Continuación.

| Especie                         | Número de individuos | Cobertura (%) | Indice valor de importancia (I.V.I.) |
|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| ARBUSTOS (300 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 34                   | 48.10         | 84.70                                |
| <i>Randia laetevirens</i>       | 20                   | 9.44          | 32.35                                |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 10                   | 1.40          | 19.52                                |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 6                    | 6.26          | 15.50                                |
| <i>Eugenia fragrans</i>         | 9                    | 2.03          | 13.40                                |
| <i>Psychotria erythrocarpa</i>  | 8                    | 1.20          | 13.00                                |
| <i>Casearia</i> sp.             | 3                    | 7.32          | 12.00                                |
| <i>Pisonia aculeata</i>         | 5                    | 4.34          | 11.60                                |
| <i>Piper amalago</i>            | 4                    | 3.12          | 9.60                                 |
| <i>Eugenia capuli</i>           | 4                    | 0.76          | 7.23                                 |
| HERBACEAS (12 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Syngonium podophyllum</i>    | 26                   | 29.32         | 107.04                               |
| <i>Pseuderanthemum alatum</i>   | 13                   | 14.66         | 41.00                                |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 10                   | 11.27         | 32.63                                |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 5                    | 5.63          | 19.62                                |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 6                    | 6.77          | 17.61                                |
| <i>Petiveria alliacea</i>       | 6                    | 6.77          | 11.44                                |
| <i>Psychotria erythrocarpa</i>  | 5                    | 5.63          | 10.92                                |
| <i>Celtis iguanaea</i>          | 2                    | 2.25          | 10.77                                |
| <i>Rourea glabra</i>            | 3                    | 3.38          | 8.42                                 |
| <i>Trophis racemosa</i>         | 1                    | 1.12          | 3.85                                 |

Muestreo III: 1200 m<sup>2</sup>

| Especie                       | Número individuos | Cobertura total (m <sup>2</sup> ) | Área basal (m <sup>2</sup> ) | Índice de dominancia (I.D.) |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ARBOLES                       |                   |                                   |                              |                             |
| Estrato bajo                  |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Acalypha schiedeana</i>    | 35                | 270.80                            | 0.133                        | 0.3564                      |
| <i>Urera caracasana</i>       | 16                | 97.34                             | 0.273                        | 0.2420                      |
| <i>Savia sessiliflora</i>     | 11                | 65.00                             | 0.140                        | 0.0635                      |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 16                | 131.70                            | 0.035                        | 0.0300                      |
| <i>Annona globiflora</i>      | 9                 | 70.15                             | 0.025                        | 0.0094                      |
| <i>Piper amalago</i>          | 4                 | 50.51                             | 0.070                        | 0.0075                      |
| <i>Euphorbia plicata</i>      | 2                 | 100.30                            | 0.004                        | 0.0060                      |
| <i>Drypetes lateriflora</i>   | 5                 | 40.10                             | 0.040                        | 0.0052                      |
| <i>Croton niveus</i>          | 2                 | 62.52                             | 0.032                        | 0.0010                      |
| <i>Morisonia americana</i>    | 1                 | 11.94                             | 0.064                        | 0.0004                      |
| Estrato medio                 |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 11                | 276.16                            | 0.272                        | 0.1250                      |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>  | 5                 | 494.60                            | 0.500                        | 0.0517                      |
| <i>Bursera simaruba</i>       | 4                 | 153.53                            | 0.500                        | 0.0400                      |
| <i>Savia sessiliflora</i>     | 7                 | 180.00                            | 0.120                        | 0.0340                      |
| <i>Drypetes lateriflora</i>   | 4                 | 119.00                            | 0.360                        | 0.3000                      |
| <i>Coccoloba</i> sp.          | 4                 | 139.70                            | 0.243                        | 0.0202                      |
| <i>Urera caracasana</i>       | 2                 | 45.80                             | 0.121                        | 0.0033                      |
| <i>Esenbeckia berlandieri</i> | 3                 | 58.40                             | 0.047                        | 0.0030                      |
| <i>Dendropanax arboreus</i>   | 2                 | 68.81                             | 0.193                        | 0.0030                      |
| <i>Eugenia fragrans</i>       | 1                 | 43.60                             | 0.170                        | 0.0012                      |
| Estrato alto                  |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Brosimum alicastrum</i>    | 10                | 515.26                            | 0.700                        | 0.2342                      |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>  | 3                 | 320.50                            | 0.612                        | 0.0400                      |
| <i>Bursera simaruba</i>       | 1                 | 63.30                             | 0.100                        | 0.0006                      |
| <i>Lysiloma divaricata</i>    | 1                 | 80.12                             | 0.080                        | 0.0005                      |
| <i>Ficus padifolia</i>        | 1                 | 19.63                             | 0.020                        | 0.0001                      |

Muestreo III. Continuación.

| Especie                         | Número de individuos | Cobertura (%) | Índice valor de importancia (I.V.I.) |
|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| ARBUSTOS (300 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 31                   | 44.20         | 76.70                                |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 27                   | 17.80         | 43.80                                |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 27                   | 4.55          | 29.16                                |
| <i>Hippocratea acapulcensis</i> | 9                    | 3.80          | 17.45                                |
| <i>Urera caracasana</i>         | 14                   | 3.30          | 17.22                                |
| <i>Randia laetevirens</i>       | 10                   | 2.40          | 16.64                                |
| <i>Annona globiflora</i>        | 3                    | 7.72          | 13.65                                |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 4                    | 5.60          | 12.10                                |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>    | 7                    | 3.41          | 11.80                                |
| <i>Bursera simaruba</i>         | 4                    | 1.42          | 9.32                                 |
| HERBACEAS (12 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Peperomia granulosa</i>      | 27                   | 26.10         | 71.28                                |
| <i>Syngonium podophyllum</i>    | 23                   | 23.90         | 69.63                                |
| <i>Commelinaceae</i> 1          | 23                   | 27.62         | 68.80                                |
| <i>Pseuderanthemum alatum</i>   | 8                    | 8.82          | 25.91                                |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | 5                    | 2.05          | 13.88                                |
| <i>Mirandaceltis monoica</i>    | 3                    | 3.42          | 10.95                                |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 3                    | 1.24          | 8.77                                 |
| <i>Malaxis</i> sp.              | 2                    | 0.64          | 7.17                                 |
| <i>Cissus sicyoides</i>         | 1                    | 3.54          | 6.81                                 |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 2                    | 1.28          | 5.54                                 |

Muestreo IV: 1600 m<sup>2</sup>

| Especie                         | Número individuos    | Cobertura total (m <sup>2</sup> ) | Área basal (m <sup>2</sup> )         | Índice de dominancia (I.D.) |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ARBOLES                         |                      |                                   |                                      |                             |
| Estrato bajo                    |                      |                                   |                                      |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 105                  | 1726.60                           | 1.960                                | 12.850                      |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 22                   | 197.10                            | 0.070                                | 0.0530                      |
| <i>Exostema caribaeum</i>       | 8                    | 95.60                             | 0.060                                | 0.0080                      |
| <i>Bursera simaruba</i>         | 4                    | 42.10                             | 0.104                                | 0.0060                      |
| <i>Jatropha curcas</i>          | 8                    | 36.20                             | 0.025                                | 0.0031                      |
| <i>Phyllostylon brasiliense</i> | 4                    | 62.20                             | 0.040                                | 0.0012                      |
| <i>Colubrina elliptica</i>      | 3                    | 28.62                             | 0.012                                | 0.0004                      |
| <i>Schoepfia schreberi</i>      | 1                    | 15.73                             | 0.051                                | 0.0020                      |
| <i>Nopalea dejacta</i>          | 2                    | 2.73                              | 0.012                                | 0.0002                      |
| <i>Acanthocereus pentagonus</i> | 3                    | 13.86                             | 0.013                                | 0.0002                      |
| Estrato medio                   |                      |                                   |                                      |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 20                   | 541.80                            | 0.726                                | 0.7000                      |
| <i>Acacia coulteri</i>          | 8                    | 736.10                            | 0.620                                | 0.1160                      |
| <i>Bursera simaruba</i>         | 10                   | 191.71                            | 0.300                                | 0.0800                      |
| <i>Colubrina elliptica</i>      | 7                    | 178.33                            | 0.200                                | 0.0200                      |
| <i>Pisonia aculeata</i>         | 3                    | 179.27                            | 0.313                                | 0.0073                      |
| <i>Phyllostylon brasiliense</i> | 2                    | 70.55                             | 0.155                                | 0.0024                      |
| <i>Coccobola</i> sp.            | 2                    | 83.90                             | 0.115                                | 0.0017                      |
| <i>Piscidia piscipula</i>       | 2                    | 89.90                             | 0.106                                | 0.0016                      |
| <i>Robinsonella discolor</i>    | 1                    | 35.50                             | 0.145                                | 0.0006                      |
| <i>Ficus cotinifolia</i>        | 1                    | 78.50                             | 0.107                                | 0.0004                      |
| Especie                         | Número de individuos | Cobertura (%)                     | Índice valor de importancia (I.V.I.) |                             |
| ARBUSTOS (300m <sup>2</sup> )   |                      |                                   |                                      |                             |
| <i>Bromelia pinguin</i>         | 115                  | 63.43                             | 127.03                               |                             |
| <i>Acalypha schiedeana</i>      | 44                   | 12.61                             | 46.25                                |                             |
| <i>Savia sessiliflora</i>       | 13                   | 7.31                              | 23.67                                |                             |
| <i>Petrea volubilis</i>         | 7                    | 3.40                              | 13.21                                |                             |
| <i>Iresine cassiniaeformis</i>  | 6                    | 1.85                              | 8.50                                 |                             |

Muestreo IV. Continuación.

| Especie                         | Número de individuos | Cobertura (%) | Indice valor de importancia (I.V.I.) |
|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| <i>Cnidoscolus multilobus</i>   | 3                    | 1.70          | 7.10                                 |
| <i>Chamaedorea radicalis</i>    | 5                    | 0.64          | 6.85                                 |
| <i>Morisonia americana</i>      | 4                    | 0.90          | 6.70                                 |
| <i>Erythrina herbacea</i>       | 4                    | 0.60          | 6.40                                 |
| <i>Phyllostylon brasiliense</i> | 4                    | 0.50          | 5.00                                 |
| HERBACEAS (12 m <sup>2</sup> )  |                      |               |                                      |
| <i>Bromelia pinguin</i>         | 4                    | 72.88         | 132.77                               |
| <i>Commelina sp1.</i>           | 4                    | 9.15          | 41.44                                |
| <i>Eugenia fragrans</i>         | 3                    | 0.42          | 27.15                                |
| <i>Selenicereus spinulosus</i>  | 2                    | 6.16          | 27.02                                |
| <i>Litachne pauciflora</i>      | 1                    | 3.62          | 18.60                                |
| <i>Croton cortesianus</i>       | 1                    | 0.17          | 15.15                                |
| <i>Iresine cassiniaeformis</i>  | 1                    | 0.29          | 15.26                                |

Muestreo V

| Especie                              | Número individuos | Cobertura total (m <sup>2</sup> ) | Área basal (m <sup>2</sup> ) | Índice de dominancia (I.D.) |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>ARBOLES</b>                       |                   |                                   |                              |                             |
| Estrato bajo                         |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Pseudobombax ellipticum</i>       | 21                | 119.10                            | 7.720                        | 1329.700                    |
| <i>Bursera simaruba</i>              | 25                | 163.13                            | 1.021                        | 273.900                     |
| <i>Neobuxbaumia euphorbioides</i>    | 13                | 0.23                              | 0.230                        | 18.700                      |
| <i>Ficus cotinifolia</i>             | 3                 | 45.14                             | 0.232                        | 1.320                       |
| <i>Bauhinia</i> sp.                  | 3                 | 9.04                              | 0.024                        | 0.140                       |
| <i>Acalypha schiedeana</i>           | 3                 | 9.53                              | 0.021                        | 0.120                       |
| <i>Randia armata</i>                 | 1                 | 5.72                              | 0.112                        | 0.070                       |
| <i>Eugenia fragrans</i>              | 2                 | 5.10                              | 0.027                        | 0.068                       |
| <i>Colubrina elliptica</i>           | 3                 | 12.30                             | 0.010                        | 0.060                       |
| <i>Thevetia peruviana</i>            | 1                 | 9.35                              | 0.062                        | 0.040                       |
| <b>ARBUSTOS</b>                      |                   |                                   |                              |                             |
| Especie                              |                   |                                   |                              |                             |
| Número de individuos                 |                   |                                   |                              |                             |
| Cobertura (%)                        |                   |                                   |                              |                             |
| Índice valor de importancia (I.V.I.) |                   |                                   |                              |                             |
| <b>HERBACEAS</b>                     |                   |                                   |                              |                             |
| <i>Syngonium podophyllum</i>         | 13                | 25.75                             | 55.72                        |                             |
| <i>Pilea serpyllifolia</i>           | 13                | 26.93                             | 54.94                        |                             |
| <i>Chamaedorea radicalis</i>         | 7                 | 17.62                             | 36.17                        |                             |
| <i>Peperomia granulosa</i>           | 9                 | 11.38                             | 34.39                        |                             |
| <i>Commelinaceae</i> 1               | 12                | 3.16                              | 29.92                        |                             |

Muestreo V. Continuación.

| Especie                        | Número de individuos | Cobertura (%) | Indice valor de importancia (I.V.I.) |
|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| <i>Commelinaceae</i> 2         | 5                    | 1.55          | 13.70                                |
| <i>Euphorbia plicata</i>       | 3                    | 2.52          | 12.17                                |
| <i>Selenicereus spinulosus</i> | 3                    | 1.65          | 11.30                                |
| <i>Peperomia glabella</i>      | 2                    | 3.48          | 9.90                                 |
| <i>Lasiacis</i> sp.            | 3                    | 0.68          | 6.39                                 |

APENDICE 2

LISTADO FLORISTICO

Las especies marcadas con asterisco son cultivadas localmente.

|   |   |
|---|---|
| ACANTHACEAE                                       | ASCLEPIADACEAE                                    |
| <i>Aphelandra depeleana</i> Schlecht. & Cham.     | <i>Asclepias curassavica</i> L.                   |
| <i>Beloperone guttata</i> Brandeg.                | <i>Marsdenia coulteri</i> Hemsl.                  |
| <i>Jacobinia</i> sp.                              |   |
| <i>Louteridium tamaulipense</i> A. Richardson     | BASELLACEAE                                       |
| <i>Pseuderanthemum alatum</i> (Nees) Radlk.       | <i>Anredera scandens</i> Moq.                     |
| <i>Siphonoglossa</i> sp.                          |   |
| ACHATOCARPACEAE                                   | BEGONIACEAE                                       |
| <i>Achatocarpus nigricans</i> Triana              | <i>Begonia heracleifolia</i> Schlecht. & Cham.    |
| AMARANTHACEAE                                     | <i>Begonia</i> sp. 1                              |
| <i>Gomphrena</i> sp.                              | <i>Begonia</i> sp. 2                              |
| <i>Iresine cassinaeformis</i> Schauer             | BERBERIDACEAE                                     |
| <i>Iresine aff. interrupta</i> Benth.             | <i>Berberis ehrenbergii</i> Kuntze                |
| <i>Iresine palmeri</i> Standley                   |   |
| <i>Iresine tomentella</i> Standley                | BIGNONIACEAE                                      |
| AMARYLLIDACEAE                                    | <i>Arrabidaea pubescens</i> (L.) A. Gentry        |
| <i>Agave lophantha</i> Schiede                    | <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry      |
| <i>Manfreda</i> sp.                               | <i>Melloa quadrivalvis</i> (Jacq.) A. Gentry      |
| ANACARDIACEAE                                     | <i>Parmentiera aculeata</i> (H.B.K.) Seemann      |
| <i>Comocladia engleriana</i> Loesener             | <i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry   |
| <i>Mangifera indica</i> L.                        | <i>Xylophragma seemannianum</i> (O. Ktze.) Sandw. |
| <i>Spondias mombin</i> L.                         |   |
| <i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze         | BOMBACACEAE                                       |
| ANNONACEAE  | <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.               |
| <i>Annona globiflora</i> Schlecht.                | <i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand     |
| APOCYNACEAE                                       |   |
| <i>Plumeria acutifolia</i> Poir.                  | BORAGINACEAE                                      |
| <i>Tabernaemontana chrysocarpa</i> Blake          | <i>Cordia dentata</i> Poir.                       |
| <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum.          |   |
| ARACEAE   | BROMELIACEAE                                      |
| <i>Syngonium podophyllum</i> Schott               | <i>Bromelia pinguin</i> L.                        |
| <i>Syngonium</i> sp.                              | <i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb.              |
| <i>Xanthosoma robustum</i> Schott                 | <i>Hechtia</i> sp.                                |
| ARALIACEAE  | <i>Tillandsia fasciculata</i> Hook.               |
| <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch. | <i>Tillandsia ionantha</i> Planch.                |
|   | <i>Tillandsia karwinskyana</i> Schultes           |
|   | <i>Tillandsia polystachia</i> (L.) L.             |
|   | <i>Tillandsia schiedeana</i> Steud.               |
|   | <i>Tillandsia usneoides</i> L.                    |
|   | BURSERACEAE                                       |
|   | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.                |

Apéndice 2. Continuación.

|   |  |
|---|--|
| <b>CACTACEAE</b>  |  |
| <i>Acanthocereus pentagonus</i> (L.) Britton & Rose                     | <i>Eupatorium pycnocephalum</i> Less.          |
| <i>Cephalocereus palmeri</i> Rose                                       | <i>Parthenium hysterophorus</i> L.             |
| <i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haworth) Buxbaum                     | <i>Sclerocarpus uniserialis</i> (Hook.) Benth. |
| <i>Nopalea dejacta</i> (Salm-Dyck) Salm-Dyck                            | <i>Senecio chenopodioides</i> H.B.K.           |
| * <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Miller                               |  |
| <i>Opuntia lindheimeri</i> Engelm. var. <i>aciculata</i> (Griff.) Bravo |  |
| <i>Rhipsalis baccifera</i> (J. Miller) W. T. Stearn                     |  |
| <i>Selenicereus boeckmannii</i> (Otto) Britton & Rose                   |  |
| <i>Selenicereus kunthianus</i> (Otto) Britton & Rose                    |  |
| <i>Selenicereus spinulosus</i> (DC.) Britton & Rose                     |  |
| <b>CAMPANULACEAE</b>  |  |
| <i>Lobelia cardinalis</i> L.  |  |
| <i>Lobelia</i> sp.  |  |
| <b>CANNACEAE</b>  |  |
| <i>Canna edulis</i> Ker-Gawler  |  |
| <b>CAPPARIDACEAE</b>  |  |
| <i>Capparis flexuosa</i> (L.) L.  |  |
| <i>Morisonia americana</i> L.   |  |
| <b>CARICACEAE</b>   |  |
| * <i>Carica papaya</i> L.   |  |
| <b>CARYOPHYLLACEAE</b>  |  |
| <i>Stellaria cuspidata</i> Willd.                                       |  |
| <b>CELASTRACEAE</b>   |  |
| <i>Rhacomia scoparia</i> (Hook. & Arn.) Standl.                         |  |
| <i>Wimmeria concolor</i> Schlecht. & Cham.                              |  |
| <b>COMMELINACEAE</b>  |  |
| <i>Aneilema geniculata</i> (Jacq.) Woodson                              |  |
| <i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Woodson                               |  |
| <i>Campelia zanonia</i> (L.) H.B.K.                                     |  |
| <i>Commelina</i> sp. 1  |  |
| Commelinaceae 1   |  |
| Commelinaceae 2   |  |
| <i>Phyodina cordifolia</i> (Swartz) Rohw.                               |  |
| <i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. R. Hunt                           |  |
| <i>Zebrina pendula</i> Schnizl.   |  |
| <b>COMPOSITAE</b>   |  |
| <i>Bidens squarrosa</i> H.B.K.  |  |
| <i>Cirsium mexicanum</i> DC.  |  |
| <b>CONNARACEAE</b>  |  |
| <i>Rourea glabra</i> H.B.K.   |  |
| <b>CONVOLVULACEAE</b>   |  |
| <i>Ipomoea</i> sp.  |  |
| <b>CRASSULACEAE</b>   |  |
| <i>Echeveria</i> sp.  |  |
| <i>Kalanchoë</i> cf. <i>calycinum</i> Salisb.                           |  |
| <b>CYCADACEAE</b>   |  |
| <i>Ceratozamia kuesteriana</i> Regel                                    |  |
| <i>Zamia fischeri</i> Miq.  |  |
| <b>CYPERACEAE</b>   |  |
| <i>Cyperus aff. giganteus</i> Vahl                                      |  |
| <i>Cyperus hermaphroditus</i> Standley                                  |  |
| <i>Dichromena colorata</i> (L.) Hitchc.                                 |  |
| <i>Eleocharis caribaea</i> (Rottb.) Blake                               |  |
| <b>DIOSCOREACEAE</b>  |  |
| <i>Dioscorea convolvulacea</i> Schlecht. & Cham.                        |  |
| <b>EUPHORBIACEAE</b>  |  |
| <i>Acalypha schiedeana</i> Schlecht.                                    |  |
| <i>Acalypha schlechtendaliana</i> Muell. Arg.                           |  |
| <i>Adelia barbinervis</i> Schlecht. & Cham.                             |  |
| <i>Bernardia interrupta</i> (Schlecht.) Muell. Arg.                     |  |
| <i>Cnidoscolus multilobus</i> (Pax) I. M. Johnston                      |  |
| <i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.                                  |  |
| <i>Croton cortesianus</i> H.B.K.  |  |
| <i>Croton niveus</i> Jacq.  |  |
| <i>Drypetes lateriflora</i> (Sw.) Krug et Urb.                          |  |
| <i>Euphorbia heterophylla</i> L.  |  |
| <i>Euphorbia plicata</i> S. Watson                                      |  |
| <i>Euphorbia</i> sp.  |  |
| <i>Gymnanthes actinostemoides</i> Muell. Arg.                           |  |
| <i>Jatropha curcas</i> L.   |  |
| <i>Phyllanthus grandifolius</i> L.                                      |  |
| <i>Ricinus communis</i> L.  |  |
| <i>Savia sessiliflora</i> (Sw.) Willd.                                  |  |

Apéndice 2. Continuación.

FLACOURTIACEAE

- Casearia* sp.  
*Xylosma flexuosum* (H.B.K.) Hemsl.  
*Zuelania guidonia* (Swartz) Britton & Millsp.

GRAMINEAE

- Bambusa aculeata* (Rupr.) Hitchc.  
*Lasiacis ruscifolia* (H.B.K.) Hitchc.  
*Lasiacis* sp.  
*Litachne pauciflora* (Sw.) Beauv.  
*Pennisetum setosum* (Sw.) L. Rich.  
*Rhipidocladum bartletti* (McClure) McClure  
*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.  
\**Saccharum officinarum* L.  
\**Zea mays* L.

HIPPOCRATEACEAE

- Hippocratea acapulcensis* H.B.K.

LABIATAE

- Salvia coccinea* Juss.  
*Salvia riparia* H.B.K.  
*Scutellaria* sp.

LACISTEMACEAE

- Lacistema aggregatum* (Bergius) Rusby

LAURACEAE

- Nectandra salicifolia* (H.B.K.) Nees  
*Persea americana* var. *drymifolia* (Schlecht. &  
Cham.) Blake  
*Phoebe tampicensis* Mez

LEGUMINOSAE

- Acacia angustissima* (Mill.) Kuntze  
*Acacia cornigera* (L.) Willd.  
*Acacia coulteri* Benth.  
*Acacia farnesiana* (L.) Willd.  
*Acacia* sp.  
*Bauhinia divaricata* L.  
*Bauhinia* sp.  
*Caesalpinia mexicana* A. Gray  
*Calliandra capillata* Benth.  
*Calliandra houstoniana* (Mill.) Standley  
*Canavalia villosa* Benth.  
*Chamaecrista chamaecristoides* (Collada)  
Greene.  
*Cracca caribaea* Benth.

*Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb.

- Erythrina americana* Mill.  
*Erythrina herbacea* L.  
*Harpalyce arborescens* A. Gray  
*Inga vera* subsp. *spuria* (Willd.) J. León  
*Lysiloma divaricata* (Jacq.) Macbride  
*Macroptilium atropurpureum* (Sessé & Mociño  
ex DC.) Urban  
*Phaseolus glabellus* Piper  
*Piscidia piscipula* (L.) Sarg.  
*Pithecellobium lanceolatum* (H. & B.) Benth.  
*Pithecellobium pallens* (Benth.) Standl.  
*Ramirezella nitida* Piper  
*Senna atomaria* (L.) Irwin & Barneby  
*Stizolobium pruriens* (L.) Medic.

LILIACEAE

- Beaucarnea inermis* Rose  
*Smilax mollis* Willd.

LORANTHACEAE

- Psittacanthus* aff. *schiedeanus* (Cham. &  
Schlecht.) Blume

LYTHRACEAE

- Cuphea* sp. 1  
*Cuphea* sp. 2

MALPIGHIACEAE

- Malpighia glabra* L.  
*Mascagnia macroptera* Ndz.

MALVACEAE

- Abutilon hypoleucum* A. Gray  
*Hibiscus phoeniceus* Jacq.  
*Malvaviscus drummondii* Torr. & Gray  
*Robinsonella discolor* Rose & Baker  
*Sida acuta* L.

MELASTOMATACEAE

- Conostegia xalapensis* (Bonpl.) D. Don

MELIACEAE

- Cedrela odorata* L.  
*Trichilia havanensis* Jacq.  
*Trichilia hirta* L.

Apéndice 2. Continuación.

|   |   |
|---|---|
| MORACEAE  | PALMAE  |
| <i>Brosimum alicastrum</i> Swartz                       | <i>Chamaedorea radicalis</i> Mart.                |
| <i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaud.                 | <i>Sabal mexicana</i> Mart.                       |
| <i>Ficus blandiana</i> (Liebm.) Miq.                    |   |
| <i>Ficus cookii</i> Standley                            |   |
| <i>Ficus cotinifolia</i> H.B.K.                         |   |
| <i>Ficus padifolia</i> H.B.K.                           |   |
| <i>Ficus segoviae</i> Miq.                              |   |
| <i>Trophis racemosa</i> (L.) Urban                      |   |
| MYRSINACEAE   | PASSIFLORACEAE                                    |
| <i>Icacorea paniculata</i> (Nutt.) Sudw.                | <i>Passiflora</i> sp.                             |
| <i>Parathesis serrulata</i> (Swartz) Mez                |   |
| NYCTAGINACEAE   | PIPERACEAE  |
| <i>Mirabilis longiflora</i> L.                          | <i>Peperomia glabella</i> (Swartz) A. Dietr.      |
| <i>Pisonia aculeata</i> L.                              | <i>Peperomia glutinosa</i> Millsp.                |
| NYMPHAEACEAE  | <i>Peperomia granulosa</i> Trelease               |
| <i>Nuphar luteum</i> subsp. <i>macrophyllum</i> (Small) | <i>Peperomia quadrifolia</i> (L.) H.B.K.          |
| E. O. Beal  | <i>Piper amalago</i> L.                           |
| OLACACEAE   | PHYTOLACCACEAE                                    |
| <i>Schoepfia schreberi</i> Gmel.                        | <i>Agdestis clematidea</i> Moc. & Sessé ex DC.    |
| ONAGRACEAE  | <i>Petiveria alliacea</i> L.                      |
| <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Ell.                     | <i>Rivina humilis</i> L.                          |
| OPILIACEAE  | POLEMONIACEAE                                     |
| <i>Agonandra obtusifolia</i> Standley                   | <i>Bonplandia geminiflora</i> Cav.                |
| ORCHIDACEAE   | POLYGONACEAE                                      |
| <i>Cyrtopodium punctatum</i> Lindl.                     | <i>Coccocoba</i> sp.                              |
| <i>Encyclia belizensis</i> (Rchb. f.) Schltr. subsp.    | <i>Polygonum lapathifolium</i> L.                 |
| <i>parviflora</i>                                       | <i>Ruprechtia pallida</i> Standley                |
| <i>Encyclia cochleata</i> (L.) Dressler                 |   |
| <i>Encyclia livida</i> (Lindley) Schlecht.              |   |
| <i>Epidendrum raniferum</i> Lindl.                      |   |
| <i>Malaxis</i> sp.                                      |   |
| <i>Oncidium carthagense</i> (Jacq.) Sw.                 |   |
| <i>Oncidium cebolleta</i> (Jacq.) Sw.                   |   |
| <i>Pleurothallis</i> sp.                                |   |
| <i>Spiranthes</i> sp. 1                                 |   |
| <i>Spiranthes</i> sp. 2                                 |   |
|   | PORTULACACEAE                                     |
|   | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.        |
|   | POTAMOGETONACEAE                                  |
|   | <i>Potamogeton</i> sp.                            |
|   | RAFFLESIACEAE                                     |
|   | <i>Bdalophyton americanum</i> (R. Br.) Harms      |
|   | RANUNCULACEAE                                     |
|   | <i>Clematis dioica</i> L.                         |
|   | RHAMNACEAE  |
|   | <i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Brizicky & Stern |
|   | <i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.          |
|   | RUBIACEAE   |
|   | <i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.                |
|   | <i>Chione mexicana</i> Standley                   |
|   | * <i>Coffea arabica</i> L.                        |
|   | <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) R. & S.         |

Apéndice 2. Continuación.

*Exostema mexicanum* Gray  
*Hamelia patens* Jacq. var *patens*  
*Psychotria erythrocarpa* Schlecht.  
*Psychotria microdon* (DC.) Urb.  
*Psychotria tenuifolia* Swartz  
*Randia armata* (Swartz) DC.  
*Randia laetevirens* Standley  
*Randia obcordata* S. Wats.  
*Spermacoce tenuior* L.

RUTACEAE

\**Citrus aurantium* L.  
*Citrus* sp.  
*Decatropis bicolor* (Zucc.) Radlk.  
*Esenbeckia berlandieri* Baill.  
*Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg.  
*Zanthoxylum pringlei* S. Wats.

SALICACEAE

*Salix humboldtiana* Willd.

SAPINDACEAE

*Cupania dentata* Moc. & Sessé ex DC.  
*Paullinia tomentosa* Jacq.  
*Sapindus saponaria* L.  
*Serjania cardiospermoides* Schlecht. & Cham.  
*Thouinia villosa* DC.  
*Ungnadia speciosa* Endl.  
*Urvillea ulmacea* H.B.K.

SAPOTACEAE

*Bumelia laetevirens* Hemsl.  
*Bumelia* sp.  
*Chrysophyllum mexicanum* Brand. ex Standley  
*Sideroxylon* sp.

SCROPHULARIACEAE

*Capraria biflora* L.  
*Russelia syringaeifolia* Cham. & Schlecht.

SOLANACEAE

*Capsicum ciliatum* (H.B.K.) Kuntze  
*Datura inoxia* Miller

*Solanum brachystachys* Dunal  
*Solanum ochraceo-ferrugineum* (Dun.) Fern.  
*Solanum verbascifolium* L.

STERCULIACEAE

*Byttneria aculeata* Jacq.  
*Guazuma ulmifolia* Lam.

TAXODIACEAE

*Taxodium mucronatum* Ten.

ULMACEAE

*Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg.  
*Mirandaceltis monoica* (Hemsl.) Sharp  
*Phyllostylon brasiliense* Cap.  
*Trema micrantha* (L.) Blume

UMBELLIFERAE

*Hydrocotyle verticillata* Thunberg

URTICACEAE

*Pilea glabra* S. Wats.  
*Pilea serpyllifolia* (Poir.) Wedd.  
*Urera caracasana* (Jacq.) Griseb.

VERBENACEAE

*Callicarpa acuminata* H.B.K.  
*Citharexylum berlandieri* Robinson  
*Hyptis verticillata* Jacq.  
*Petrea volubilis* L.

VIOLACEAE

*Hybanthus mexicanus* Ging.  
*Rinorea* sp.

VITACEAE

*Cissus rhombifolia* Vahl  
*Cissus sicyoides* L.  
*Vitis tiliifolia* Humb. & Bonpl.