



Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Santana Michel, Francisco J.; Lemus Juárez, Sebastián
Aristolochia occidentalis (Aristolochiaceae), una especie nueva de la subsección Pentandrae de
Colima y Jalisco, México
Acta Botánica Mexicana, núm. 36, septiembre, 1996, pp. 53 - 57
Instituto de Ecología, A.C.
Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57403606>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

**ARISTOLOCHIA OCCIDENTALIS (ARISTOLOCHIACEAE), UNA ESPECIE NUEVA
DE LA SUBSECCION PENTANDRAE DE COLIMA Y JALISCO, MEXICO**

FRANCISCO J. SANTANA-MICHEL

Instituto Manantlán de Ecología
y Conservación de la Biodiversidad
Centro Universitario Costa Sur
Universidad de Guadalajara
Independencia Nacional No. 151
Apartado Postal 64
48900 Axtlán, Jalisco, México

Y

SEBASTIAN LEMUS JUAREZ

Centro Universitario de Investigación
y Desarrollo Agropecuario
Universidad de Colima
Crucero Estación Tecomán
Carretera Colima-Manzanillo km 43
28100 Tecomán, Colima, México

RESUMEN

Se describe *Aristolochia occidentalis* sp. nov. procedente de la región limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco. La especie pertenece a la subsección *Pentandrae* Duchartre y está relacionada con *Aristolochia pringlei* Rose y *Aristolochia bracteosa* Duchartre.

ABSTRACT

Aristolochia occidentalis sp. nov. is described from near the border between the Mexican states of Colima and Jalisco. The species is a member of the subsection *Pentandrae* Duchartre. It is related to *Aristolochia pringlei* Rose and *Aristolochia bracteosa* Duchartre.

El género *Aristolochia* L. fue dividido por Duchartre (1854) en 5 secciones, de acuerdo con el número de estambres y lóbulos de la columna del ginostemo. La sección *Gymnolobus* Duchartre, la divide el mismo autor en dos subsecciones: *Pentandrae* Duchartre y *Hexandrae* Duchartre, con 5 y 6 estambres y lóbulos estigmáticos respectivamente. La subsección *Pentandrae* prácticamente se distribuye en casi todo México, con 35 especies conocidas (Pfeifer, 1970); para los estados de Jalisco y Colima

se han registrado 12 (Santana-Michel, 1993), además de la que aquí se propone como nueva, cuya descripción es la siguiente:

Aristolochia occidentalis Santana-Michel et S. Lemus sp. nov. Fig. 1.

Herbae perennes scandentes raro reptantes, pilosae 1-3 m longae; folia petiolata, sagittata, subcordata, apice acuminata, supra glabra vel sparsim pilosa, pagina subtiliter papillosa, subtus tomentosa; petioli (1.3)2-3(-4) cm longi, 0.5-0.7 mm diametro; lamina (2.5-)8-13 cm longa, (1-)3.5-4.5(-8.5) cm lata; flores axillares solitarii, pedunculis bracteolatis, bracteola lanceolato cordata, (1.5)-2-3(-3.7) cm longa, (0.5)-1-1.5(-2) cm lata; calyx rectilinearis lanceolatus, viridis pallidus fauce purpurea, hypanthio inconspicuo, utriculo ovoideo 7-8 mm longo, 4-5 mm diametro, syringe excentrica, 1.8-2 mm longa sensim angustata, tubo recto, piloso, (6-)7-9(-10) mm longo, 3-4 mm diametro, limbo lanceolato, 1-lobato, basi cordato, apicem versus acuto, piloso, subtiliter tuberculoso, (3-)3.5-4.7(-5) cm longo; columna 5-lobata, substipitata, 3-4 mm longa, 2.5-2.6 mm diametro, staminibus 5, tetraloculatis; capsula botuliformis, 2-2.5 lata, 1.5-2 cm diametro, 5-carpellata, basi dehiscens, septifraga; semina numerosa, triangulata, 4-5 mm longa, 3.8-4.9 mm lata, 0.5-0.7 mm crassa, nigra, superficie subtiliter tuberculata.

Hierbas perennes, trepadoras, rara vez rastreras, de 1-3 m de largo; hojas pecioladas, sagitado-subcordadas, ápice acuminado, haz glabro o con pelos dispersos, la superficie finamente papilosa, el envés tomentoso, pecíolo de (1.3)-2-3(-4) cm de largo por 0.5-0.7 mm de diámetro, lámina de (2.5-)8-13 cm de largo, (1-)3.5-4.5(-8.5) cm de ancho; flores axilares, solitarias, el pedúnculo bracteolado, de (0.6)-0.8-1.5(-1.7) cm de largo, 0.6-1 mm de diámetro, bracteolas lanceolado-cordadas, de (1.5)-2-3(-3.7) cm de largo, (0.5)-1-1.5(-2) cm de ancho, cáliz rectilineo, lanceolado de color verde claro y la garganta púrpura, hipantio no evidente, utrículo ovoideo, de 7-8 mm de largo, 4-5 mm de diámetro, el siringe excéntrico, de 1.8-2 mm de largo, angostándose al terminar, tubo recto, piloso, de (6-)7-9(-10) mm de largo, 3-4 mm de diámetro, limbo lanceolado, 1-lobado, agudo hacia el ápice, cordado en la base, piloso, finamente tuberculado, de (3-)3.5-4.7(-5) cm de largo, (0.5)-0.6-1.3(-1.5) cm de ancho; ginostemo 5-lobado, subestipitado, de 3-4 mm de largo, 2.5-2.6 mm de diámetro, estambres 5, tetraloculares. Fruto una cápsula botuliforme, 5-carpelar, de dehiscencia basicida, septifraga, de 2-2.5 cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro, semillas negras, numerosas, triangulares, de 4-5 mm de largo, 3.8-4.9 mm de ancho, 0.6-0.8 mm de grueso, la superficie finamente tuberculada.

HOLOTIPO: México, Colima, entre El Poblado y Peña Colorada, municipio de Minatitlán (límite entre Colima y Jalisco), 1000 m de altitud, en bosque tropical caducifolio, 18 de octubre de 1992, F. J. Santana-M. y S. Lemus J. 6206 (ZEA); Isotipos en ENCB, IBUG, MEXU, WIS.

Material adicional examinado: México, Colima, 1 km al E de Peña Colorada, 4 km al NW de Minatitlán, municipio Minatitlán, 1200 m de altitud, bosque tropical caducifolio, 29 octubre 1992, F. J. Santana-M. y S. Lemus J. 6045 (ZEA); Jalisco, 6 km al SW de La Huerta, municipio de La Huerta, 600 m de altitud, bosque tropical subcaducifolio, 26 de abril de 1992, F. J. Santana-M. 5645 (en fruto ZEA, IBUG).




Fig. 1. *Aristolochia occidentalis*. A. planta; B. detalle de una parte del limbo; C. detalle mostrando el siringe y ginostemo; D. ginostemo maduro; E. ginostemo inmaduro; F. fruto; G. semilla; H. variación de la hoja. Ilustración basada en la colección tipo (Santana-M. y S. Lemus J. 6206), elaborada por Enrique V. Sánchez Rodríguez.

Distribución conocida: México, estados de Colima y Jalisco.

Epoca de floración: de septiembre a noviembre.

Habitat: Bosque tropical caducifolio en suelos delgados, pedregosos con pendiente pronunciada y la presencia de las siguientes especies arbóreas: *Lysiloma acapulcense*, *L. microphyllum*, *Pseudobombax ellipticum*, *Bursera arborea*, *B. copallifera*, *B. fagaooides*, *B. bipinnata*, *Pseudosmodingium perniciosum*, *Plumeria rubra*, *Thouinia serrata*, *Trichilia americana*, *Leucaena macrophylla*, *Ceiba aesculifolia*. Bosque tropical subcaducifolio predominando las especies arbóreas: *Brosimum alicastrum*, *Annona purpurea*, *A. reticulata*, *Acacia glomerosa*, *Tabebuia rosea*, *Hura polyandra*, *Trichostigma mexicanum*, *Lysiloma microphyllum*.

Aristolochia occidentalis pertenece a la subsección *Pentandrae*; presenta flores rectilineas, el tubo más corto que el limbo, hojas anchas, pecioladas y parece estar relacionada con *Aristolochia pringlei* Rose y *Aristolochia bracteosa* Duchr., las cuales pueden separarse fácilmente (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Caracteres de *Aristolochia occidentalis* y especies afines.

| | <i>A. pringlei</i> | <i>A. bracteosa</i> | <i>A. occidentalis</i> |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Posición y crecimiento | voluble | procumbente | voluble |
| Lámina foliar | sagitado-hastada | ovada a triangular-lanceolada | sagitado-subcordada |
| Pecíolo | 1.5-4.5 cm | 3-5 mm | 1.3-4 cm |
| Flor | verde-amarillenta | purpúrea | verde clara |
| Limbo | lanceolado-acuminado 4-6.5 cm | ovado-lanceolado 2-4 cm | lanceolado-agudo 3-4.7 cm |

AGRADECIMIENTOS

Gracias a las monografías elaboradas por el Dr. Howard W. Pfeifer sobre el género *Aristolochia*, ha sido posible realizar este trabajo. Al Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad y al Departamento de Botánica de la Universidad de Wisconsin se reconoce el apoyo obtenido para el estudio de la flora de la región, especialmente al Dr. Hugh H. Iltis, Enrique J. Jardel Peláez, Bruce F. Benz y Luz Ma. Villarreal de Puga. Al Ing. Roberto González Tamayo se dan las gracias por la revisión

Santana-Michel et al.: *Aristolochia occidentalis*, Una Especie Nueva de Colima y Jalisco

y sugerencias al manuscrito. Y finalmente el primer autor agradece a sus compañeros colaboradores en el inventario y estudio de la flora de la Sierra de Manantlán: J. Antonio Vázquez G., Ramón Cuevas G., Luis Guzmán H., Nora M. Nuñez L., Leticia Hernández L., E. Valente Sánchez R., Theodore Cochrane, Mark Wetter, Judith Cevallos E., Elizabeth Muñoz M. y Jesús J. Rosales A.

LITERATURA CITADA

- Duchartre, P. 1854. Tentamen methodicae divisionis generis *Aristolochia*. Annales des Sciences Naturelles. Paris 54: 29-33.
- Pfeifer, H. W. 1970. A revision of the pentandrous species of *Aristolochia*. The University of Connecticut Publication Series. Storrs, Connecticut. 134 pp.
- Santana-Michel, F. J. 1993. Revisión taxonómica del género *Aristolochia* L. (Aristolochiaceae) en los estados de Jalisco y Colima, México. XII Congreso Mexicano de Botánica. Resumen. Mérida, Yucatán. p. 243.