



Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Rzedowski, Jerzy; Calderón de Rzedowski, Graciela
Una especie nueva de *Bursera* (Burseraceae) del estado de Oaxaca (México)
Acta Botánica Mexicana, núm. 52, octubre, 2000, pp. 75 - 81
Instituto de Ecología, A.C.
Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57405206>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

UNA ESPECIE NUEVA DE *BURSERA* (BURSERACEAE) DEL ESTADO DE OAXACA
(MÉXICO)*

JERZY RZEDOWSKI

Y

GRACIELA CALDERÓN DE RZEDOWSKI

Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Apartado postal 386
61600 Pátzcuaro, Michoacán

RESUMEN

Se describe como nueva y se ilustra a *Bursera laurihuertae*, árbol que es un componente importante del bosque tropical caducifolio del sector SE del estado de Oaxaca. La especie forma parte de la sección *Bursera*, pero se destaca por sus hojas predominantemente simples. Se le compara con *B. schlechtendalii* Engl., con *B. instabilis* McVaugh & Rzed. y con *B. lunanii* (Spreng.) Adams & Dandy, pero sin poder concluir acerca de su más cercano parentesco.

ABSTRACT

Bursera laurihuertae, an important tree element of the tropical deciduous forests of the southeastern part of the Mexican state of Oaxaca, is described and illustrated. The species is a member of section *Bursera*, but stands out because of its predominantly simple leaves. It is compared with *B. schlechtendalii* Engl., with *B. instabilis* McVaugh & Rzed., as well as with the Jamaican *B. lunanii* (Spreng.) Adams & Dandy, but no firm conclusion can be drawn concerning its close phylogenetic relationship.

Exploraciones botánicas realizadas en el estado de Oaxaca revelan la existencia de varios componentes del género *Bursera* que aún no han sido dados a conocer. Uno de ellos se describe a continuación.

***Bursera laurihuertae* Rzedowski & Calderón sp. n. Fig. 1.**

Arbor usque 8(15) m alta ut videtur dioecia glabra; truncus usque 30 cm diametro cortice exteriore papyraceo rubello exfolianti; folia maximam partem simplicia (unifoliolata)


* Trabajo realizado con apoyo económico del Instituto de Ecología, A.C. (cuenta 902-03), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

plerumque obovata usque 6(9) cm longa et 4(4.5) cm lata apice truncata vel rotundata margine integra basi cuneata discolora chartacea vel coriacea, aliqua trifoliolata, rarissime 5-foliolata; inflorescentiae masculae racemiformes vel paniculatae, flores masculi pentameri, calycis lobi late triangulares 0.2-0.3 mm longi, petala oblongo-elliptica 2-3 mm longa, stamina 10; inflorescentiae femineae racemiformes vel interdum uniflorae, flores feminei tetrameri masculinorum similes sed petalis latioribus, staminodia 8, ovarium triloculare, stylus brevissimus; drupae trivalvatae oblique ovoideae 9-11 mm longae apice acutae, pyrenae oblique ovoideae pseudoarillo roseo omnino indutae.

Árbol caducifolio, aparentemente dioico, resinoso y aromático al estrujarse, hasta de 8(15) m de alto, glabro, de copa amplia; tronco hasta de 30 cm de diámetro, su corteza externa rojiza, exfoliante en tiras grandes y delgadas; hojas concentradas en los ápices de ramillas cortas, o bien, alternas y espaciadas en ramillas largas de crecimiento nuevo, peciolos hasta de 1.5(3.5) cm de largo, con frecuencia todas simples (unifolioladas), con lámina angosta a ampliamente obovada, rara vez oblonga, hasta de 6(9) cm de largo y 4(4.5) cm de ancho, redondeada o más frecuentemente truncada, a menudo apiculada o cuspidada, pero no pocas veces retusa en el ápice, margen entero, base por lo general cuneada, pero llegando a ser redondeada a truncada, de consistencia cartácea a coriácea, verde oscura en el haz, mucho más clara en el envés, en ocasiones algunas ramillas llevan también hojas trifolioladas y excepcionalmente 5-folioladas, en las cuales el foliolo terminal es similar en forma a la hoja unifoliolada, mientras que los laterales tienden a ser elípticos y con frecuencia son de base redondeada y más o menos oblicua, los peciolulos miden 1 a 3 mm de largo y el raquis carece de alas; inflorescencias masculinas racemiformes o paniculadas, hasta de 6 cm de largo, flores masculinas pentámeras, lóbulos del cáliz anchamente triangulares, de 0.2 a 0.3 mm de largo, pétalos oblongo-elípticos, de 2 a 3 mm de largo, agudos en el ápice, estambres 10, todos semejantes, anteras oblongas, de ca. 0.7 mm de largo, gineceo rudimentario o ausente; inflorescencias femeninas racemiformes, hasta de 4 cm de largo, con cierta frecuencia reducidas a una sola flor, ésta tetrámera, similar a la masculina, pero con los pétalos un poco más anchos, tendiendo a ovados, estaminodios 8, sus anteras de ca. 0.5 mm de largo, ovario trilocular, estílo muy corto; drupas trivalvadas, oblicuamente ovoides, de 9 a 11 mm de largo y 5 a 6 mm de diámetro, agudas en el ápice, hueso oblicuamente ovoide, de 7 a 9 mm de largo, totalmente cubierto por el pseudoarilo de color rosado.

TIPO: México, Oaxaca: 3 km al NE de San Juan Guegoyache, municipio de Totolapan, alt. 950 m, ladera de roca ígnea con vegetación de bosque tropical caducifolio, 9.VIII.1976, J. Rzedowski 34383 (holotipo IEB, isótipos por distribuirse a ANSM, CAS, CHAPA, CIIDIR, ENCB, IBUG, MEXU, MICH, NY, OAX, TEX, XAL).

Material adicional examinado (la información correspondiente a los ejemplares depositados en NY fue amablemente proporcionada por el Dr. D. Daly): cerca de Las Fuentes, 8 km al W de Marilú, municipio de Magdalena Tequisistlán, S. Acosta C. 1360 (IEB, MEXU); 7 km del poblado La Chiviza al rancho Nhizavígena, carretera a Santiago Loallaga, municipio de Santa María Guienagati, J. I. Calzada 19298 (MEXU, NY); Barra de la Cruz, 1.5 km SE, laguna del cerrito, 15°49'59" N, 95°57'25" W, municipio de Santiago Astata, M. Elorsa 2134 (IEB); camino Pino Suárez - Duraznillo, municipio de Totolapan, A.



Bursera laurihuertae Rzed. & Calderón. A. rama con frutos; B. rama con flores; C. flor masculina; D. flor femenina; E. hueso. Ilustrado por Alfonso Barbosa.

Flores M. 1335 (ENCB, IEB); Guiengola, municipio de Tehuantepec, *T. MacDougall* 5 (MEXU); Llano Copal, Tequisistlán, municipio de Magdalena Tequisistlán, *T. MacDougall* 16 (MEXU); El Cerro Arenal, al N de Buenos Aires, municipio de Buenos Aires, *C. Martínez R.* 13 (IEB); El Cerro Cuachi, al O de Salina Cruz, municipio de Salina Cruz, *C. Martínez R.* 168 (IEB); San Vicente Mazatlán, 20 km al N del Morro, entrando por el crucero Santa Clara, 16°07' N, 95°25' W, municipio de Salina Cruz, *C. Martínez* 1561 (IEB); El Camarón, ca. 35 miles west of Tehuantepec, along the Panamerican highway between Oaxaca and Tuxtla Gutierrez, municipio de Nexapa, *R. McVaugh* 21859 (ENCB); Tehuantepec - Juchitán, *F. Miranda* 8476 (MEXU); cerca de Juchitán, municipio de Juchitán, *F. Miranda* 8547 (MEXU); 2 km al N de La Ceiba, municipio de Totolapan, *J. Rzedowski* 34391 (IEB); 3 km al NW de El Camarón, sobre la carretera a Oaxaca, municipio de Nexapa, *J. Rzedowski* 35428 (IEB); 3 km al NE de San Juan Guegoyache, municipio de Totolapan, *J. Rzedowski* 35649 (IEB); cerca de La Chivera, 8 km al SE de Santa María Guienagati, sobre el camino a Ixtepec, municipio de Santa María Guienagati, *J. Rzedowski* 38137 (IEB); 9 km al SE de Totolapan, rumbo a Zoquitlán, municipio de Totolapan, *A. Saynes* 1197 (IEB, MEXU); a 10 km de Juchitán, rumbo a Tehuantepec, municipio de Juchitán, *A. Saynes V.* 1551 (ENCB, IEB, MEXU, NY); río Cotita, al NO de Tehuantepec, municipio de Tehuantepec, *R. Torres* 8371 (IEB, MEXU); rancho Ricardo, al N de Buenos Aires, entrando por Hierba Santa, municipio de Buenos Aires, *R. Torres y C. Martínez* 7308 (IEB); Cerro de la Cueva de Lleza, municipio de Tehuantepec, *F. Ventura* 16446 (IEB); cerro Guiengola, municipio de Tehuantepec, *F. Ventura* 16450 (IEB); El Camarón, municipio de Nexapa, *F. Ventura* 16518 (IEB); San José de Gracia, municipio de Totolapan, *F. Ventura* 16525 (IEB); Torre de microondas, municipio de Jalapa de Marqués, *F. Ventura* 16538 (IEB); cerca de la presa, municipio de Jalapa de Marqués, *F. Ventura* 16541 (IEB); El Salado, municipio de Magdalena Tequisistlán, *F. Ventura* 16550 (IEB); Marilú, municipio de Magdalena Tequisistlán, *F. Ventura* 16554 (IEB); cerca de la Esc. Técnica Agropecuaria, municipio de Totolapan, *F. Ventura* 16575 (IEB); Mano del León, municipio de Santa María Zoquitlán, *F. Ventura* 16579 (IEB); 35 mi. SE of Jct. of road to Mitla and Hwy. 190, municipio de Totolapan, *Wallace et al.* 459 (MEXU, NY); Huazantlán del Río, Cerro de Huazantlán, ladera sur, municipio de San Mateo del Mar, *D. Zizumbo y P. Colunga* 306 (MEXU).

La especie parece estar restringida en su distribución al sector SE del estado de Oaxaca, donde a menudo forma parte importante del bosque tropical caducifolio en altitudes entre 0 y 1400 m. Se le ha registrado con particular abundancia en la cuenca del río Tehuantepec y también es frecuente en las porciones bajas de la franja meridional del Istmo, donde comparte con *B. simaruba* (L.) Sarg. el nombre común de "mulato". En la región indígena huave se le denomina "jit kiek" (comida de pájaro), se le emplea en cercas vivas y tiene usos medicinales.

Su época de floración corresponde a los meses de marzo y abril, cuando la mayor parte de las veces los árboles se encuentran sin hojas.

En el cuadro 1 se comparan algunas características de aparente mayor significación entre *B. laurihuertae* y las restantes especies conocidas de México, con corteza exfoliante roja o rojiza (pertenecientes a la sección *Bursera*), que presentan al menos algunas hojas unifolioladas.

Como lo enfatizaron Rzedowski y Kruse (1979), la tendencia a la reducción del número de foliolos es un carácter que se ha manifestado independientemente en diversos linajes dentro del género. Así, *B. crenata* P. G. Wilson y *B. trimera* Bullock (al igual que

probablemente también *B. rzedowskii* Toledo), que tienen las hojas finamente crenado-serradas, definen una línea separada que, de acuerdo con el nuevo esquema filogenético propuesto por Becerra y Venable (1999), forman parte del conjunto llamado “fragilis”, que incluye entre otras especies a *B. kerberi* Engl., *B. multijuga* Engl. y *B. lancifolia* (Schlecht.) Engl.

A su vez, aunque con ciertas reservas, estos últimos autores ubican a *B. schlechtendalii* Engl. y a *B. chemapodicta* Rzed. & Ortiz en el grupo que denominan “fagaroides”, a un lado de *B. fagaroides* (H.B.K.) Engl., *B. ariensis* (H.B.K.) McVaugh & Rzed. y de *B. aptera* Ramírez.

Cuadro 1. Comparación de algunos caracteres de *Bursera laurihuertae* con los de otras especies mexicanas de *Bursera* de corteza exfoliante roja o rojiza y hojas, al menos ocasionalmente unifolioladas.

	Número de foliolos	Forma de la hoja unifoliolada	Margen de la lámina foliar	Pubescencia de la hoja	Infrutescencia	Forma y largo del fruto
<i>B. chemapodicta</i>	1	ovada a obovada	entero	presente	frutos solitarios a fasciculados	subglobosa a obovoide 5 a 7 mm
<i>B. crenata</i>	1	oblanceolada a elíptica u oblonga	finamente crenado-serrado	ausente	frutos solitarios o en cimas	oblicuamente obovoide 6 a 7 mm
<i>B. instabilis</i>	1,3 (5)	ovada a lanceolada o elíptica	entero	presente en la base del envés	frutos en racimos o solitarios	oblicuamente obovoide 6 a 8 mm
<i>B. krusei</i>	(1,2) 3	lanceolada a ovada	entero	presente	frutos en racimos o panículas	ovoides a subglobosa 6 a 8 mm
<i>B. laurihuertae</i>	1,3 (5)	obovada a elíptica	entero	ausente	frutos en racimos o solitarios	oblicuamente ovoide 9 a 11 mm
<i>B. rzedowskii</i>	1	elíptica a oblonga u oblanceolada	subentero a inconspicuamente serrado	ausente	frutos solitarios o fasciculados	subglobosa a ovoide 5 a 8 mm
<i>B. schlechtendalii</i>	1	elíptica a obovada	entero	ausente	frutos solitarios o fasciculados	oblicuamente ovoide 4 a 8 mm
<i>B. trimera</i>	(1) 3	elíptica a oblonga u oblanceolada	finamente serrado	ausente	frutos solitarios o fasciculados	subglobosa a oblicuamente obovoide 5 a 7 mm

La afinidad de *B. instabilis* McVaugh & Rzed. con el conjunto llamado "simaruba" queda confirmada también con el análisis de ADN realizado por Becerra y Venable (op. cit.) y en función de sus rasgos morfológicos es probable que *B. krusei* Rzed. (que no fue muestreada para el mencionado estudio) igualmente pertenezca aquí.

Las características de la hoja de *B. laurihuertae* (Bl) son muy semejantes a los de *B. schlechtendalii* (Bs) y muchos ejemplares que se mencionan en la lista que antecede habían sido identificados y distribuidos con este último nombre. La similitud llega a ser tan grande, que a veces resulta difícil la identificación de ejemplares totalmente unifoliolados y estériles, procedentes del área en que ambas especies conviven.

Sin embargo, los dos taxa discrepan formalmente en los siguientes caracteres:

1. Bl desarrolla con mucha frecuencia hojas trifolioladas, particularidad que no se ha observado en Bs en ninguna de las poblaciones de su amplia área de distribución, que se extiende desde el norte de México hasta la Península de Yucatán y Guatemala.

2. Las flores masculinas y frecuentemente las femeninas de Bl se agrupan en inflorescencias ramificadas, mientras que las de Bs nacen solitarias, fasciculadas o subfasciculadas.

3. Los frutos maduros y frescos de Bl miden 9 a 11 mm de largo y se insertan sobre pedicelos y pedúnculos que por lo general son rectos y en total por lo común miden 6 mm o más de longitud; en cambio los frutos de Bs alcanzan sólo 4 a 8 mm de largo y sus pedúnculos, casi siempre notablemente encorvados, son de menos de 5 mm de longitud.

4. Otros rasgos de más difícil descripción y cuantificación son:

a) la corteza externa exfoliante en Bl es de color más claro que en Bs;

b) la base del fruto en Bl es truncada, a diferencia de Bs, donde suele ser redondeada u obtusa.

Con el conjunto de las mencionadas diferencias no es seguro de que exista un vínculo filogenético cercano entre las dos especies y se plantea la posibilidad de que la similitud en la morfología foliar puede obedecer a un proceso evolutivo de convergencia.

Otra especie con la que cabe hacer comparación es *B. instabilis* que extiende su área de distribución a lo largo del litoral pacífico de Jalisco a Oaxaca. Esta última suele diferir en forma notable de *B. laurihuertae* en sus hojas (o foliolos) ovadas a lanceoladas o elípticas, agudas o acuminadas en el ápice, de textura más delgada y pubescentes en la parte basal del envés, así como en las inflorescencias más largas y ramificadas y en los frutos más encorvados.

Sin embargo, al revisar una extensa serie de ejemplares de herbario de *B. instabilis*, los que escriben han podido observar una extraordinaria variabilidad que atañe tanto a la forma de las hojas, como de inflorescencias y de frutos, de suerte que, salvo el carácter de la pubescencia, ninguno de los mencionados resulta plenamente contrastante.

En consecuencia, tampoco procedería excluir en forma definitiva la posibilidad de una relación de parentesco relativamente próximo.

Por otro lado, en las islas del archipiélago antillano (así como en Venezuela) crecen también especies pertenecientes a la sección *Bursera* con corteza rojiza exfoliante y varias se han descrito con hojas uni o uni a trifolioladas de margen entero. De este grupo (que no ha sido estudiado por Becerra y Venable (op. cit.)) y en virtud de sus hojas elípticas

a obovadas, la planta jamaiquina *B. lunanii* (Spreng.) Adams & Dandy (antes conocida como *B. simplicifolia* DC.) tiene bastante parecido con *B. laurihuertae*. No obstante, la primera se caracteriza por sus hojas escasamente discoloras y de pecíolo más grueso, sus flores (al menos las masculinas) se agrupan en panículas racemiformes relativamente largas, son muy pequeñas (de escasos 2 mm de longitud) y tienen los lóbulos del cáliz de aproximadamente la mitad del largo de los pétalos, mientras que los frutos (de acuerdo con la información amablemente proporcionada por el Dr. D. Daly) son aún más grandes que los de *B. laurihuertae*. De lo anterior cabe deducir que posiblemente esta similitud es también de tipo convergente y no refleja clara relación de origen común cercano.

El nombre de este taxón se dedica para honrar la memoria de la recientemente desaparecida botánica mexicana Laura Huerta Múzquiz (1913-2000), destacada estudiosa de la fitoflora de los litorales de nuestro país.

LITERATURA CITADA

- Becerra, J. y D. L. Venable. 1999. Nuclear ribosomal DNA phylogeny and its implications for evolutionary trends in Mexican *Bursera* (Burseraceae). Amer. Journ. Bot. 86: 1047-1057.
Rzedowski, J. y H. Kruse. 1979. Algunas tendencias evolutivas en *Bursera* (Burseraceae). Taxon 28: 103-116.

Recibido en julio de 2000.
Aceptado en octubre de 2000.