



Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Durán Espinosa, Carlos M.; Avendaño Reyes, Sergio  
Una nueva especie de Ribes (Grossulariaceae) de Michoacán, México  
Acta Botánica Mexicana, núm. 60, octubre, 2002, pp. 13 - 18  
Instituto de Ecología, A.C.  
Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57406003>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

UNA NUEVA ESPECIE DE *RIBES* (GROSSULARIACEAE) DE MICHOCÁN, MÉXICO

CARLOS M. DURÁN-ESPINOSA  
e-mail: duranc@ecologia.edu.mx

Y

SERGIO AVENDAÑO REYES  
e-mail: avenda@ecología.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.  
Departamento de Sistemática Vegetal  
Apartado postal 63  
91000 Xalapa, Veracruz

RESUMEN

Se propone como especie nueva para la ciencia a *Ribes grandisepalum*, un arbusto que habita en el bosque de *Abies* en el estado de Michoacán, México. Este taxón pertenece al subgénero *Coreosma* sección *Calobotrya* (Spach) Jancz. (Grossulariaceae) y se encuentra estrechamente relacionado con *Ribes pringlei* Rose. Se distingue de éste por presentar sépalos glandulosopubescentes, que alcanzan tamaños de 5.5-8.5 mm de largo, pedicelos de 7-17 mm de largo y pelos glandulares en el ovario y el fruto.

Palabras clave: Grossulariaceae, México, Michoacán, *Ribes*.

ABSTRACT

*Ribes grandisepalum*, a shrub that lives in the forest of *Abies* in the state of Michoacan, Mexico, is proposed as a new species to science. The new taxon belongs to subgenus *Coreosma* section *Calobotrya* (Spach) Jancz. (Grossulariaceae) and is related to *Ribes pringlei* Rose. It is distinguished by its glandular-pubescent sepals that reach sizes of 5.5-8.5 mm in length, pedicels 7-17 mm in length and the ovary and fruit with glandular hairs.

Key words: Grossulariaceae, Mexico, Michoacan, *Ribes*.

Al examinar ejemplares del género *Ribes* para la Flora de Veracruz (Durán-Espinosa, 2001), se detectaron especímenes determinados originalmente como *R. ciliatum*, cuyas características con respecto al tamaño de los sépalos y pedicelos, así como al indumento de los frutos, no correspondían a dicha especie (Cuadro 1). Por tal motivo, se realizó una revisión exhaustiva de los taxa de este género descritos para México y se llegó a la conclusión de que se trata de una especie nueva.

*Ribes* L. (Grossulariaceae) es un género cosmopolita con cerca de 150 taxa (Sinnott, 1985), incluye diversas especies cultivadas por sus frutos comestibles, conocidos como grosellas. La mayoría se encuentra en el hemisferio norte, aunque para la región de los Andes se han registrado 35. La delimitación de *Ribes* es controversial, debido a que en este género se reconocen dos grupos: el que incluye plantas espinosas con unos cuantos racimos de flores escasas (uva-espinas) y el constituido por taxa carentes de espinas con racimos de numerosas flores (grosellas). Tales conjuntos son reconocidos indistintamente como dos géneros: *Grossularia* y *Ribes* (Sponberg, 1972); o bien, dentro de *Ribes* como subgéneros (Coville y Britton 1908; Berger, 1924; Poyarkova 1939; Sinnott 1985). Con estudios recientes sobre filogenias moleculares se han detectado también dos grupos (Messinger et al., 1999); sin embargo, no existe consenso en la circunscripción de los mismos.

***Ribes grandisepalum* C. Durán-Espinosa & S. Avendaño, sp. nov. Fig. 1.**

Frutex ad 4 m altus; folia 2-6.5 cm longa et lata, palmata, 3-5 lobata, alternatim disposita; inflorescentiae 3.5-7 cm longae, racemosae, glandulos-pubescentes, pedicelli 7-17 mm longi, basaliter bracteati, bracteae 7-26.5 mm longae, lanceolatae vel foliaceae; flores albidi vel subrosei; hypanthium 6.5-10 mm longum, 4.5-8.5 mm latum, tubulosum; sepala 5.5-8.5 mm longa, extus glandulos-pubescentia, petala 3.8 mm longa, glabra; stamna linearia, filamenta 4.3-5 mm longa, antherae oblongae, basifixae; ovarium 4.5-6 mm longum, inferum, pyriforme, glandulosum; stylus 10.5 mm longus, furcatus ad apicem; fructus 8.3-9 mm longi, 5.2-5.5 mm lati, baccati, rubelli vel purpurati, glandulosi; semina ellipsoidea, numerosa.

Arbusto de 2.5-4 m de alto, sin espinas, con la corteza fisurada, las ramas cuando adultas escasamente glandulos-pubescentes o glabras. Hojas alternas, pecioladas, palmadamente lobadas, de 2-6.5 cm de largo, 2-6.5 cm de ancho, con 3-5 lóbulos agudos, cuando presentan 5 lóbulos, los 2 basales más pequeños que los 2 intermedios y el apical, el lóbulo apical tan grande como los lóbulos intermedios o frecuentemente duplicando su tamaño, margen irregularmente dentado, glandulos-pubescente, ápice agudo, base subcordada, senos abiertos, superficie adaxial con pelos glandulares esparcidos, la abaxial glandulos-pubescente sobre todo a lo largo de las venas, la venación actinódroma marginal, sumergida en el haz, sobresaliente en el envés, pecíolo de 1.5-4 cm de largo, 0.4-0.8 mm de ancho, glandulos-pubescente, base dilatada, envainante, con pelos glandulares hasta de 1.5 mm de largo. Inflorescencia racemosa, de ca. 12 flores, de 3.5-7 cm de largo, glandulos-pubescente, pedúnculo de 3-4.3 cm de largo, 0.9-1.1 mm de ancho. Flores blanquecinas a rosadas, pedicelos de 7-17 mm de largo, 0.4-0.5 mm de ancho, glandulos-pubescentes, brácteas lanceoladas a foliáceas, ápice acuminado, sésiles, de 7-26.5 mm de largo, 2-7.5 mm de ancho, glandulos-pubescentes, bracteolas lanceoladas, ápice acuminado, sésiles, de 2.5-6 mm de largo, 0.3-0.8 mm de ancho, glandulos-pubescentes; hipantio tubular, de 6.5-10 mm de largo, 4.5-8.5 mm de ancho, glandulos-pubescente; sépalos 5, oblongos, de 5.5-8.5 mm de largo, 2.2-2.8 mm de ancho, dorsalmente glandulos-pubescentes, ventralmente glabros; pétalos 5, orbiculares, de 3.8 mm de largo, 3.5 mm de ancho, glabros, alternando con los sépalos; estambres 5, lineares, incluidos, filamentos de 4.3-5 mm de largo, 0.2-




Fig. 1. *Ribes grandisepalum*. A. rama con inflorescencia; B. base del pecíolo de la hoja; C. fragmento de pecíolo; D. base de la hoja; E. superficie adaxial de la hoja; F. flor abierta; G. pétalo; H. estambres; I. estilo; J. rama con infrutescencia. Ilustración de E. Saavedra basada en el ejemplar de Rzedowski 46282.

0.3 mm de ancho, insertos internamente a la superficie de la copa floral por arriba de la mitad, alternando con los pétalos, anteras oblongas, de 1.3-1.6 mm de largo, 0.7-0.8 mm de ancho, basifijas, la dehisencia longitudinal; ovario ínfero, piriforme, de 4.5-6 mm de largo, 3 mm de ancho, glandular, estilo de 10.5 mm de largo, 0.4-0.7 mm de ancho, bifurcado apicalmente, estigmas truncados. Fruto una baya, de color rojo a guinda, ovoide, de 8.3-9 mm de largo, 5.2-5.5 mm de ancho, glandular, con vestigios del cáliz; semillas negras, numerosas, de 2.2-3 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho, elipsoides, regularmente comprimidas.

TIPO: México, Michoacán, mpio. Zinapécuaro, 1 km al NW de Laguna Larga, sobre el camino a Yerba Buena, Rzedowski 46282 (Holotipo: XAL; Isotipos: IEB, MEXU).

Material adicional examinado. Mpio. Pátzcuaro, parte alta del Cerro del Burro, cerca de Cuanajo, H. Díaz B. 1014 (MEXU); mpio. Huiramba, parte alta del cerro La Taza, H. Díaz B. y S. Zamudio R. 2623 (IEB); mpio. Zinapécuaro, alrededores de Laguna Larga, Los Azufres, H. Díaz B. 4681 (IEB, XAL); mpio. Santa Clara del Cobre, Cerro del Burro, J. M. Escobedo 868, 1399 (IEB, MEXU, XAL); mpio. Santa Clara del Cobre, Cerro del Burro, E. Pérez C. 48 y 270 (IEB); mpio. Queréndaro, Cañada del Real, cerca de San José de la Cumbre, J. S. Martínez 1310 (IEB, XAL); mpio. Ciudad Hidalgo, paraje El Pino, cerca de Huajúmbaro, J. S. Martínez 1450 (ENCB, IEB, XAL); mpio. Zinapécuaro, ladera SW del cerro San Andrés, S. Zamudio R. 5519 (IEB).

El epíteto específico de este nuevo taxón se deriva del tamaño de los sépalos, carácter que lo distingue del resto de las especies descritas con anterioridad para México (Janczewski, 1907; Coville y Britton, 1908). Se le conoce solamente del estado de Michoacán, donde habita en el bosque de *Abies* en cañadas pronunciadas, en altitudes que van de los 2500 a los 3200 m s.n.m. Se le encuentra en floración entre los meses de marzo a mayo.

La especie más cercanamente relacionada corresponde a *R. pringlei* Rose, que se distribuye en el Estado de México y en el Distrito Federal. A este respecto cabe comentar que en el estudio más reciente de las especies de *Ribes* del Valle de México realizado por Calderón de Rzedowski (2001), se considera a dicha especie como sinónimo de *R. ciliatum*.

Aunque algunos caracteres de *R. grandisepalum* y *R. pringlei* son variables, como el tamaño del hipantio, de los sépalos y de los pedicelos de las flores, y en ocasiones pueden solaparse los intervalos entre una especie y otra, dentro del conjunto se manifiestan como taxa separados. Por otra parte, *R. pringlei* se diferencia de *R. ciliatum* porque presenta frutos glandulares, así como otros rasgos que pueden apreciarse en el Cuadro 1 (Coville y Britton, 1908; Janczewski, 1907).

#### AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Francisco Lorea Hernández por la revisión crítica del manuscrito y la traducción de la diagnosis al latín y al Sr. Edmundo Saavedra por la estupenda ilustración del ejemplar.

Cuadro 1. Características diferenciales comparativas entre *Ribes grandisepalum* y especies afines.

Caracteres	<i>Ribes grandisepalum</i> C. Durán- Espinosa & S. Avendaño	<i>Ribes pringlei</i> Rose	<i>Ribes ciliatum</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	<i>Ribes affine</i> Kunth	<i>Ribes orizabae</i> Rose
Haz de la hoja	con pelos glandulares esparcidos	con pelos glandulares esparcidos	glanduloso a glabro	escasamente pubescente a glabro	glabro
Envés de la hoja	glanduloso- pubescente sobre las venas	glanduloso- pubescente sobre las venas	densamente glanduloso- pubescente	pubescente sobre las venas	glanduloso- pubescente sobre las venas
Pecíolos	glanduloso- pubescentes	glanduloso- pubescentes	densamente glanduloso- pubescentes	pubescentes	glanduloso- pubescentes
Hipantio largo (mm) ancho (mm)	6.5-10 4.5-8.5	6-8 3.5-4	4-5	2-3.5	4
Sépalos largo (mm) pubescencia	5.5-8.5 glanduloso- pubescentes	4-6 glanduloso- pubescentes	4.5 pubescentes	2.5-4 pubescentes	3.8 pubescentes
Color de las flores	blanquecino a rosado	verde pálido a púrpura	blanco-verdo- so, rosado o crema	blanco a ro- sado	
Largo del pedicel- lo (mm)	7-17	3-12	4-7	3-8	5-8
Brácteas largo (mm) ancho (mm)	7-26.5 2-7.5	5.5-9.5 1.8-3	4-9.2 0.7-3.3	4.5-15 1-8	6-7.5 1.5-1.9
Ovario	glandular	glandular	glabro	glabro	glabro
Fruto indumento	glandular	glandular	glabro	glabro	glabro

#### LITERATURA CITADA

- Berger, A. 1924. A taxonomic review of currants and gooseberries. New York Agric. Exp. Sta. Techn. Bull. 109: 1-118.  
 Coville, F. V. y N. L. Britton. 1908. Grossulariaceae. N. Amer. Fl. 22: 193-225.

- Durán-Espinosa, C. 2001. Grossulariaceae. Flora de Veracruz 122: 1-15.
- Janczewski, E. 1907. Monographie des groseillers, *Ribes* L. Mém. Soc. Phys. Genève 35: 199-517.
- Messinger, W., K. Hummer y A. Liston. 1999. *Ribes* (Grossulariaceae) phylogeny as indicated by restriction-site polymorphisms of PCR-amplified chloroplast DNA. Pl. Syst. Evol. 217: 185-195.
- Poyarkova, A. I. 1939. Ribesoideae. In: Komarov, V. L. & S. V. Yuzepchuk (eds.). Flora of the U.S.S.R. Israel Program for Scientific Translations, for the Smithsonian Institution and National Science Foundation. Washington, D.C., Jerusalem. pp. 175-208.
- Rzedowski, G. C. de. 2001. Grossulariaceae. In: Rzedowski, G. C. de, J. Rzedowski y colaboradores. Flora fanerogámica del Valle de México. 2a. ed., Instituto de Ecología, A.C. y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pátzcuaro, Michoacán. pp. 215-219.
- Sinnott, P. Q. 1985. A revision of *Ribes* L. subg. *Grossularia* (Mill.) Pers. sect. *Grossularia* (Mill.) Nutt. (Grossulariaceae) in North America. Rhodora 87: 189-286.
- Sponberg, S. A. 1972. The genera of Saxifragaceae in the southeastern United States. J. Arnold Arbor. 53: 409-498.

Recibido en agosto de 2001.

Aceptado en agosto de 2002.