

Acta Botánica Mexicana

ISSN: 0187-7151

rosamaria.murillo@inecol.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Ibarra Manríquez, Guillermo; Mendoza, Ana
Reinhardtia elegans Mart. (Arecaceae): una palma endémica del bosque mesófilo de montaña
mexicano
Acta Botánica Mexicana, núm. 63, junio, 2003, pp. 47 - 54
Instituto de Ecología, A.C.
Pátzcuaro, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57406302>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

**REINHARDTIA ELEGANS MART. (ARECACEAE): UNA PALMA ENDÉMICA
DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA MEXICANO**

GUILLERMO IBARRA-MANRÍQUEZ

Centro de Investigaciones en Ecosistemas
Universidad Nacional Autónoma de México
Antigua carretera a Pátzcuaro No. 8701
Col. San José de la Huerta
58190 Morelia, Michoacán, México

y

ANA MENDOZA

Departamento de Ecología Evolutiva
Instituto de Ecología
Universidad Nacional Autónoma de México
Apartado Postal 70-275
04510 México, D.F.

RESUMEN

Se registra la presencia de *Reinhardtia elegans* Mart. (Arecaceae), una palma endémica de algunos bosques mesófilos de montaña de Oaxaca y Chiapas, cuya importancia no ha sido debidamente resaltada en los trabajos florísticos del sureste de México. Se aporta información sobre algunos aspectos del hábitat y estructura poblacional de la especie en la región de La Chinantla, Oaxaca, México.

Palabras clave: Arecaceae, bosque mesófilo de montaña, Chiapas, México, Oaxaca, palmas, *Reinhardtia*.

ABSTRACT

Reinhardtia elegans Mart. (Arecaceae) is a Mexican endemic species occurring in some cloud forests of Oaxaca and Chiapas, whose importance has been poorly documented in floristic studies of southeastern Mexico. We provide information about its habitat and population structure in La Chinantla region in Oaxaca, Mexico.

Key words: Arecaceae, cloud forest, Chiapas, Mexico, Oaxaca, palms, *Reinhardtia*.

INTRODUCCIÓN

La familia Arecaceae ha sido considerada como un grupo de plantas bien definido, cuyos miembros son reconocidos con relativa facilidad. Entre las monocotiledóneas, la riqueza taxonómica del grupo es notable y sólo es menor a la documentada para las familias Liliaceae, Orchidaceae y Poaceae (Heywood, 1978). Las arecáceas están constituidas por 198 a 212 géneros y entre 2,650 a cerca de 3,000 especies, las cuales se distribuyen prácticamente en todas las áreas tropicales y subtropicales del Neotrópico y Paleotrópico, siendo su mayor centro de riqueza el sureste de Asia y con una menor representación de especies en África (Heywood, 1978; Cronquist, 1981; Uhl y Dransfield, 1987; Mabberley, 1993; Moraes et al., 1995). En México, la familia se encuentra representada por 22 géneros (Uhl y Dransfield, 1987), sobresaliendo en diversidad específica *Chamaedorea*, con alrededor de 45 especies (Hodel, 1992).

Las palmas son también una familia envuelta en una compleja problemática taxonómica que hace difícil la circunscripción de las subfamilias, géneros o especies (p. ej. Dahlgren et al., 1985; Uhl y Dransfield, 1987; Hodel, 1992; Henderson et al., 1995). Un elemento importante para justificar lo anterior es que este grupo tiene una deficiente representación en los herbarios, ya que en general se le omite en los trabajos de prospección florística. Lo anterior se debe principalmente a que la colecta de ejemplares de herbario es muy impráctica. Además, muchas de sus especies poseen individuos de gran tamaño, densidades poblacionales reducidas y/o una distribución geográfica muy restringida, lo que dificulta localizarlas y caracterizarlas adecuadamente (ver por ejemplo Hodel, 1992; Henderson et al., 1995).

El género *Reinhardtia*, constituido por seis especies (*R. elegans* Liebm., *R. gracilis* (H. Wendl.) Burret, *R. koschnyana* (H. Wendl. & Dammer) Burret, *R. latisecta* (H. Wendl.) Burret, *R. paiewonskiana* Read, Zanoni & Mejía y *R. simplex* (H. Wendl.) Burret, es un buen ejemplo de la falta de representatividad de sus especies en los herbarios, si bien esta última condición es menos evidente para *R. gracilis*. La distribución del género es fundamentalmente mesoamericana, aunque de acuerdo con Henderson et al. (1995), dos especies se han encontrado en el noroeste de Colombia (Cuadro 1). *Reinhardtia paiewonskiana* es la única presente en el área antillana, a la cual se encuentra restringida (Read et al., 1987; Henderson, 2002). En México se han registrado tres especies que muestran una distribución hacia la vertiente atlántica del sureste del país: *R. elegans* (Chiapas y Oaxaca), *R. gracilis* (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz) y *R. simplex* (Chiapas), esta última citada recientemente para la región Lacandona, Chiapas, por Martínez et al. (1994). Tales plantas habitan básicamente en comunidades de bosque mesófilo de montaña y bosque tropical perennifolio, en sitios que no sobrepasan los 1,600 m de altitud (Moore, 1957a, b; Ibarra-Manríquez, 1988; Long y Heat, 1991; Martínez et al., 1994; Quero, 1994; Henderson et al., 1995; Henderson, 2002).

El presente trabajo forma parte de una investigación sobre la demografía comparada de las especies mexicanas de *Reinhardtia*. En particular, en este estudio se dan a conocer aspectos del hábitat y atributos demográficos de una población de *R. elegans* Mart., censada y colectada recientemente en la región de La Chinantla, Oaxaca y cuya presencia había pasado inadvertida en los trabajos florísticos realizados en la parte sureste de México.

Cuadro 1. Distribución geográfica de las especies de *Reinhardtia*. Abreviaturas de las especies: ELE (*R. elegans* Liebm.), GRA (*R. gracilis* (H. Wendl.) Burret), KOS (*R. koschnyana* (H. Wendl. & Dammer) Burret, LAT (*R. latisecta* (H. Wendl.) Burret), PAI (*R. paiewonskiana* Read, Zanoni & Mejia), SIM (*R. simplex* (H. Wendl.) Burret).

Subgéneros	<i>Malortiea</i>			<i>Reinhardtia</i>		
País	GRA	KOS	SIM	ELE	LAT	PAI
México	■ ■		■ ■	■ ■		
Belice	■ ■				■ ■	
Guatemala	■ ■				?	
Honduras	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	
Nicaragua	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	
Costa Rica	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	
Panamá		■ ■	■ ■			
Colombia		■ ■	■ ■			
República Dominicana						■ ■

IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE *R. ELEGANS* EN MÉXICO

La presencia de *R. elegans* en México fue indicada primeramente por Standley (1920-1926). Sin embargo, cabe destacar que a pesar del intenso trabajo florístico que se ha realizado en las últimas décadas por diversas instituciones botánicas en el sureste del país, *R. elegans* no ha sido colectada recientemente e incluso, no cuenta con ejemplares que documenten su presencia en los herbarios mexicanos. Esta especie no ha sido mencionada en los inventarios florísticos de Chiapas (p. ej. Breedlove, 1986, Long y Heat, 1991; Martínez et al., 1994), ni en las publicaciones similares producidas para Tabasco y Veracruz (Cowan, 1983; Sosa y Gómez-Pompa, 1994), estados que cuentan con localidades potenciales para su establecimiento. En su estudio monográfico de las palmas de Veracruz, Quero (1994) señala que esta especie probablemente se encuentra en dicho estado, citando como ejemplares de referencia material depositado en el herbario BH y una colecta supuestamente también de Oaxaca, perteneciente a I. Calzada (16410), la cual no se ha hallado en el herbario MEXU. Los esfuerzos realizados por diversas instituciones botánicas en el área mesoamericana tampoco han encontrado localidades adicionales para *R. elegans*. El registro de esta especie indicado por Henderson et al. (1995) y Henderson (2002) para el distrito de Olancho, Honduras, es de dudosa validez, ya que el ejemplar que aparentemente lo respalda no ha sido localizado en el herbario K (A. Henderson, com. pers.).

En 1996 se localizó una población de la especie en los alrededores del poblado de Santo Domingo Lataní, municipio de Santiago Choapam, lo que resulta un hallazgo interesante, ya que de acuerdo con Moore (1957a), la última colecta de esta palma había sido realizada en Oaxaca, en 1946, por E. Hernández-X. (número de colecta 1245) y J. Sharp. El mencionado autor también indica que la especie es endémica de México, conocida de Oaxaca (municipios de Ixtlán de Juárez, Niltepec, Santiago Choapam) y de Chiapas, citando una localidad de ubicación incierta ("mountains near Fenix"). Esta área, conocida actualmente como Rancho Fénix, está situada al este de la Hacienda Monserrate (16°33' N, 94°00' W).

La población localizada recientemente se encuentra ubicada alrededor de 95°54'40" W y 17°24'00" N, donde se desarrolla en altitudes entre 900-1,150 m s.n.m. Los ejemplares que certifican este registro (Guillermo Ibarra Manríquez 4045, 4046, 4070, 4071, 4160, 4161) serán depositados en los herbarios IEB, MEXU, MO y XAL. Hasta el momento, *R. elegans* ha sido encontrada exclusivamente como componente del bosque mesófilo de montaña, aunque no está incluida en el listado de géneros que poseen especies típicamente adscritas a este tipo de vegetación en México (Rzedowski, 1996).

El bosque mesófilo de montaña en la región de La Chinantla es una comunidad bastante heterogénea en sus atributos estructurales y en su composición florística (Meave et al., 1996). *Reinhardtia elegans* se establece en áreas muy inaccesibles, sobre suelos profundos, oscuros, aparentemente ricos en materia orgánica, sobre pendientes de hasta 40°. Otras especies presentes en este bosque son *Abuta panamensis* (Menispermaceae), *Alfaroa mexicana* (Juglandaceae), *Brunellia mexicana* (Brunelliaceae), *Chamaedorea elegans* (Arecaceae), *Garcinia intermedia* (Clusiaceae), *Guarea glabra* (Meliaceae), *Liquidambar styraciflua* (Hammamelidaceae), *Matayba oppositifolia* (Sapindaceae), *Pseudolmedia spuria* (Moraceae), *Psychotria elata* (Rubiaceae), *Pouteria durlandii* (Sapotaceae) y *Ticodendron incognitum* (Ticodendraceae). En los claros de la comunidad es posible encontrar árboles pioneros, de rápido crecimiento como *Cecropia peltata* (Cecropiaceae), así como *Helicocarpus appendiculatus* y *Trichospermum mexicanum* (Tiliaceae).

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE *R. ELEGANS* EN OAXACA

Los individuos observados en la localidad de estudio poseen hábito cespitoso (con reproducción clonal) y sólo de manera muy infrecuente presentan un sólo "tronco", forma de crecimiento descrita por Moore (1957a, b). Esta palma aumenta de tamaño por la adición de nuevos tallos, mientras que cada uno de éstos incrementa su altura al producirse nuevas hojas. El tallo dominante alcanza hasta 5 m de altura, rodeado por 2-8-(18) "troncos" más pequeños, de hasta 1 m. Ocasionalmente se encuentran palmas con 2 a 4 tallos relativamente altos, que se desarrollan cuando muere el eje principal, aunque eventualmente uno de ellos crece más y se convierte en el dominante.

Con el objeto de evaluar las condiciones demográficas actuales de la población de *R. elegans*, se delimitó un sitio de 20 x 50 m, en donde se marcaron a todos los individuos presentes en el área. A cada individuo se le registró el número total de tallos y la altura del tallo dominante. La población se clasificó en categorías de tamaño, las cuales se pueden describir más fácilmente por el número de tallos.




Fig. 1. Distribución de frecuencias del tamaño de los individuos (número de tallos) de *Reinhardtia elegans* en Santo Domingo Lataní, Oaxaca.




Fig. 2. Distribución de frecuencias de la altura del tallo más viejo de los individuos de *Reinhardtia elegans* en Santo Domingo Lataní, Oaxaca.

La estructura correspondiente muestra que la población se está regenerando de manera natural, como lo indica la forma de "J" invertida (Fig. 1), donde la mayoría de los individuos (74%) son plántulas que aún no poseen un tallo definido. De la población, 14% tiene 1-3 tallos y menos de 2% tiene más de 10. Las plántulas de origen sexual y los rebrotos, producto del crecimiento clonal, no tienen altura determinada y junto con éstos, los tallos de menor altura son los más abundantes en la población (Fig. 2). Las semillas

de esta palma germinan y se establecen debajo o relativamente cerca de sus progenitores, ya que pueden detenerse entre la abundante hojarasca que se encuentra en el suelo, aun en aquellas poblaciones localizadas sobre pendientes pronunciadas.

Con base en los criterios propuestos por Rabinowitz (1981) y la información disponible hasta el momento, *R. elegans* es una palma rara, ya que presenta una distribución geográfica muy restringida, una estrecha amplitud ecológica y posiblemente un reducido número de poblaciones, situación que comparte con *R. paiewonskiana* (Read et al., 1987). A pesar de que no hemos generado información que documente de manera precisa la distribución y abundancia de *R. elegans* en el área de Santo Domingo Lataní, los datos proporcionados por los habitantes locales indica que esta especie cuenta con escasas poblaciones, muy distantes entre sí. De acuerdo con nuestras observaciones de campo, dentro de una población particular, existe un alto número de individuos en el sotobosque, siendo entonces la especie dominante en ese estrato.

En general puede apreciarse que *R. elegans* es una especie sensible al drástico cambio en el uso de suelo que está ocurriendo en La Chinantla, que ha provocado una deforestación intensa alrededor de los asentamientos humanos presentes en el área. El hombre está modificando el hábitat de esta palma a través del proceso de "roza, tumba y quema", con el propósito de ampliar las zonas de cultivo. La creciente intensidad de tal arrasamiento no permite que se den las condiciones y el tiempo necesario para que tal fenómeno de alteración del hábitat se revierta. Por lo anterior, es posible que ocurran extinciones locales que pueden llevar en el futuro a la desaparición de la especie en toda la región. El escenario para la conservación de este taxon es complejo, pues para los pobladores de la comarca no posee ninguna utilidad inmediata, a pesar de su enorme potencial como planta ornamental. Sin embargo, algunos habitantes indican que personas no residentes en el área han empezado a sustraer semillas de *R. elegans* con propósitos de uso hasta el momento desconocidos.

La recomendación más inmediata respecto a esta situación consiste en la conveniencia de realizar trabajos de investigación más detallados que permitan determinar, con mayor seguridad, el grado de amenaza que se cierne sobre la palma y establecer medidas que aseguren su conservación a largo plazo.

La presencia de esta especie endémica de México en hábitats muy particulares de La Chinantla, junto con otros elementos biogeográficamente interesantes, como por ejemplo, *Cyrilla racemiflora*, *Cyrillaceae* (Gallardo et al., 1998), *Oreomunnea mexicana*, *Juglandaceae* (Rzedowski y Palacios-Chávez, 1977) y *Ticodendron incognitum*, *Ticodendraceae* (Meave et al., 1996), sin duda contribuirá a entender la compleja historia de los bosques mesófilos de México.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos agradecer a los residentes del pueblo de Santo Domingo Lataní, Oaxaca, por habernos permitido trabajar en sus interesantes bosques, aunque especialmente a Alejandro García Gómez, ya que fue la primera persona de la comunidad dispuesta a apoyarnos en cuestiones logísticas y de trabajo de campo. Nuestro reconocimiento a Daniel Ocaña Nava, Aldo Valera Vázquez, Luis Alamán, Carlos Ramos Guerrero y Pedro Zaragoza García por su importante ayuda en el difícil trabajo de campo.

La asistencia de María de Lourdes Rico, Andrew Henderson, Cecilia Sánchez Garduño, Francisco G. Lorea Hernández y Oswaldo Téllez Valdez, fue muy valiosa para obtener diversa información sobre *Reinhardtia* de los herbarios BM, K, MEXU y XAL. Este estudio fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con número 3721P-N. Finalmente, agradecemos los valiosos comentarios aportados al trabajo por dos revisores anónimos, los cuales mejoraron el contenido del manuscrito.

LITERATURA CITADA

- Breedlove, D. E. 1986. Listados florísticos de México IV. Flora de Chiapas. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 246 pp.
- Cowan, C. P. 1983. Listados florísticos de México I. Flora de Tabasco. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 123 pp.
- Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press. Nueva York. 1262 pp.
- Dahlgren, R. M. T., H. T. Clifford y P. F. Yeo. 1985. The families of the Monocotyledons. Structure, evolution, and taxonomy. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg. 520 pp.
- Gallardo, C., J. Meave y A. Rincón. 1998. Plantas leñosas raras del bosque mesófilo de montaña IV. *Cyrrilla racemiflora* L. (Cyrillaceae). Bol. Soc. Bot. México 62: 183-186.
- Henderson, A., G. Galeano y R. Bernal. 1995. Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press. Princeton. New Jersey. 352 pp.
- Henderson, A. 2002. Phenetic and phylogenetic analysis of *Reinhardtia* (Palmae). Am. J. Bot. 89(9): 1491-1502.
- Heywood, V. H. 1978. Flowering plants of the world. Oxford University Press. Oxford. 335 pp.
- Hodel, R. H. 1992. *Chamaedorea* palms. The species and their cultivation. Allen Press. Lawrence, Kansas. 338 pp.
- Ibarra-Manríquez, G. 1988. The palms of a tropical rain forest in Veracruz, México. Príncipes 32(4): 147-155.
- Long, A. y M. Heat. 1991. Flora of the El Triunfo Biosphere Reserve, Chiapas, México: a preliminary floristic inventory and the plant communities of Polygon I. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Ser. Bot. 62: 133-172.
- Mabberley, D. J. 1993. The plant-book. A portable dictionary of the higher plants. Cambridge University Press. Cambridge. 707 pp.
- Martínez, E., C. H. Ramos y F. Chiang. 1994. Lista florística de la Lacandona, Chiapas. Bol. Soc. Bot. México 54: 99-177.
- Meave, J., C. Gallardo y A. Rincón. 1996. Plantas leñosas raras del bosque mesófilo de montaña II. *Ticodendron incognitum* Gómez-Laurito & Gómez P. (Ticodendraceae). Bol. Soc. Bot. México 59: 149-152.
- Moraes, M., G. Galeano, R. Bernal, H. Balslev y A. Henderson. 1995. Tropical Andean palms (Arecaceae). In: Churchill, S. P., H. Balslev, E. Forero & J. L. Luteyn (eds.). Biodiversity and conservation of neotropical montane forests. The New York Botanical Garden. Nueva York. pp. 473-487.
- Moore Jr., H. E. 1957a. *Reinhardtia*. Gentes Herb. 8(7): 541-576.
- Moore Jr., H. E. 1957b. The genus *Reinhardtia*. Príncipes 4(1): 127-145.
- Quero, H. J. 1994. Flora de Veracruz. Fascículo 81. Palmae. Instituto de Ecología A. C. & University of California, Riverside. Xalapa. 118 pp.
- Rabinowitz, D. H. 1981. Seven forms of rarity. In: Syngre, H. (ed.). The biological aspects of rare plant conservation. J. Wiley & Sons Ltd., Chichester. pp. 205-217.

- Read, R. W., T. A. Zanoni y M. Mejia. 1987. *Reinhardtia paiewonskiana* (Palmae), a new species for the West Indies. *Brittonia* 39(1): 20-25.
- Rzedowski, J. 1996. Análisis preliminar de la flora vascular de los bosques mesófilos de montaña de México. *Acta Bot. Mex.* 35: 25-44.
- Rzedowski, J. y R. Palacios-Chávez. 1977. El bosque de *Engelhardtia (Oreomunnea) mexicana* en la región de La Chinantla (Oaxaca, México): una reliquia del Cenozoico. *Bol. Soc. Bot. México* 36: 93-127.
- Sosa, V. y A. Gómez-Pompa (comps.). 1994. Flora de Veracruz. Fascículo 82: Lista florística. Instituto de Ecología A. C. y University of California, Riverside. Xalapa. 245 pp.
- Standley, P. C. 1920-26. Trees and shrubs of Mexico. *Contr. U. S. Natl. Herb.* 23: 1-1721.
- Uhl, N. W. y J. Dransfield. 1987. *Genera palmarum. A classification of palms based on the work of Harold E. Moore*. Jr. Allen Press. Lawrence, Kansas. 610 pp.

Recibido en febrero de 2002.
Aceptado en enero de 2003.