



Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)

ISSN: 0065-1737

azm@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

RANGEL-SALAZAR, José Luis; ENRÍQUEZ, Paula L.; SÁNTIZ LÓPEZ, Eugenia C.
VARIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE AVES DE SOTOBOSQUE EN EL PARQUE NACIONAL LAGOS
DE MONTEBELLO, CHIAPAS, MÉXICO

Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), vol. 25, núm. 3, 2009, pp. 479-495

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57512077004>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

VARIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE AVES DE SOTOBOSQUE EN EL PARQUE NACIONAL LAGOS DE MONTEBELLO, CHIAPAS, MÉXICO

José Luís RANGEL-SALAZAR¹, Paula L. ENRÍQUEZ y Eugenia C. SÁNTIZ LÓPEZ

Departamento de Ecología y Sistemática Terrestre, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),
Apartado Postal 63- 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, MÉXICO.

¹ Autor para correspondencia: jlrangel@ecosur.mx

Rangel-Salazar, J. L., P. L. Enríquez y E. C. Sántiz-López. 2009. Variación de la diversidad de aves de sotobosque en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, México. *Acta Zoológica Mexicana* (n. s.), 25(3): 479-495

RESUMEN. Para entender la variación espacial y temporal de la diversidad de aves de sotobosque, evaluamos la diversidad de especies en cuatro sitios (Las Grutas, Yalmutz, Vivero y Yalhuech) con diferentes tipos de vegetación y manejo dentro del Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, de julio de 1997 a junio de 1998. Identificamos 71 especies de aves: 50 fueron residentes y 21 migratorias. Las familias mejor representadas fueron Parulidae (15), Tyrannidae (9) y Turdidae (8). La mayor proporción de especies registradas fueron exclusivas para un solo sitio (63.4%) y tan solo 9.8% se distribuyó en los cuatro sitios. Las mayores frecuencias relativas de captura total fueron para *Chlorospingus ophtalmicus* (0.197), *Catharus ustulatus* (0.110), *Lamponnis viridipallens* (0.083) y *Myioborus miniatus* (0.072). El número de capturas varió entre los cuatro sitios estudiados, donde el bosque mixto de coníferas y latifoliadas (Vivero) presentó los valores máximos y el bosque mesófilo (Las Grutas) los mínimos. Yalmutz tuvo la mayor riqueza de especies (36), y Las Grutas la menor (24). La mayor diversidad derivada del reciproco de Simpson (16.41) y uniformidad (0.68), se registraron en Las Grutas, que fue el sitio menos perturbado y con los últimos remanentes de bosque mesófilo de montaña. Sin embargo, Yalmutz presentó los valores más altos en diversidad de Shannon (4.37), así como el mayor número tanto de especies exclusivas (14) como raras (21). Yalmutz presentó una mezcla de elementos de coníferas y latifoliadas, y fue el segundo sitio con un menor grado de perturbación por actividades antropogénicas. La mayor riqueza de especies y abundancia de individuos se presentó durante la temporada seca. El Parque Nacional Lagos de Montebello presenta una importante diversidad de especies de aves por la variación en ambientes y grados de perturbación que presenta. Sin embargo, la persistencia de las poblaciones de aves y su conservación en la región dependerá tanto de la permanencia de ambientes no perturbados y de la calidad de los ambientes secundarios y manejados.

Palabras clave: aves de sotobosque, riqueza de especies, comunidades biológicas, bosques mesófilos, bosques de pino-encino.

Rangel-Salazar, J. L., P. L. Enríquez, and E. C. Sántiz-López. 2009. Diversity variation in understory forest birds in Lagos de Montebello National Park, Chiapas, Mexico. *Acta Zoológica Mexicana* (n. s.), 25(3): 479-495

Recibido: 04/06/2008; aceptado: 08/09/2009.

ABSTRACT. To understand the spatial and temporal variation of the understory bird diversity, we estimated species diversity in four sites (Las Grutas, Vivero, Yalmutz y Yalhuech) with different vegetation type and management regimes in the Lagos de Montebello National Park, Chiapas from July 1997 to June 1998. We identified 71 bird species; 50 residents and 21 migrants. Families with more species were Parulidae (15), Tyrannidae (9) and Turdidae (8). Most of species were recorded to a single site (63.4%) and only 9.8% were distributed in all four sites. The highest relative frequencies of total captures were for *Chlorospingus ophtalmicus* (0.197), *Catharus ustulatus* (0.110), *Lampornis viridipallens* (0.083) and *Myioborus miniatus* (0.072). Capture number varied among sites, while Vivero showed the maximum values, Las Grutas showed the minimum. Yalmutz had the highest species richness (36), and Las Grutas the lowest (24). The highest diversity (Simpson reciprocal 16.41) and evenness (0.68) was recorded in Las Grutas, which was the site less disturbed and showed one of the last remnants of montane cloud forest. However, Yalmutz showed the highest values of Shannon diversity (4.37), and high values of both exclusive (14) and rare species (21). Yalmutz showed a mix of elements of pines and broadleaves and it was the second site with less disturbance by human activities. The higher species richness and abundance was during the dry season. The National Park Lagos de Montebello showed an important bird species diversity for the environmental variation and different stage of disturbance. The persistence of bird populations and their conservation in the region will depend on the remaining of non-disturbed environments and the quality of secondary and managed forests.

Key words: Understory birds, species richness, biological communities, cloud forests, pine-oak forests.

INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica se distribuye de manera heterogénea en el mundo. Esta distribución es una de las características más importantes que definen a las comunidades biológicas. Existen factores geográficos, evolutivos, históricos y ecológicos que determinan esta heterogeneidad (Rickelfs & Schlüter 1993). Sin embargo, procesos como la pérdida, degradación y fragmentación de los ambientes naturales modifican los patrones de distribución, abundancia y composición de especies de las comunidades en prácticamente todos los ambientes. La reducción y transformación de los ambientes naturales ocasionan la simplificación de la estructura y composición de sus comunidades biológicas.

Algunas especies de aves están restringidas a un determinado tipo de vegetación, y esto establecerá su habilidad para persistir en ambientes transformados (Johns 1991). Las especies que podrían estar más afectadas son aquellas del interior de bosque que por lo regular no pueden cruzar áreas abiertas (Johns 1991). La persistencia de las especies dependerá de la disponibilidad de hábitat y en ocasiones más de un hábitat puede ser requerido (Fahrig y Nuttle 2005). El estado de Chiapas puede considerarse como una de las áreas más ricas en especies de aves a nivel nacional (Escalante-Pliego *et al.* 1998), en donde se han descrito alrededor de 659 especies de aves (Rangel-Salazar *et al.* 2005). Sin embargo, pocos o nulos estudios se han realizado sobre diversidad de aves y su variación espacial y temporal en las Áreas Naturales Protegidas como el Parque Nacional Lagos de Montebello.

El Parque Nacional Lagos de Montebello presenta una superficie de 6 022 ha (Carlson 1954), y hasta hace unas décadas contaba con una importante cobertura

vegetal compuesta principalmente por bosques mesófilo de montaña y de coníferas (Flores-Villela & Geréz 1994). Sin embargo, para 1993 se había perdido más del 60% de la cobertura vegetal como consecuencia del disturbio natural y antropogénico (March & Flamenco 1996). Aunado a esto, los incendios en 1998 provocaron graves daños dentro del parque, al afectar alrededor de 800 hectáreas de bosque de pino-encino- liquidambar en buen estado (SEMARNAP 1998). A pesar de esta alarmante alteración y pérdida de áreas boscosas de la cobertura vegetal, poca información se ha generado sobre la diversidad de fauna que existe en el parque (e.g. Horvart *et al.* 2001). El propósito de este estudio fue evaluar la composición y variación espacio-temporal de la diversidad de aves de sotobosque en cuatro sitios con diferente tipo de vegetación y manejo, para entender las respuestas de la diversidad de aves a los efectos de los procesos de alteración ambiental en la diversidad biológica, de tal manera de considerar estos efectos en las estrategias de conservación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Parque Nacional Lagos de Montebello que se encuentra en la Altiplanicie del estado de Chiapas, México ($16^{\circ} 04'40''$ y $16^{\circ} 10'20''$ N; $91^{\circ} 37'40''$ y $91^{\circ} 47'47''$ O; Figura 1). La altitud del parque oscila entre los 1 500 y 1 800 msnm. El clima es semi-cálido con lluvias en verano según la clasificación de Köppen modificado por García (1973). La precipitación es de 300 a 400 mm en la época de secas (noviembre-abril) y entre 1 200 a 1 400 mm durante la época de lluvias (mayo a octubre) (INEGI 1984). La temperatura promedio anual es de 18°C. La vegetación del Parque es un mosaico de asociaciones vegetales donde sobresale el bosque de pino-encino liquidámbar, bosque de pino, bosque mesófilo de montaña, vegetación secundaria y riparia (Rzedowski 1978).

De julio de 1997 a junio de 1998 se realizaron capturas de aves en cuatro sitios en el parque que difirieron en tipo de vegetación y estructura: 1) Las Grutas presentó elementos de bosque mesófilo de montaña, la más alta diversidad vegetal, mayor altitud y pendiente en relación a los otros tres sitios. Este sitio presentó especies arbóreas como *Malmea* sp, *Parathesis bellizensis* y *Exothea paniculata*, y un estrato arbustivo conformado principalmente por individuos juveniles de las especies *Chamaedorae* sp, *Psychotria marginata* y *Podocarpus matudai* (Zarco 2000). 2) Yalmutz presentó una mezcla de elementos de coníferas con especies de latifoliadas. En este sitio se encontraron principalmente especies de árboles como *Quercus sapotaefolia*, *Myrica cerifera* y *Clusia* sp. y arbustos de *Miconia mexicana*, *Lyonia squamulosa* y *Pallicourea galleottiana*. 3) Vivero presentó también mezcla de coníferas y latifoliadas. Aunque difirió de Yalmutz por presentar menor cobertura arbórea y diversidad vegetal, conformado principalmente por *Quercus laurina*, *Clethra suaveolens* y *Parathesis bellizensis*, y en el estrato arbustivo *Calliandra houstoniana*, *Pallicourea pasiflora* y *Miconia mexicana*. 4) Yalhuech presentó

bosque de pino-encino, menor altitud y pendiente que el resto de los sitios. El estrato arbóreo está dominado por especies como *C. suaveolens*, *Pinus oocarpa* y *Q. sapotaefolia*, y el estrato arbustivo por *Eupatorium semialatum*, *Verbesina apaura* y *P. pasiflora* (Cuadro 1; Zarco 2000).

Nuestra predicción fue que la riqueza y diversidad de especies de aves, que involucra la distribución de las abundancias de individuos dentro de las especies (Pueyo 2006), se asociará negativamente a un gradiente de perturbación que incide en la composición de especies y en la estructura de la vegetación (Ricklefs 1977). La




Figura 1. Localización geográfica de los cuatro sitios estudiados (Las Grutas, Vivero, Yalmutz y Yalhuech) dentro del Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, México.

estructura como la altura de los árboles y la cobertura arbórea y arbustiva son variables que claramente difieren entre los sitios de muestreo (Zarco 2000). El grado de perturbación debido a actividades antropogénicas varió entre los sitios estudiados. Las Grutas fue el sitio menos perturbado, con un valor de perturbación acumulable de uno (Cuadro 2), mientras que Yalhuech fue el sitio con mayor perturbación con respecto al resto (valor 15), ya que existieron evidencias de intensas actividades como extracción de madera, fuego, ganadería y cacería (Cuadro 2). Yalmutz presentó grados de perturbación moderada con poca extracción de madera y cacería moderada (valor 5), mientras que en Vivero la extracción de madera fue más intensa y presentó poca ganadería (valor 10; Zarco 2000).

Cuadro 1. Características ambientales de los cuatro sitios de muestreo en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas.

Sitios	Pendiente (°)	Altitud (msnm)	Vegetación	Abundancia florística*	Diversidad florística**
Las Grutas	15	1465	Bosque mesófilo	892	6.63
Yalmutz	12	1460	Coníferas-liquidambar	1469	5.74
Vivero	9	1445	Coníferas-liquidambar	2850	3.97
Yalhuech	8	1280	Pino-encino	212	5.49

* Individuos de flora/cuadrante; **Inverso índice dominancia Simpson (Zarco 2000).

Cuadro 2. Valores cualitativos de la perturbación de la vegetación en cuatro sitios en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas.

Variables	S I T I O S			
	Las Grutas	Yalmutz	Vivero	Yalhuech
Fuego	0	0	0	3
Ocoteo	0	2	3	3
Extracción Madera	0	1	3	3
Ganadería	0	0	1	3
Cacería	1	2	3	3
Valor Total	1	5	10	15

Criterios: Ausente (0), Ligero (1), Moderado (2), Intenso (3)

En cada sitio de muestreo se ubicaron parcelas de 90x90m, donde se colocaron 9 redes de niebla, repartidas en 3 líneas rectas con 3 redes cada línea. Las líneas de redes estuvieron separadas por 45 m. Las redes se abrieron antes del amanecer hasta el medio día ($n = 45$ horas/red/día), durante tres días consecutivos por sitio (135 horas/red/mes/sitio). Cada sitio fue muestreado cada 2 meses durante un año. Las aves capturadas se identificaron con guías de campo (e.g., National Geographic 1983, Pyle *et al.* 1987, Howell & Webb 1995). El patrón de movimiento anual (status), y la clasificación de los diferentes gremios tróficos, se realizó de acuerdo a Terborgh *et al.* (1990), para determinar la composición de especies residentes y migratorias de la comunidad de aves por sitio y su ubicación trófica. La variación anual de las aves migratorias es un proceso crucial en la comunidades de aves en la región tropical y puede ser diferencial a diferentes escalas espaciales.

Las características de la comunidad de aves para el total y por sitio se expresaron como la riqueza acumulada de especies capturadas, el número de especies exclusivas a un solo sitio, las especies raras en las que se capturó un individuo por sitio, y la abundancia relativa representada por la frecuencia de captura de cada especie entre el total de capturas (Karr 1985). La diversidad, equitatividad y uniformidad se estimó con el inverso de Simpson, el índice de Shannon y el índice de uniformidad de Simpson's (Brower *et al.* 1977, Krebs 2001). También se estimó el índice de Morisita-Horn para evaluar la similitud entre sitios en función de la composición y abundancia de las especies. Los valores de este índice oscilan entre 0 (no hay similitud) y 1 (máxima similitud) (Krebs 1989).

Para determinar la variación espacio-tiempo la riqueza y abundancia de las especies se separaron en sitios y épocas: secas (noviembre-abril) y lluvias (mayo-octubre). El análisis de varianza paramétrica se utilizó para determinar la variación de la riqueza de especies y la diversidad entre los sitios y las temporadas. Previo a los análisis, las variables cumplieron con los supuestos estadísticos de distribución normal y similitud de varianzas con las pruebas de Shapiro-Wilks (W) y Bartlett, respectivamente (Gotelli y Ellison 2004). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa JMP en SAS 5.1 (Sall *et al.* 2005). Las pruebas se consideraron significativas cuando a 0.05.

RESULTADOS

Un total de 518 capturas en 71 especies fueron registradas en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, México (en un esfuerzo total de captura de 3 110 horas/red). Del total de especies capturadas, 50 especies (70.4%) fueron residentes y 21 (29.6%) migratorias Neotropicales (Cuadro 3). Las familias que presentaron un mayor número de especies fueron Parulidae (15), Tyrannidae (9) y Turdidae (8).

Del total de especies registradas, 45 (63.4%) fueron exclusivas a un solo sitio, y 26 (36.6%) se presentaron en más de un sitio. Solamente siete especies (9.9%) se

distribuyeron en los cuatro sitios, y de las cuales cuatro fueron las que presentaron las más altas frecuencias relativas de captura en todo el estudio: *Chlorospingus ophthalmicus* (0.197), *Catharus ustulatus* (0.110), *Lampornis viridipallens* (0.083), y *Myioborus miniatus* (0.072; Cuadro 3). Especies migratorias Neotropicales capturadas con elevadas frecuencias relativas de captura fueron *Wilsonia pusilla* (0.066) y *Seiurus aurocapilla* (0.033; Cuadro 3).

La media de individuos capturados varió entre los cuatro sitios estudiados, donde Vivero (bosque de coníferas y latifoliadas) presentó los valores mayores, y Las Grutas (bosque mesófilo) los menores ($F_{3,23} = 4.24$, $P < 0.05$; Cuadro 4). Con respecto a la riqueza de especies, Yalmutz (bosque de coníferas y latifoliadas) presentó la mayor riqueza con 36, y Las Grutas la menor con 24. Sin embargo, no existieron diferencias en la distribución del número de especies entre los cuatro sitios estudiados ($F_{3,23} = 2.29$, $P = 0.10$; Cuadro 3). Aunque las curvas de acumulación de especies durante el periodo de estudio mostraron un incremento en los cuatro sitios, ninguna se stabilizó al terminar el muestreo (Figura 2).




Figura 2. Curvas de acumulación de especies en cuatro sitios (Las Grutas, Vivero, Yalmutz y Yalhuech) en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas. De julio de 1997 a junio de 1998.

Cuadro 3. Número de individuos de especies de aves capturadas en cuatro sitios del Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, México (Julio 1997 - Junio 1998). Status (Patrones de Movimiento Anual): R= Especie Residente, M= Especie migratoria (migratoria Neotropical). Gremio Trófico: RD= Rapaz diurna, RN= Rapaz Nocturna, GT= Granívoro Terrestre, FT= Frugívoro Terrestre, NA= Nectarívoro, OA= Omnívoro Arbóreo, FA= Frugívoro Arbóreo, IAS= Insectívoro Arbóreo Buscador, ITG= Insectívoro Terrestre Recogedor, IBS= Insectívoro Buscador de Corteza, ITS= Insectívoro Buscador Terrestre, IAG= Insectívoro Arbóreo Recogedor. Frecuencia de captura (individuos capturados por especie/ total de individuos de todas las especies).

Especies	Status	Gremio Trófico	S I T I O S				Frecuencia Captura
			Las Grutas	Vivero	Yalmutz	Yahuech	
Cracidae <i>Penelopina nigra</i>	R	FA	1				0.002
Accipitridae <i>Accipiter striatus</i>	R	RD				2	0.004
Columbidae <i>Geotrygon montana</i>	R	FT			1		0.002
Strigidae <i>Megascops guatemalae</i>	R	RN			1		0.002
Trochilidae <i>Colibri thalassinus</i>	R	NA	1				0.002
<i>Abeillia abeillei</i>	R	NA	2				0.004
<i>Hylocharis leucotis</i>	R	NA		12			0.029
<i>Amazilia cyanocephala</i>	R	NA		5	1		0.021
<i>Lampornis viridipallens</i>	R	NA	10	18	10	5	0.083
<i>Lampornis amethystinus</i>	R	NA		4	8	1	0.025
<i>Eugenes fulgens</i>	R	NA		3	1	2	0.012
Momotidae <i>Aspatha gularis</i>	R	IAS	1				0.002
Furnariidae <i>Sclerurus mexicanus</i>	R	ITG	4				0.008
<i>Dendrocincus anabatina</i>	R	IAS	1				0.002
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	R	IBS			1		0.002
<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	R	IBS	1		4		0.010
<i>Lepidocolaptes affinis</i>	R	IBS	2	1	6		0.017
Formicariidae <i>Grallaria guatimalensis</i>	R	ITS	1				0.002
Tyrannidae <i>Mionectes oleagineus</i>	R	OA	1	1	7	1	0.019
<i>Oncostoma cinereigulare</i>	R	IAG		2			0.006
<i>Rhynchoscyrus brevirostris</i>	R	IAG	4	2			0.012
<i>Contopus pertinax</i>	R	IAS			1		0.002
<i>Contopus virens</i>	M	IAS			1		0.002
<i>Empidonax flaviventris</i>	M	IAS			1		0.002
<i>Empidonax difficilis</i>	M	IAS		5			0.010
<i>Empidonax flavescens</i>	R	IAS		2			0.004
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	R	IAS			1		0.002

Vireonidae							
<i>Vireo solitarius (solitarius)</i>	R	IAG		1	1	0.004	
<i>Vireo philadelphicus</i>	M	IAG			1	0.002	
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	R	IAG	2			0.004	
Corvidae							
<i>Cyanolyca cucullata</i>	R	OA		1		0.002	
<i>Cyanolyca pumilo</i>	R	OA		1		0.002	
Troglodytidae							
<i>Campylorhynchus zonatus</i>	R	IAG	1			0.002	
<i>Thryothorus maculipectus</i>	R	ITG	4			0.008	
<i>Troglodytes aedon</i>	R	ITG			1	0.002	
<i>Henicorhina leucophrys</i>	R	ITG	6			0.012	
Turdidae							
<i>Myadestes occidentalis</i>	R	FA	1	5	5	6	0.033
<i>Myadestes unicolor</i>	R	FA	2		4		0.012
<i>Catharus aurantiirostris</i>	R	FT				1	0.002
<i>Catharus mexicanus</i>	R	FT	1	6	5		0.023
<i>Catharus dryas</i>	R	FT	4				0.008
<i>Catharus ustulatus</i>	M	OA	2	17	7	31	0.110
<i>Hylocichla mustelina</i>	M	FT	2	6	3	3	0.027
<i>Turdus grayi</i>	R	OA	1		1		0.004
Mimidae							
<i>Dumetella carolinensis</i>	M	IAG		1			0.002
<i>Melanotis hypoleucus</i>	R	IAG	1				0.002
Parulidae							
<i>Vermivora chrysopatra</i>	M	IAG	1				0.002
<i>Parula superciliosa</i>	R	IAG			1		0.002
<i>Dendroica virens</i>	M	IAG			1		0.010
<i>Mniotilla varia</i>	M	IAG		1	1		0.004
<i>Protonotaria citrea</i>	M	IAG			1		0.002
<i>Helmitheros vermivorus</i>	M	ITG				1	0.002
<i>Seiurus aurocapilla</i>	M	ITG	3	6		8	0.033
<i>Seiurus noveboracensis</i>	M	ITG	1				0.002
<i>Oporornis formosus</i>	M	IAG			1		0.002
<i>Oporornis tolmieei</i>	M	IAG		3		2	0.010
<i>Wilsonia pusilla</i>	M	IAG		15	4	15	0.066
<i>Wilsonia canadensis</i>	M	IAG			1		0.002
<i>Myioborus miniatus</i>	R	IAG	2	19	9	7	0.072
<i>Basileuterus culicivorus</i>	R	FA		4			0.008
<i>Basileuterus rufifrons</i>	R	FA			2		0.004
Thraupidae							
<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	R	FA	1	54	26	21	0.197
Emberizidae							
<i>Atlapetes albinucha</i>	R	ITS		3		5	0.015
<i>Buarremón brunneinucha</i>	R	ITS	1				0.002
<i>Melozona biarcuata</i>	R	GT			1		0.002
<i>Melospiza lincolni</i>	R	GT		1	1		0.004
Cardinalidae							
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	M	FA				2	0.004
<i>Passerina cyanea</i>	M	GT				1	0.002
<i>Passerina ciris</i>	M	GT		1			0.002
Icteridae							
<i>Icterus mesomelas</i>	R	OA			1		0.002
Fringillidae							
<i>Carduelis notata</i>		RGT		4			0.008

La mayor diversidad (recíproco de Simpson; 16.41) y uniformidad (0.68), se registraron en Las Grutas. Sin embargo, Yalmutz presentó los valores más altos en diversidad de Shannon (4.37), así como mayor número tanto de especies exclusivas (14) como raras (21; Cuadro 4). De acuerdo a la similitud entre sitios, ambos bosques de coníferas y latifoliadas (Vivero y Yalmutz) presentaron los mayores porcentajes (93%), seguido de Vivero y Yalhuech (bosque de pino-encino) (82%), estos sitios compartieron 16 especies, respectivamente. Los sitios con menor similitud, fueron Las Grutas (bosque mesófilo) con Yalhuech (28%), al compartir solo 7 especies (Cuadro 5). Estos últimos sitios fueron los que contrastaron en los valores cualitativos de perturbación, donde el bosque mesófilo presentó los menores valores (1) y el bosque de pino-encino los mayores (15; Cuadro 2).

Cuadro 4. Valores de diversidad y equitatividad en cuatro sitios en el Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas, México (Julio 1997 – Junio 1998). H/R= Horas/Red,

S= Riqueza total de especies, Número total de individuos capturados, N₂= Recíproco de Simpson,

H₁= Índice de Shannon-Weiner (base 2), Uniformidad de Simpson, Sp.= Especies exclusivas,

R= especies raras (número de especies con un individuo capturado) por sitio.

Sitio	H/R	S	Individuos	N ₂	Shannon H ₁	Uniformidad	Sp.	R
Las Grutas	810	24	53	16.41	4.13	0.68	11	13
Yalmutz	790	36	127	14.60	4.37	0.41	15	21
Vivero	765	33	208	9.96	3.96	0.30	12	10
Yalhuech	745	25	130	9.42	3.76	0.38	7	9
Total	3110	71	518	13.67	4.67	0.19	45	53

El bosque mesófilo fue el sitio menos perturbado y presentó 11 especies exclusivas, las cuales son residentes y especialistas a este tipo de bosque, 7 se consideraron raras por presentar un solo individuo capturado (Cuadro 3). El bosque de coníferas y latifoliadas (Yalmutz) presentó 15 especies exclusivas, de las cuales 14 tuvieron un solo individuo capturado y de estas 5 fueron migratorias Neotropicales. El otro bosque de coníferas y latifoliadas (Vivero) presentó 12 especies exclusivas, de las cuales 6 fueron raras y de estas 4 migratorias Neotropicales. Yalhuech que fue el sitio más perturbado de los cuatro, presentó 7 especies exclusivas, de las cuales 5 fueron raras y de estas tres fueron especies migratorias Neotropicales. El bosque mesófilo presentó solo 2 especies migratorias Neotropicales, mientras que el resto de los sitios Yalmutz, Vivero y Yalhuech presentaron 12, 13 y 10 especies migratorias respectivamente.

Cuadro 5. Valores del índice de similitud de Morisita-Horn (número de especies compartidas), en cuatro sitios del Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas.

	Las Grutas	Yalmutz	Vivero	Yalhuech
Las Grutas	1	0.47 (12)	0.38 (10)	0.28 (7)
Yalmutz		1	0.93 (16)	0.73 (14)
Vivero			1	0.82 (16)
Yalhuech				1

En los análisis temporales, la época seca (o periodo de aves migratorias neotropicales) presentó tanto el mayor número de individuos (secas = 345 vs. lluvias = 173 ; $F_{1, 23} = 6.92, P < 0.05$), como de especies (secas = 51 vs. lluvias = 43 ; $F_{1, 23} = 12.27, P < 0.01$). Respecto a los gremios tróficos, el mayor número de especies fueron insectívoras con el 53.5%, particularmente los insectívoros arbóreos. Las especies frugívoras fueron el segundo gremio trófico más abundante (15.5% del total; Cuadro 3). Los frugívoros arbóreos representaron el mayor número de individuos (25.9%), seguido de los insectívoros arbóreos recogedores (29.3%), y de los nectarívoros (17.6%).

DISCUSIÓN

Las especies de aves de sotobosque registradas en los cuatro sitios en el Parque Nacional Lagos de Montebello, representaron el 19.4% del total reportadas para Chiapas (659 especies; Rangel-Salazar *et al.* 2005). La mayoría de las especies fueron residentes y cerca del 30% fueron migratorias latitudinales. El área de Montebello es una de las regiones de Mesoamérica donde se concentran un importante número de especies de aves migratorias latitudinales (Rappole & Tipton 1992).

Dentro de la comunidad de aves de sotobosque, algunas especies presentaron una mayor representatividad en cuanto al número de individuos capturados y mayor distribución. *Chlorospingus ophtalmicus* estuvo bien representada, y se ha reportado que realiza migraciones altitudinales (Winker *et al.* 1997). Esta especie ha sido registrada como abundante en algunos bosques mesófilos de Chiapas como la Reserva de la Biosfera El Triunfo y en Guatemala (Gómez de Silva *et al.* 1999, Eisermann & Schulz 2005). *Catharus ustulatus* es una especie migratoria Neotropical y también presentó un gran número de capturas. Esta especie se ha considerado abundante durante la migración tanto en regiones bajas del Caribe, como en tierras altas, como El Triunfo (Gómez de Silva *et al.* 1999). *Lampornis viridipallens* y *Myioborus miniatus* también presentaron una amplia distribución en

los sitios estudiados. Esta última especie ha sido considerada común en sus áreas de distribución de bosques húmedos de pino-encino y encino (Stiles & Skutch1989, Howell & Webb1995).

De los cuatro sitios estudiados dentro del parque, el bosque de coníferas y latifoliadas (Yalmutz) presentó la mayor riqueza de especies, el mayor número tanto de especies raras (especies con un individuo), como migratorias Neotropicales. Además, fue el segundo sitio que presentó una mayor diversidad (Shannon) y uniformidad. Este sitio presenta una mezcla de elementos de coníferas y latifoliadas, y mayor cobertura arbórea que Vivero, además fue el segundo sitio con un menor grado de perturbación por actividades antropogénicas (*i.e.* poca extracción de madera, ocoteo; el cual consiste en cortar pequeños pedazos de madera rica en resina, que se utilizan como combustible para prender fogatas y fogones, y cacería moderada; Cuadro 2).

Por otra parte, el bosque mesófilo (Las Grutas) presentó los valores mayores de diversidad de especies (recíproco de Simpson) y de homogeneidad de los cuatro sitios, pero la menor riqueza de especies. Las Grutas tuvo la mayor diversidad vegetal con respecto a los otros sitios (Cuadro 1; Zarco 2000). Fue el segundo sitio con elevados valores de diversidad de Shannon, así como el segundo con especies raras, y con solo dos especies migratorias Neotropicales, las cuales son poco comunes en este tipo de bosque (Gómez de Silva *et al.* 1999). Las Grutas representa uno de los últimos remanentes de bosque mesófilo de montaña dentro del Parque Nacional Lagos de Montebello, este sitio presentó los niveles más bajos de perturbación, además que no ha sido severamente afectado por los incendios forestales (Zarco 2000).

El bosque de coníferas y latifoliadas (Vivero), presentó el mayor número de individuos capturados y fue el segundo sitio con mayor riqueza de especies. Este bosque aunque presentó la menor diversidad vegetal, tuvo la cobertura arbórea más alta (Cuadro 1). El bosque de pino-encino (Yalhuech) presentó el menor número de especies de aves raras, menos especies exclusivas, menor diversidad de aves y homogeneidad que los demás sitios. Yalhuech fue el sitio más perturbado y degradado que el resto, ha sufrido quemas e incendios con anterioridad, así como pastoreo. A pesar de esto, dos especies migratorias Neotropicales (*C. ustulatus* y *W. pusilla*) fueron las más abundantes en este sitio. La primera de ellas es una especie que utiliza este sitio de paso durante la migración, y la segunda permanece en el sitio durante todo el período migratorio.

La diversidad total registrada (recíproco de Simpson) en el Parque Nacional Lagos de Montebello fue de 13.67, donde el bosque mesófilo presentó la diversidad máxima (16.41). Otros estudios en áreas Neotropicales, como en la Selva Lacandona en Chiapas, México se ha reportado una diversidad de 20.66 para aves de sotobosque (Rangel-Salazar *et al.* 1993). Aunque los tipos de vegetación son diferentes en

composición florística (Rzedowski 1978), así como en condiciones topográficas y climáticas, la alta diversidad de las comunidades de aves tropicales se ha atribuido parcialmente a la estructura de la vegetación como determinante en la estructura y organización (Terborgh 1985). Sin embargo, factores antropogénicos también están determinando la composición y diversidad en estos ambientes (Johns 1991).

Las especies con una mayor distribución geográfica tienden a ser las más abundantes localmente que aquellas especies con distribución restringida (Hanski *et al.* 1993). De las 71 especies registradas, siete especies presentaron una amplia distribución en los sitios de muestreo. Cuatro de estas especies fueron las más abundantes en todo el estudio. Las especies con distribución restringida representaron el 63% del total de especies. Esta relación de distribución y abundancia tiene importantes implicaciones para el estudio y conservación de la diversidad de aves en la región. Sobre todo, porque las acciones de conservación deben de ser soportadas en procesos de priorización de aquellas especies con una distribución restringida y que son poco abundantes.

En los bosques tropicales, la mayoría de las especies de aves son raras (Karr 1990). En este estudio el 44% del total de especies (31) fueron raras. En algunos casos, esta rareza se puede presentar por la distribución en parches de las especies, porque estas pueden estar ampliamente distribuidas pero son raras a través de su rango de distribución, o porque son especialistas o restringidas a un determinado ambiente (Karr 1990). El bosque de coníferas y latifoliadas (Yalmutz) presentó el mayor número de especies raras (21 especies), seguido de los otros sitios con alrededor de la mitad ± 10 . Sin embargo, la proporción de especies raras a través de distintas áreas tropicales varía sustancialmente. Por ejemplo, en la Selva Lacandona, Chiapas, se reportó que el 47% de las especies fueron raras (Rangel-Salazar *et al.* 1993), de la misma forma en un bosque tropical lluvioso en Perú, Terborgh *et al.* (1990) registraron el 42% de las especies como raras. Karr (1977) en un bosque tropical lluvioso de Panamá, registró el 31% como raras. Karr *et al.* (1990) en bosques tropicales lluviosos citaron el 19% de especies raras para Costa Rica, 20% para Panamá, 13% para Brasil y el 32% para Perú. Sin embargo, se sabe que la dominancia de especies raras en captura con redes es evidente, pero poco se conoce sobre la historia natural de estas especies raras, y aún menos sobre como responden a la fragmentación o degradación de sus ambientes (Bierregard & Stouffer 1997).

Ambos sitios de bosques de coníferas y latifoliadas (Yalmutz y Vivero) presentaron los mayores porcentajes de similitud, compartieron 16 especies, y en donde *Mniotilla varia* y *Melospiza lincolni* fueron exclusivas a estos sitios. El bosque de coníferas y latifoliadas (Vivero) y el bosque de pino-encino (Yalhuech) también presentaron altos porcentajes de similitud, compartiendo también 16 especies, con 4 especies exclusivas (*Hylocharis leucotis*, *Amazilia cyanocephala*, *Oncostoma cinereigulare* y *Atlapetes albinucha*) (Cuadro 5).

La temporada de secas que coincide con la temporada migratoria de las aves, presentó tanto un mayor número de individuos como de especies con respecto a la temporada de lluvias. La temporada de secas es la época de escasez de alimento en donde las especies pueden intensificar su búsqueda de alimento e incrementar las probabilidades de ser capturadas. En contraste, la mayoría de las especies de aves en la región Neotropical se reproducen antes de la estación de lluvias posiblemente como respuesta al aumento en la abundancia de artrópodos durante la temporada de lluvias (Poulin *et al.* 1992). Quizás por esta razón existe una disminución en las tasas de capturas en redes durante ésta temporada del año, aunque también esta disminución está influida por la ausencia de las especies migratorias Neotropicales.

Los gremios tróficos en una comunidad son tan diversos como las especies. Esto quizás refleja la disponibilidad de comida, así como la estructura de la vegetación que determina la selección de hábitat de las especies (Thiollay 1992). Los principales gremios presentes en los cuatro sitios fueron los insectívoros, frugívoros y nectarívoros. Algunos gremios sobresalieron por el número de especies como de individuos. Por ejemplo, el gremio de los insectívoros fue el más abundante en número de especies que el resto de los demás gremios tróficos, pero los frugívoros arbóreos sobresalieron en número de individuos. Karr *et al.* (1990), reportaron que el gremio trófico con mayor número de especies en una comunidad de aves bosques tropicales lluviosos es el de los insectívoros.

El bosque de coníferas y latifoliadas (Vivero) presentó el mayor número de especies del gremio insectívoros que el resto de los sitios. Los insectívoros arbóreos recogedores fueron los más abundantes dentro del gremio de los insectívoros y junto con el bosque de pino-encino (Yalhuech) presentaron el mayor número de especies nectarívoras (5). Las especies de colibríes registradas son endémicas a los bosques de montaña (Howell & Webb 1995). Según Johns (1991), la mayor abundancia de insectívoros de sotobosque se encuentra en ambientes perturbados, ya que estos generalmente reflejan la pérdida de sotobosque y su asociación con insectos, aunque también está determinado por el tipo de vegetación. Yalmutz, por otra parte, presentó el mayor número de especies frugívoras e insectívoras arbóreas recogedoras. Este sitio de bosque mixto de coníferas y latifoliadas presenta mayor cobertura arbórea y diversidad vegetal.

La diversidad de aves en el Parque Nacional Lagos de Montebello varió entre los sitios estudiados (Las Grutas, Vivero, Yalmutz y Yalhuech), así como entre temporadas (secas y lluvias). Yalmutz fue uno de los sitios con mayor diversidad de aves, mayor número de especies únicas a este sitio, y raras. Es muy probable que las especies exclusivas a estos sitios sean las más vulnerables a sufrir extinciones locales. Aunque en este sitio no se presentaron actividades humanas intensas, no está exento que estas se incrementen en un futuro. Otro sitio importante fueron Las Grutas, el cual es uno de los últimos remanentes de bosque mesófilo de montaña

dentro del parque. El Parque Nacional Lagos de Montebello presentó una importante diversidad de especies de aves que parece responder a la variación de ambientes presentes. Sin embargo, la persistencia de las poblaciones de aves y su conservación en la región dependerá en gran medida de la permanencia de ambientes no perturbados así como de la calidad de los ambientes secundarios y manejados.

AGRADECIMIENTOS. Agradecemos a L. Martínez, B. Contreras y R. Castellanos por su ayuda durante el trabajo de campo. A D. Díaz Bonifaz por la elaboración del mapa y a Emmanuel Valencia por la elaboración de las figuras. A R. Rodríguez-Estrella, F. González-García y P. Reyes-Castillo por las sugerencias realizadas al manuscrito las cuales lo mejoraron sustancialmente. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Sistema de Investigación Benito Juárez (SIBEJ) por su apoyo financiero para el proyecto “Diversidad de vertebrados terrestres en un paisaje con diferentes usos del suelo en la región del Parque Nacional Lagos de Montebello, Chiapas”.

LITERATURA CITADA

- Bierregard, R.O., & P. Stouffer.** 1997. Understory birds and dynamic habitat mosaics in Amazonian rainforests. Pp. 138-155. In: W.F. Laurance & R.O.Bierregaard (Eds.). *Tropical Forest Remnants: Ecology, Management, and Conservation of Fragmented Communities*. University of Chicago Press, Chicago, USA.
- Brower, J., J. Zar & C.Von Ende.** 1977. *Field and Laboratory Methods for General Ecology*. 3a. ed. Wm. C. Brown Publishers, USA.
- Carlson, M.** 1954. Floral elements of the pine-oak-liquidambar forest of Montebello, Chiapas, México. *Bulletin of the Torrey Botanical Club*, 81: 387-399.
- Eisermann, K. & U. Schulz.** 2005. Birds of a high-altitude cloud forest in Alta Verapaz, Guatemala. *Revista de Biología Tropical*, 53: 577-594.
- Escalante-Pliego, P., A.G. Navarro-Sigüenza & A.T. Peterson.** 1998. Un análisis geográfico, ecológico e histórico de la diversidad de aves terrestres de México. Pp. 279-304. En: T. P. Ramamoorthy, R. Bye, A. Lot & J. Fa (Eds). *Diversidad Biológica de México: orígenes y distribución*. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. DF.
- Fahrig, L. & W.K. Nuttle.** 2005. Population ecology in spatially heterogeneous environments. Pp. 95-118. En: G. M. Lovett, C. G. Jones, M. G. Turner & K. C. Weathers (Eds.). *Ecosystem Function in Heterogeneous Landscapes*. Springer-Science, New York, NY, USA.
- Flores-Villela, O.A. & P. Geréz.** 1994. *Biodiversidad y conservación en México: síntesis sobre vertebrados terrestres, vegetación y uso del suelo*. UNAM, CONABIO, México.
- García, E.** 1973. *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen*. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Gómez de Silva, H., F. González-García & M. P. Castillas-Trejo.** 1999. Birds of the upper cloud forest of El Triunfo, Chiapas, Mexico. *Ornitología Neotropical*, 10: 1-26.
- Gotelli, N.J. & A.M. Ellison.** 2004. A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, USA.
- Hanski, I., J. Kouki & A. Halkka.** 1993. Three explanations of the positive relationship between distribution and abundance of species. Pp. 108-116. En: R.E. Ricklefs & D. Schlüter (Eds). *Species diversity in Ecological Communities*. The University of Chicago Press, USA.
- Horváth, A., I.J. March, & J.H.D. Wolf.** 2001. Rodent diversity and land use in Montebello, Chiapas, Mexico. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 36: 169-176.

- Howell, S.N.G. & S. Webb.** 1995. *A guide to the birds of Mexico and Northern Central America.* Oxford University Press, CA, USA.
- INEGI.** 1984. Carta de Efectos Climáticos Regionales. Mayo-octubre y noviembre-abril. Las Margaritas. 1:250000 (E15-12-D15-3). México, D. F.
- Johns, A.D.** 1991. Responses of Amazonian rain forest birds to habitat modification. *Journal of Tropical Ecology*, 7: 417-437.
- Karr, J.** 1977. Ecological correlates of rarity in a tropical forest bird communities. *Auk*, 94: 240-247.
- Karr, J.** 1985. Turnover rates in tropical forest bird communities. National Geographic Society, 1975. Research Report. pp. 421-425.
- Karr, J.** 1990. Birds of tropical rainforest comparative biogeography and ecology. Pp. 215-228. En: A. Keast (Ed). *Biogeography and ecology of forest bird communities*. Academic Publishing. The Hague, Netherlands.
- Karr, J.R., S.K. Robinson, J.G. Blake, R.O. Bierregaard Jr.** 1990. Birds of four neotropical forests. Pp. 237-269. En: A. H. Gentry (Ed). *Four Neotropical Rainforests*. Yale University Press, New Haven, Conn. USA.
- Krebs, C.J.** 1989. *Ecological Methodology*. Harper Collins Publishers. New York, USA.
- Krebs, C.J.** 2001. *Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance*. Addison Wesley Longman, Inc. CA.USA.
- March, I.J. & A. Flamenco.** 1996. Evaluación rápida de la deforestación en las áreas naturales protegidas de Chiapas (1970-1993). El Colegio de La Frontera Sur, The Nature Conservancy, U.S. AID. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- National Geographic.** 1983. *Field guide to the birds of North America*. National Geographic Society. USA.
- Poulin, B., G. Lefebvre & R. McNeil.** 1992. Tropical avian fenology in relation to abundance and exploitation of food resources. *Ecology*, 73: 2295-2309.
- Pueyo, S.** 2006. Diversity: between neutrality and structure. *Oikos*, 112:392-405.
- Pyle, P., S.N.G. Howell, R.P. Yunick & D.F. DeSante.** 1987. *Identification guide to North American Passerines*. Slate Creek Press. Bolonias, CA. USA.
- Rangel-Salazar J.L., P.L. Enríquez & J. H. Vega-Rivera.** 1993. Riqueza de especies de aves de sotobosque en la Selva Lacandona, Chiapas, México. *Revista de Biología Tropical*, 41: 273-279.
- Rangel-Salazar, J.L., P.L. Enríquez & T. Will.** 2005. Diversidad de aves en Chiapas: prioridades de investigación para su conservación. Pp. 265-123. En: M. González-Espinosa, N. Ramírez-Marcial & L. Ruiz-Montoya (Eds). *Diversidad Biológica en Chiapas*. El Colegio de La Frontera Sur. COCYTECH. Plaza y Valdés, S. A. de C. V. México.
- Rappole, J.H. & A.R. Tipton.** 1992. The evolution of avian migration in the Neotropics. *Ornitología Neotropical*, 3: 45-55.
- Ricklefs, R.E.** 1977. Environmental Heterogeneity and Plant Species Diversity: A Hypothesis. *American Naturalist*, 111: 376-381
- Ricklefs, R.E. & D. Schlüter.** 1993. Species diversity: regional and historical influences. Pp 350-363. En: R.E. Ricklefs & D. Schlüter (Eds). *Species diversity in Ecological Communities. Historical and Geographical Perspectives*. University of Chicago Press, Chicago USA.
- Rzedowski, J.** 1978. Vegetación de México. Limusa, México, DF. 432p.
- Sall, J., L. Creighton & A. Lehman.** 2005. *JMP Start Statistics*. SAS Institute Inc. 3th Ed. SAS Institute Inc. Thompson Learning, Belmont, California, USA.
- SEMARNAP.** 1998. Los incendios forestales en México. Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. México.
- Stiles, G. & A. Skutch.** 1989. *A guide to the birds of Costa Rica*. Comstock Cornell, USA.

- Terborgh, J.** 1985. The vertical component of plant species diversity in temperate and tropical forests. *American Naturalist*, 126: 760-777.
- Terborgh, J., S.K. Robinson, T.A. Parker III, C.A. Munn & N. Pierpont.** 1990. Structure and organization of an Amazonian forest bird community. *Ecological Monograph*, 60: 213-238.
- Thiollay, J.M.** 1992. Influence of selective loading on bird species diversity in a Guianan Rain Forest. *Conservation Biology*, 6: 47-63.
- Winker, K., P. Escalante, J.H. Rappole, M.A. Ramos, R.J. Oehleschlanger & D.W. Warner.** 1997. Periodic migration and lowland forest refuge in a sedentary Neotropical bird, Wetmore's Bush Tanager. *Conservation Biology*, 11: 692-697.
- Zarco, P.** 2000. Análisis de la vegetación y fauna asociada en Bosques Templados del Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.