



Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)

ISSN: 0065-1737

pedro.reyes@inecol.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

PINEDA PERAZA, Luis Armando; SEGURA YANES, Jordi Humberto; MEDINA
ZELEDÓN, Kevin Enrique; FLORES-MÁRQUEZ, José Isidro; LÓPEZ, Miguel Ángel
REDESCUBRIMIENTO DE UNA POBLACIÓN DE MONO ARAÑA (ATELES
GEOFFROYI) EN LA LAGUNA DE OLOMEGA, EL SALVADOR
Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), vol. 33, núm. 3, 2017, pp. 532-537
Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57553897014>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



Nota Científica
(Short Communication)

REDESCUBRIMIENTO DE UNA POBLACIÓN DE MONO ARAÑA (*ATELES GEOFFROYI*) EN LA LAGUNA DE OLOMEGA, EL SALVADOR

REDISCOVERY OF A SPIDER MONKEY POPULATION (*ATELES GEOFFROYI*) IN OLOMEGA LAGOON, EL SALVADOR

LUIS ARMANDO PINEDA PERAZA,^{1,*} JORDI HUMBERTO SEGURA YANES,¹ KEVIN ENRIQUE MEDINA ZELEDÓN,² JOSÉ ISIDRO FLORES-MÁRQUEZ¹ Y MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ¹

¹ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre.
<lpineda@marn.gob.sv>; <jsegura@marn.gob.sv>; <chilogallo@hotmail.com>.

² Departamento de Biología, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Universidad de El Salvador.
<k.e.medinazeledon@gmail.com>.

Recibido: 22/05/2017; aceptado: 28/08/2017.

Editor responsable: Juan Carlos Serio.

Pineda P. L. A., Segura Y. J. H., Medina Z. K. E., Flores-Márquez, J. I. y López, M. A. (2017). Redescubrimiento de una población de mono araña (*Ateles geoffroyi*) en la Laguna de Olomega, El Salvador. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 33(3), 532-537.

RESUMEN. *Ateles geoffroyi* es uno de los más grandes monos del Neotrópico y su distribución va desde México al norte de Colombia. El mono araña (*Ateles geoffroyi*) en la laguna Olomega, Departamento de San Miguel (Este de El Salvador) fue reportado por última vez en 1944, hace más de 70 años. Se presenta información sobre el redescubrimiento de esta especie en el área donde se creía localmente extinto. También se considera que hay una necesidad urgente de estudiar, monitorear y proteger esta población para contribuir a la conservación de esta especie altamente en peligro en El Salvador.

Distribución y descripción de la especie. El mono araña (*Ateles geoffroyi* [Kuhl 1820]) es una especie de primate silvestre que se distribuye desde el sureste de México hasta el noroeste de Colombia. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1,800 msnm (Guzmán Serrano *et al.*, 2008; Reid, 2009). Estos monos destacan entre los primates Neotropicales de mayor tamaño, (miden de 38-63 cm cabeza-tronco, y la cola entre 50-90 cm de longitud), con miembros delgados y muy largos, cabeza pequeña y con cola prensil cuyo extremo está desnudo en su parte inferior. Los animales adultos alcanzan a pesar hasta 9-10 kg (Guzmán Serrano *et al.*, 2008; Reid, 2009). La mayoría de los individuos tienen la piel rosada alrededor de los ojos y

Pineda P. L. A., Segura Y. J. H., Medina Z. K. E., Flores-Márquez, J. I., & López, M. A. (2017). Rediscovery of a spider monkey population (*Ateles geoffroyi*) in Olomega lagoon, El Salvador. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 33(3), 532-537.

ABSTRACT. *Ateles geoffroyi* is one of the largest monkeys of the Neotropics and its distribution is from Mexico to northern Colombia. Spider monkeys (*Ateles geoffroyi*) in the Olomega lagoon, Department of San Miguel (Eastern El Salvador) were last reported in 1944, more than 70 years ago. The authors present information about the rediscovery of the species in an area where it was thought to be locally extinct. They also consider that there is an urgent need to study, monitor and protect this population in order to contribute to the conservation of a highly endangered primate in El Salvador.

de la boca. Machos y hembras son aproximadamente del mismo tamaño, pero las hembras pueden distinguirse por su clítoris particularmente largo, en forma de péndulo, mientras que los genitales de los machos están usualmente ocultos (Roosmalen & Klein, 1998; Guzmán Serrano *et al.*, 2008; Reid, 2009).

Especie en El Salvador. El Museo Nacional de Antropología de El Salvador posee entre sus colecciones de la cultura precolombina, muestras de artefactos que pertenecen al Período Maya Clásico (del 300 AD - 1000 AD) con figuras que representan monos araña (Colección Museo D. J. Guzmán, El Salvador, en Morales – Hernández, 2002). El primer reporte de la especie en el país se realizó duran-



te la época de la Colonia por el naturalista John Lloyd en 1841 (Stephens, 1996). En 1944 se reportó la especie en laguna de Olomega, departamento de San Miguel (Kelllogg & Goldman, 1944); y posteriormente en Puerto El Triunfo y la hacienda Nancuchiname, Departamento de Usulután (Burt & Stirton, 1961). Morales (2003) y Owen & Girón (2012), mencionan que la especie *Ateles geoffroyi* también se reporta en El Salvador en Parque Nacional Montecristo, Departamento de Santa Ana; Chaguantique, El Tercio, Normandía, Cerro el Mono, Departamento de Usulután y Conchagua, Departamento de La Unión. Los estudios más recientes de mono araña para el país, fueron realizados por Argueta y Rivera en el 2004; y por Rodrí-

guez Menjívar en 2007. Ambos esfuerzos se desarrollaron en el Área Natural Protegida (ANP) Normandía; Velado Cano y Pablo Cea en 2012, en el ANP Chaguantique (Fig. 1).

Estado de conservación. En cuanto al estado de conservación a nivel regional se clasifica a *Ateles geoffroyi* como una especie En Peligro de Extinción (Endangered A2c), con tendencia poblacional decreciente (IUCN, 2016). Para las autoridades ambientales en El Salvador, esta especie también se encuentra en la misma categoría En Peligro, documentado en el listado oficial de especies de vida silvestre amenazada o en peligro de extinción (MARN, 2015).




Figura 1. Distribución histórica y registros actuales de mono araña (*Ateles geoffroyi*) en El Salvador.

Descripción del área y hábitat. La laguna de Olomega es el mayor cuerpo de agua dulce de la planicie costera de El Salvador. Este cuerpo de agua y los humedales que la rodean se sitúan en una llanura que limita al sur con los acantilados de la cordillera de Jucuarán y al noroeste con el río Grande de San Miguel. El núcleo del humedal está compuesto por un espejo de agua de superficie variable pero que habitualmente ocupa una superficie estimada de 2600 ha con profundidad media de 2.9 m y en cuyo interior se encuentran las islas de Olomega y Olomeguita, junto con algunos pequeños islotes ubicados en el sector sudoriental de la laguna. En los meses de mayo y octubre (estación lluviosa), la laguna recibe las aguas del río Grande de San Miguel que alimentan y drenan la laguna. En el

interior de la laguna se crean grandes bancos flotantes de jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*). Los principales núcleos humanos se sitúan sobre las orillas de la ribera sur y al oriente de la laguna. Esta laguna sirve como área de alimentación y descanso de importantes concentraciones de aves acuáticas migratorias. (Díaz *et al.*, 2004; Jiménez & Sánchez-Mármol, 2004).

Registro. En marzo de 2017, cooperantes Españoles en El Salvador, en un informe socioambiental dirigido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN), mencionan el avistamiento de un grupo de monos araña compuesto por siete a ocho individuos en el lugar nombrado en el documento como zona “S”, sin proporcionar mayor detalle de la ubicación de esta po-

POBLACIÓN DE MONO ARAÑA (*Ateles geoffroyi*) EN LA LAGUNA DE OLOMEGA, EL SALVADOR.




Figura 2. Mapa de ubicación de población de *Ateles geoffroyi*, cerro “el Roble”, laguna de Olomega.



blación de monos araña, para según no divulgar el lugar exacto del sitio, y evitar saqueo o cacería de monos araña (Barraza-Ferrer & Sánchez-Recacha, 2017).

El seis de abril de 2017 se organizó una expedición de campo con el fin de confirmar y documentar la presencia de mono araña, en el lugar denominado como zona "S", que es conocido localmente como cerro "el Roble". El recorrido se realizó en compañía del mismo guía local que acompañó a Barraza-Ferrer y Sánchez-Recacha, en la cordillera alrededor de la laguna de Olomega, cantón "La Estrechura", municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel, en el Cerro "el Roble" a 453 msnm ($13^{\circ}16.846' N$ y $88^{\circ}05.892' O$) (Fig. 2), el cual consiste en un bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado, secundario y/o intervenido (MARN, 2011), con alto grado de regeneración en etapa final, presencia de árboles siempre verde de alturas que oscilan entre los 15 a 45 m en un terreno elevado con una pendiente de 85%, presencia de farallones y quebradas de invierno y con parcelas colindantes de monocultivos temporales (granos básicos) y frutales como marañón (*Anacardium occidentale*) con un área total de 6,811.77 ha.


Durante la expedición (14:00 a las 19:00), se observó en los mismo árboles en donde fueron ubicados por Barraza-Ferrer & Sánchez-Recacha (2017) la tropa de monos araña (*Ateles geoffroyi*) compuesta de ocho adultos, dos juveniles y un infante. La identificación detallada por sexos no fue posible, sin embargo se pudo confirmar que el grupo estaba compuesto por machos y hembras (Figs. 3-8). Al momento del encuentro, los individuos de la tropa se encontraban alimentándose de frutos en árboles de ojushte (*Brosimum alicastrum*) los cuales poseen alturas entre los 20 a 30 m. Esta especie de la familia Moraceae, ha sido reportado como importante para la dieta de mono araña, tanto por su altura y follaje, como por el alimento que les proporcionan (Morales Hernández, 2003; Argueta Rivas & Rivera, 2004; Rodríguez Menjívar, 2007; Velado Cano & Pablo Cea, 2012). Durante el recorrido también se observaron muchas muestra fecales o excretas de monos araña debajo de otros árboles de ojushte distribuidos a lo largo de la cordillera (cerro "el Botijón" y "el Jubilete" $13^{\circ} 16.877' N$ $88^{\circ} 05.892' O$), lo cual evidencia que ellos se desplazan según la disponibilidad de alimento, de igual manera se encontró a doscientos metros de distancia del avistamiento de monos araña, varios árboles de papayo de

montaña (*Vasconcellea cauliflora*) rasgados en el tallo y frutos mordidos tirados en la tierra, según el señor Hugo Omar Chávez, agricultor y colaborador local, de la comunidad "La Estrechura", laguna de Olomega y guía durante la expedición. (Com. Pers. 2017) han observado en otras ocasiones a los monos alimentándose de esta especie.

Los monos araña observados durante la expedición presentaban una coloración del pelaje negro y blanco, cara oscura y extremidades largas. Los especímenes presentaron una conducta territorial al percibirse de la presencia humana, emitiendo vocalizaciones de alarma, quebrando algunas ramas de los árboles y ocultando a los inmaduros. Después de 15 minutos se alejaron entre el dosel de los árboles hacia la cima de la montaña sin dejar de emitir alguna vocalización. H. O. Chávez Sae (Com. Pers. 2017) menciona que en ocasiones ha observado en la zona hasta 20 individuos juntos y que la tropa se distribuye desde el lugar conocido como "Cooperativa La Marañonera" ($13^{\circ}.295028' N$ - $88^{\circ}.031886' O$) hasta el cerro "Nariz del Diablo" ($13^{\circ}.285052' N$ - $88^{\circ}.105151' O$) que se encuentra en la misma cordillera del presente registro. Con este reporte se constituye el registro más actualizado de monos araña en la laguna de Olomega y para el Departamento de San Miguel, pues no se habían observado desde 1944 en esta zona.

Es necesario realizar un monitoreo de la población de monos araña en Olomega, en donde se recopile información de su distribución en el sitio, para conocer si representa un corredor biológico entre otras poblaciones reportadas para el país, estado de salud de la tropa, subespecie, principales amenazas, disponibilidad de alimento y refugio. Debido al estado de conservación nacional e internacional, se deben hacer los esfuerzos necesarios para incluir la mencionada cordillera, en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Nacional e implementar medidas de protección y vigilancia de la especie.

AGRADECIMIENTOS. Agradecemos a José Edras Ramírez Piñeda, Eliab Gamalíel Martínez Velásquez, Hugo Omar Chávez, por apoyarnos y guiarnos a la población de mono araña en Olomega, a Francisco Barraza Ferrer y Miriam Sánchez Recacha, Lcda Silvia de Larios, MSc. Jaime Espinoza; a los Ingenieros Luis Ernesto Chipagua y David Eliseo Martínez, por su respaldo a la expedición y elaboración de mapas y a los colegas expertos: Biólogos Elba Martínez de Navas, Enrique Fajardo y Karenina Morales Baumann, por sus contribuciones para mejorar el manuscrito.



Figuras 3-8. Documentación fotográfica de población de *Ateles geoffroyi*, fotografía por: J. I. Flores Márquez 06/04/2017.



LITERATURA CITADA

- Argueta Rivas, N. & Rivera, G. M.** (2004). Uso de hábitat de mono araña (*Ateles geoffroyi*) en el Área Natural Protegida Normandía, Usulután, El Salvador. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. 46 p.
- Barraza-Ferrer, F. & Sánchez-Recacha, M.** (2017). *Informe socioambiental de la Laguna de Olomega*. Cooperación Internacional América Central, San Miguel. 41 p.
- Burt, W. H. & Stirton, R. A.** (1961). The mammals of El Salvador. *Museum of Zoology, Michigan University*. 69 p.
- Díaz, I., Jiménez, I., de López, M. J. & Sánchez-Mármol, L.** (2004). Plan de Manejo del Área Natural Humedal Olomega. MARN/AECI. Documento sin publicar. San Salvador.
- Guzmán Serrano, V., Henríquez, S., Rodríguez, M. & Lara, K.** (2008). *Mamíferos de El Salvador*: Fichas técnicas. Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) - Universidad de El Salvador (UES /Escuela de Biología), San Salvador. 299 p.
- IUCN.** (2016). The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2016-3. Disponible en: <http://www.iucnredlist.org> (Consultado 11 Abril 2017).
- Jiménez, I. & Sánchez-Mármol, L.** (2004). *Humedal Laguna de Olomega*. Propuesta de Sitio Ramsar. MARN/AECI. San Salvador. El Salvador C.A. 45 p.
- Kellogg, R. & Goldman, E. A.** (1944). Review of the spider monkeys. *Proc. U.S. Natl. Mus.*, Vol. 96, N° 3186:1-45, 1 fig.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).** (2011). Mapa de Ecosistemas de El Salvador Actualización 2011. GEF / Banco Mundial, Proyecto PACAP. 123 p.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).** (2015). Listado oficial de especies de vida silvestre amenazada o en peligro de extinción en El Salvador. *Diario Oficial* Tomo No. 409, Número 181. Acuerdo No. 74, 5 de octubre de 2015. Págs. 45-65.
- Morales Hernández, K.** (2002). Wild populations of spider monkeys (*Ateles geoffroyi*) in El Salvador, Central America. *Neotropical Primates*. 10(3): 153-154.
- Morales Hernández, K.** (2003). Estudio preliminar de la población de *Ateles geoffroyi* "mono araña" en Chaguantique y El Tercio, Departamento de Usulután, El Salvador. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. 70 p.
- Reid, F.** (2009). A field guide to the mammals of Central America and Southeast México. *Oxford University Press*, 2a ed. 384 p.
- Owen, J. G. & Girón, L.** (2012). Revised Checklist and Distributions of Land Mammals of El Salvador. *Occasional papers. Museum of Texas Tech University*. N° 310. 32 p.
- Roosmalen, M. G. M. & Klein, L. L.** (1998). The Spider Monkeys, genus *Ateles* In: R. A. Mittermeier, A. B. Rylands, A. F. Coimbra-Filho, y G. A. B. de Fonseca. *Ecology behavior of Neotropical Primates*. Pp. 455-537. World Wildlife Found, Washington, DC.
- Rodríguez Menjívar, M. E.** (2007.) Monitoreo poblacional de mono araña (*Ateles geoffroyi*) en el Área Natural Protegida Normandía, Usulután, El Salvador. Informe final. CENCITA. 24 p.
- Stephens, J. L.** (1996). *Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán* (1841). Smithsonian Institution Press, Washington, D. C.
- Velado Cano, M. A. & Pablo Cea J. D.** (2012). Impacto de escarabajo barrenador (*Acrocinus longimanus*) sobre los árboles de ojushe (*Brosimum alicastrum*) y el efecto indirecto sobre la población de monos araña (*Ateles geoffroyi*) en el Área Natural Protegida Chaguantique, Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador. Reporte final de horas sociales, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela de Biología. 51 p.