



Revista MVZ Córdoba

ISSN: 0122-0268

editormvzcordoba@gmail.com

Universidad de Córdoba

Colombia

Colina R, Janeth; Méndez O, Adriana; Araque M, Humberto; Rueda de A, Emma; León T, Milagro;
Rossini V, Mario

Lípidos sanguíneos en cerdos alimentados con pijiguo (Bactris gasipaes Kunth) y lisina sintética

Revista MVZ Córdoba, vol. 16, núm. 3, septiembre-diciembre, 2011, pp. 2668-2677

Universidad de Córdoba

Montería, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69322399003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Lípidos sanguíneos en cerdos alimentados con pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth) y lisina sintética

Blood lipids of pigs fed peach palm (*Bactris gasipaes* Kunth) and synthetic lysine

Janeth Colina R,^{1,2*} Ph.D, Adriana Méndez O,^{1,2,3} M.Sc, Humberto Araque M,^{1,4,5} M.Sc, Emma Rueda de A,^{1,2,6} M.Sc, Milagro León T,^{1,2,3} M.Sc, Mario Rossini V,^{1,2} M.Sc.

¹Universidad Central de Venezuela. ²Facultad de Ciencias Veterinarias. ³Centro de Bioquímica Nutricional. ⁴Facultad de Agronomía. ⁵Instituto de Producción Animal. ⁶Laboratorio de Enzimología y Toxicología Veterinaria. ⁷Laboratorio de Patología Clínica. Maracay Estado Aragua. 2101. Venezuela.

*Correspondencia: janeth.colina@ucv.ve

Recibido: Octubre de 2010; Aceptado: Junio de 2011.

RESUMEN

Objetivo. Evaluar el efecto de la harina de pijiguo y lisina sintética sobre los lípidos sanguíneos de cerdos en crecimiento y engorde. **Materiales y métodos.** El estudio se realizó en dos etapas. En la primera etapa se utilizaron 72 cerdos castrados en crecimiento de 30 ± 0.5 kg, en un arreglo factorial 2x3: dos niveles de lisina sintética (0 y 2.70 g/kg) y tres niveles de harina de pijiguo (0, 160 y 320 g/kg). En la segunda etapa se utilizaron 16 cerdos en engorde de 67.25 ± 1.17 kg, en un arreglo factorial 2x2: dos niveles de lisina sintética (0 y 2.70 g/kg) y dos niveles de pijiguo (0 y 175 g/kg). Se determinaron las concentraciones séricas de triacilgliceroles, colesterol total y ácidos grasos. **Resultados.** Los cerdos en crecimiento que consumieron pijiguo presentaron menores ($p<0.001$) concentraciones de colesterol que el grupo control (2.27 y 2.23 mmol/l vs 2.56 mmol/l) y triacilgliceroles (0.34 y 0.28 mmol/l vs 0.42 mmol/l). El ácido oleico incrementó ($p<0.01$) con el mayor nivel de pijiguo (20.78% a 28.84%), y la lisina aumentó ($p<0.05$) el ácido linoleico (27.83% a 31.29%). Los cerdos alimentados con pijiguo y lisina mostraron menor ($p<0.001$) ácido palmítico que el grupo con pijiguo sin lisina (0.23 y 0.19% vs 0.45 y 0.62%, respectivamente). En la etapa de engorde los triacilgliceroles disminuyeron ($p<0.05$) en los cerdos alimentados con pijiguo y lisina (0.46 a 0.36 mmol/l). Los cerdos alimentados con pijiguo mostraron menor ácido linoleico y mayor ácido oleico ($p<0.001$). **Conclusiones.** Las dietas con pijiguo y lisina sintética no causaron efectos negativos sobre los lípidos sanguíneos de cerdos.

Palabras clave: Ácidos grasos, *Bactris gasipaes*, cerdo, colesterol, lisina, triglicéridos (Fuente: Agrovoc).

ABSTRACT

Objective. Two experiments were designed to evaluate the effect of peach palm meal and synthetic lysine on blood lipids of growing and finishing pigs. **Materials and methods.** In experiment 1, 72 barrows of 30 ± 0.5 kg were randomly allotted into a 2x3 factorial design: being the main factors levels of synthetic lysine (0 and 2.70 g/kg) and levels of peach palm meal (0, 160 and 320 g/kg). In experiment 2, 16 finishing pigs of 67.25 ± 1.17 kg were used and allotted in a 2x2 factorial design arrangement of treatments: with two levels of synthetic lysine (0 and 2.70 g/kg) and two levels of peach palm meal (0 and 175 g/kg). Serum triglycerides, total cholesterol and fatty acid profile were determined. **Results.** In experiment 1, growing pigs fed with 160 and 320 g/kg of peach palm showed lower ($p<0.001$) cholesterol (2.27 and 2.23 mmol/l, respectively) than the control (2.56 mmol/l). The levels of triglycerides were also lower in pigs fed with 160 and 320 g/kg (0.34 and 0.28 mmol/l) than control group (0.42 mmol/l). Oleic acid concentration increased ($p<0.01$) in pigs that received the highest level of peach palm (320 g/kg) with respect to the control group (20.78% to 28.84%) and synthetic lysine increased ($p<0.05$) linoleic acid (27.83% to 31.29%). Pigs fed peach palm and lysine had lower ($p<0.001$) palmitic acid concentration than the group fed pijiguao without lysine (0.23% and 0.19% vs 0.45% and 0.62%, respectively). In experiment 2, triglycerides decreased ($p<0.05$) in pigs that received lysine and peach palm (0.46 to 0.36 mmol/l). Pigs fed with peach palm had lower linoleic acid and higher oleic acid ($p<0.001$). **Conclusions.** Diets with peach palm and synthetic lysine do not elicit detrimental effects on blood lipid profile in pigs.

Key words: *Bactris gasipaes*, cholesterol, fatty acids, lysine, pig, triglycerides. (Source: Agrovoc).

INTRODUCCIÓN

La palma de pijiguao (*Bactris gasipaes* Kunth) es un cultivo no tradicional perteneciente a la familia Aracaceae, es originaria del trópico húmedo (1), y se le conoce en otros países como pupunha (Brasil), peach palm (Trinidad y Tobago), pejibaye (Costa Rica), chonta (Bolivia) y chontaduro (Colombia). Del fruto del pijiguao se obtiene la harina (pericarpio y almendra), cuya composición química la califica como una excelente fuente de energía en dietas para humanos y animales (1), obteniéndose resultados satisfactorios cuando se ha utilizado en la alimentación de aves (2) y cerdos (3-5), especies de interés zootécnico para la producción de proteína de origen animal para consumo humano.

La palma de pijiguao, se utiliza artesanalmente en algunas regiones indígenas de la Amazonía, por lo que el conocimiento de su composición y efectos sobre la respuesta animal al incluirla como materia prima alternativa en las dietas para la alimentación animal, sería de gran utilidad en varios países tropicales.

La harina de pijiguao contiene 12.58% de grasa (6) y el aceite extraído de los frutos enteros de pijiguao contiene 52% de ácido oleico y es deficiente en ácido linoleico (7). El consumo de ácido oleico se ha asociado con disminución en la concentración del colesterol total, los triacilgliceroles y las lipoproteínas de alta densidad (8). Por otra parte, aunque la harina de pijiguao contiene aproximadamente entre 24 y 42% de ácido palmitico (9), se ha demostrado que el consumo de este ácido graso no eleva las concentraciones de colesterol plasmático si se encuentra en proporciones adecuadas conjuntamente con ácidos grasos insaturados (10). La harina de pijiguao contiene bajos niveles de ácido mirístico y láurico, los cuales han sido relacionados con efectos hipercolesterolemicos en humanos (11).

Se ha señalado que puede existir relación entre los lípidos sanguíneos y la calidad de la carne producida en cerdos (12). En tal sentido, la harina de pijiguao es un ingrediente energético que amerita ser evaluado en esta especie, ya que los efectos metabóli-

cos se deben principalmente al consumo de grasas y dependiendo de la fuente lipídica de la dieta, y más específicamente del perfil de ácidos grasos que ésta contenga, los efectos serán más acentuados (13). Adicionalmente, se ha sugerido, que la harina de pijiguo puede ser incluida en grandes proporciones en las dietas para animales, si se cubren las necesidades de los aminoácidos limitantes (1), como la lisina en forma sintética, para disminuir el exceso de proteína (4).

La evidencia científica destaca la composición química de la harina del fruto de pijiguo (1,7), su contenido de ácidos grasos (9) y su uso como ingrediente energético, sin afectar la ganancia de peso (4), las características de la canal (5) y las variables hematológicas y peso de órganos en cerdos (14). No obstante, no se ha reportado el efecto de este ingrediente alternativo sobre los lípidos sanguíneos de esta especie. En tal sentido, estos estudios se condujeron para evaluar el efecto de la harina de pijiguo y la lisina sintética sobre los lípidos sanguíneos de cerdos en crecimiento y engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

Instalaciones y animales. El estudio se realizó en el Laboratorio Sección Porcinos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Maracay, estado Aragua, el cual está ubicado a 67°36'36" longitud Este, 10°16'20" latitud Norte y 443 m.s.n.m, con una temperatura media de 25.1°C y una pluviosidad promedio anual de 1063 mm. Los cerdos fueron alojados en corrales de piso sólido con dimensiones de 4.0 m² cada uno y provistos de un comedero y un bebedero para suministro de alimento y agua *ad libitum*. La duración de cada estudio fue de 42 y 35 días para las etapas de crecimiento y engorde, respectivamente. Todos los cerdos utilizados fueron machos castrados del cruce de las razas Yorkshire x Landrace provenientes de una granja comercial. En la etapa de crecimiento, se utilizaron 72 cerdos con un peso inicial de 30 ± 0.5 kg y una edad promedio de 67 días. En la etapa de engorde, se utilizaron

16 cerdos con un peso vivo promedio inicial de 67.25±1.17 kg y de 107 días de edad.

Obtención de la harina de pijiguo. Los frutos maduros enteros de la palma de pijiguo (pericarpio y almendra), fueron obtenidos y procesados de acuerdo a procedimientos descritos anteriormente (4) para obtener la harina cuya composición química, incluyendo el perfil de ácidos grasos, se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Composición química de la harina de pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth).

Variable	g/kg
Materia seca	920.10
Proteína cruda	80.80
Lisina total	2.60
Grasa cruda	138.90
Energía bruta MJ/kg	19.10
Ácidos grasos	% de área
Láurico	3.60
Mirístico	1.80
Palmítico	32.84
Palmitoleico	7.40
Esteárico	1.86
Oleico	40.93
Linoleico	9.16
Linolénico	2.46
Ácidos grasos saturados	40.10
Ácidos grasos monoinsaturados	48.33
Ácidos grasos poliinsaturados	11.62

Dietas experimentales. Las dietas experimentales han sido descritas previamente (4-5) y fueron formuladas de acuerdo a las necesidades nutricionales sugeridas para cerdos en ambas etapas (15). En la etapa de crecimiento, los cerdos fueron distribuidos a uno de seis tratamientos empleando un diseño completamente al azar con arreglo factorial de tratamientos 2x3: dos niveles de lisina sintética en la forma de L-lisina HCl (0 y 2.70 g/kg) y tres niveles de harina de pijiguo (0, 160 y 320 g/kg). La cantidad total de harina de pijiguo incluida en estas proporciones se obtuvo al sustituir el 25% y 50% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al (3). Para reemplazar las proporciones de energía del maíz por la harina de pijiguo, se tomó como re-

ferencia el estudio realizado en cerdos por Murillo (16). Se establecieron cuatro repeticiones por dieta y tres cerdos por unidad experimental.

En la etapa con cerdos de engorde se derivó un arreglo factorial 2x2: dos niveles de lisina sintética (0 y 2.70 g/kg) y dos niveles de harina de pijiguo (0 y 175 g/kg), con cuatro repeticiones por dieta y un cerdo por unidad experimental. Las dietas fueron isoenergéticas y con el mismo contenido de lisina de acuerdo a lo recomendado (15), tal como se evidencia en las tablas 2 y 3. La harina de pijiguo y las dietas experimentales fueron analizadas para determinar su composición química de acuerdo a los procedimientos descritos por la AOAC (17).

Obtención de muestras sanguíneas y análisis químicos. Se extrajeron muestras de sangre de la vena yugular externa de cada cerdo al inicio y al final de cada etapa, entre las 08:00 y 10:00 h, después de haber colocado el alimento en los comederos. Para la obtención de la muestra, se utilizaron jeringas estériles con agujas de 21 G x 1 ½" y tubos al vacío de 5 ml sin anticoagulante. Las muestras

Tabla 2. Composición química y contenido de ácidos grasos de las dietas para cerdos en etapa de crecimiento.

Lisina Sintética ¹	0			2.70		
Harina de Pijiguo ²	0	160	320	0	160	320
Composición (g/kg)						
Proteína cruda	182.9	182.8	180.6	158.0	157.7	158.4
Lisina total	9.80	9.60	9.70	9.60	9.50	9.80
Extracto etéreo	57.2	55.7	59.6	64.0	65.0	57.6
ED MJ/kg ³	14.5	14.5	14.6	14.5	14.5	14.6
Ácidos grasos (% de área)						
Palmitíco	0.20	1.20	1.26	0.47	0.73	0.80
Palmitoleíco	23.49	24.27	33.92	27.69	28.60	25.62
Oleico	33.89	36.64	36.95	37.66	38.22	39.38
Linoleíco	41.39	36.82	27.06	32.66	31.00	31.93
Linolénico	1.03	1.07	0.81	1.52	1.45	2.27

¹L-Lisina HCl (78% lisina) en g/kg añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC); ²Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% y 50% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al (3); ³Valor calculado.

Tabla 3. Composición química de las dietas para cerdos en etapa de engorde.

Lisina Sintética ¹	0		2.70		
	Harina de Pijiguo ²	0	175	0	175
Composición (g/kg)					
Proteína Cruda	156.3	123.9	159.4	126.7	
Lisina total	7.5	7.7	7.8	7.7	
Extracto etéreo	47.4	57.5	44.6	51.0	
ED MJ/kg ³	14.5	14.5	14.5	14.5	
Ácidos grasos (% de área)					
Palmitíco	1.32	1.49	1.13	1.73	
Palmitoleíco	30.80	32.00	31.87	32.09	
Oleico	40.03	40.00	41.00	43.00	
Linoleíco	27.09	25.00	25.80	22.00	
Linolénico	0.76	1.51	0.20	1.18	

¹L-Lisina HCl (78% lisina) en g/kg añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC); ²Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al (3); ³Valor calculado.

fueron transportadas al Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, donde fueron centrifugadas a 1500 g x 10 minutos a 4°C para obtener el suero sanguíneo que fue almacenado a -20°C hasta su utilización.

Las concentraciones séricas de colesterol total y triacilgliceroles se determinaron empleando los métodos enzimáticos-espectrofotométricos propuestos por Allain et al (18) y Bucolo y Harold (19), respectivamente. El perfil de ácidos grasos en la harina de pijiguo, en las dietas experimentales y en el suero sanguíneo se determinó según la metodología de Morrison y Smith (20) utilizando un cromatógrafo de gases AGILENT 6820, equipado con detector de ionización de llama. El equipo estaba provisto de una columna empacada con 15% de succinato de dietilenglicol (DEGS) sobre Chromosorb Wiaw, 80/100, 2 m, SST, 1/8" od x 2 mm id, empleando nitrógeno a 30 ml/minuto como gas de arrastre. La temperatura de la columna durante los primeros 5 minutos fue de 250°C y la del inyector de 230°C. Se inyectaron 2 µl de cada mezcla de ácidos grasos metilados, los cuales fueron identificados por sus tiempos de retención en comparación con los correspondientes patrones.

Análisis estadístico. Los datos obtenidos para cada variable estudiada fueron analizados utilizando el programa SAS (21) a través de PROC MIXED, empleando un modelo estadístico que incluyó los efectos simples y de la interacción entre los dos factores, harina de pijiguo y la lisina sintética, sobre el colesterol total, triacilgliceroles y perfil de ácidos grasos. Se realizaron contrastes utilizando una prueba de t de Student para comparar las medias de los diferentes tratamientos que se expresaron conjuntamente con sus respectivos errores estándar. Cuando las variables estudiadas resultaron significativamente diferentes ($p<0.05$) por efectos simples de los factores conjuntamente con los efectos de la interacción entre éstos, solo se discutieron estos últimos que corresponden al efecto de las dietas experimentales.

RESULTADOS

Cerdos en crecimiento. Los lípidos sanguíneos de los cerdos alimentados con harina de pijiguo en la etapa de crecimiento variaron significativamente ($p<0.001$) al compararse con el grupo control (Tabla 4). Los cerdos que consumieron las dietas con 160 y 320 g/kg

Tabla 4. Efectos simples de la harina de pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth) y lisina sintética sobre la concentración y composición de los lípidos sanguíneos de cerdos en etapa de crecimiento.

	Harina de pijiguo ¹				Lisina sintética ²		
	0	160	320	EE ³	0	2.70	EE ³
CT (mmol/l)	2.56 ^a	2.27 ^b	2.23 ^b	0.05	2.31	2.40	0.04
TAG (mmol/l)	0.42 ^a	0.34 ^b	0.28 ^b	0.02	0.32	0.35	0.01
Ácidos grasos (% de área) ⁴							
Palmitico	0.17 ^a	0.34 ^b	0.41 ^b	0.02	0.41 ^a	0.20 ^b	0.02
Palmitoleico	47.81	44.87	41.22	2.81	47.57	41.70	2.30
Esteárico	0.99	0.94	0.44	0.28	0.91	0.68	0.23
Oleico	20.78 ^a	24.49 ^a	28.84 ^b	1.34	23.28	26.13	1.09
Linoleico	30.24	29.36	29.10	1.78	27.83 ^a	31.29 ^b	1.45
AGS	1.17	1.28	0.85	0.29	1.32	0.88	0.23
AGM	68.60	69.36	70.06	1.45	70.85	67.83	1.18
AGP	30.24	29.36	29.10	1.78	27.83 ^a	31.29 ^b	1.45

¹ L-Lisina HCl (78% lisina) en g/kg añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC). ² Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% y 50% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al (3). ³ EE=Error estándar. ^{ab}Letras distintas en la misma fila para un factor indican diferencias significativas. Efecto de la harina de pijiguo sobre colesterol total (CT), triacilgliceroles (TAG), ácido palmitico ($p<0.001$) y oleico ($p<0.01$); y de lisina sintética sobre ácido linoleico ($p<0.05$) y palmitico ($p<0.001$). ⁴ AGS= Ácidos grasos saturados; AGM= Ácidos grasos monoinsaturados; AGP= Ácidos grasos poliinsaturados.

harina de pijiguo presentaron disminución ($p<0.001$) en la concentración de colesterol total con respecto al grupo que no consumió harina de pijiguo. De igual manera, las concentraciones de triacilgliceroles fueron menores ($p<0.001$) en los cerdos alimentados con harina de pijiguo a ambos niveles al compararse con el grupo control. No se observó efecto de este ingrediente sobre el total de ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM), o poliinsaturados (AGP), no obstante, se evidenciaron variaciones en los ácidos grasos individualmente. En tal sentido, la concentración del ácido oleico, fue mayor ($p<0.01$) en los cerdos alimentados con 320 g/kg harina de pijiguo al compararse con el grupo de cerdos bajo el tratamiento con 160 g/kg y las dietas sin harina de pijiguo ($p<0.01$). Además, la concentración de ácido palmítico aumentó significativamente ($p<0.001$) en los cerdos alimentados con los dos niveles de harina de pijiguo, con respecto al grupo de cerdos alimentados con las dietas sin este ingrediente, y se redujo en los cerdos alimentados con lisina sintética ($p<0.001$).

Por otra parte, la lisina sintética aumentó ($p<0.05$), los AGP, representados por el ácido linoleico independientemente de la adición de harina de pijiguo, y sin evidencia de efectos significativos sobre las concentraciones de colesterol total y triacilgliceroles. El efecto de la interacción (efecto de dieta) entre los dos factores estudiados (Tabla 5), indicó que los cerdos alimentados con harina de pijiguo a ambos niveles con lisina sintética presentaron menores ($p<0.001$) concentraciones de ácido palmítico en comparación con los cerdos que consumieron harina de pijiguo sin lisina, pero fueron similares al grupo de la dieta control. No se observaron variaciones significativas entre dietas para el resto de los ácidos grasos, el colesterol total y los triacilgliceroles (Tabla 5).

Cerdos en engorde. En la etapa de engorde (Tabla 6), las concentraciones séricas de triacilgliceroles disminuyeron en los cerdos alimentados, tanto con harina de pijiguo ($p<0.01$) como con lisina sintética ($p<0.01$), y la interacción entre ambos factores redujo ($p<0.05$)

Tabla 5. Efectos de la interacción de la harina de pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth) y lisina sintética sobre la concentración y composición de los lípidos sanguíneos de cerdos en etapa de crecimiento.

Lisina sintética ¹	0			2.70			EE ³
	0	160	320	0	160	320	
Harina de Pijiguo ²							
CT (mmol/l)	2.53	2.19	2.20	2.59	2.35	2.25	0.08
TAG (mmol/l)	0.39	0.31	0.28	0.45	0.32	0.35	0.02
Ácidos grasos (% de área)⁴							
Palmítico	0.16 ^a	0.45 ^b	0.62 ^b	0.19 ^a	0.23 ^a	0.19 ^a	0.03
Palmitoleico	51.11	47.30	44.30	44.53	42.44	48.14	3.15
Esteárico	1.39	0.78	0.52	0.60	1.11	0.33	0.39
Oleico	18.36	23.68	27.80	23.21	25.31	29.87	1.90
Linoleico	28.99	27.80	26.72	31.49	30.92	31.48	2.11
AGS	1.55	1.23	1.19	0.79	1.34	0.51	0.41
AGM	69.47	70.97	72.10	67.74	67.75	68.02	2.05
AGP	28.99	27.80	26.72	31.49	30.92	31.48	2.11

¹L-Lisina HCl (78% lisina) en g kg⁻¹ añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC); ²Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% y 50% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ kg⁻¹ aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ kg⁻¹ según González et al (3); ³EE= Error estándar; ^{ab}=Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas ($p<0.001$). Sin efectos sobre los triacilgliceroles (TAG) y colesterol total (CT). ⁴AGS=Ácidos grasos saturados; AGM= Ácidos grasos monoinsaturados; AGP= Ácidos grasos poliinsaturados.

Tabla 6. Efectos simples de la harina de pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth) y lisina sintética sobre la concentración y composición de los lípidos sanguíneos de cerdos en etapa de engorde.

	Harina de pijiguo ¹			Lisina Sintética ²			EE ³
	0	175	EE ³	0	2.70	EE ³	
CT (mmol/l)	2.47	2.55	0.07	2.49	2.53	0.07	
TAG (mmol/l)	0.42 ^a	0.38 ^b	0.01	0.42 ^a	0.37 ^b	0.01	
Ácidos grasos (% de área)							
Palmítico	1.14	1.62	0.21	1.42	1.35	0.21	
Palmitoleico	34.05	31.91	1.25	35.30	30.03	1.25	
Esteárico	0.35	0.36	0.09	0.27	0.43	0.09	
Oleico	33.64 ^a	41.49 ^b	3.23	35.30 ^a	39.83 ^b	3.23	
Linoleico	30.83 ^a	24.63 ^b	1.32	27.69	27.76	1.32	
AGS	1.49	1.98	0.21	1.69	1.78	0.21	
AGM	67.68 ^a	73.40 ^b	1.34	70.62	70.46	1.34	
AGP	30.83 ^a	24.63 ^b	1.32	27.69	27.76	1.32	

¹L-Lisina HCl (78% lisina) en g/kg añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC); ²Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al (3); ³EE=Error estándar. ^{ab}=Letras distintas en la misma fila para cada factor indican diferencias significativas: Efectos de la harina de pijiguo sobre triacilgliceroles (TAG) y AGM ($p=0.01$), ácidos linoleico y oleico ($p<0.001$) y TAG ($p<0.01$). Sin efectos sobre colesterol total (CT); ⁴AGS=Ácidos grasos saturados; AGM= Ácidos grasos monoinsaturados y AGP=Ácidos grasos poliinsaturados.

los valores de esta variable (Tabla 7), al compararse con el valor mostrado por el grupo de cerdos de la dieta control ($p<0.05$). Por el contrario, las concentraciones de colesterol total fueron similares entre grupos. Con respecto a los ácidos grasos (Tabla 6), se observó un incremento significativo en la proporción correspondiente al ácido oleico en los cerdos alimentados con harina de pijiguo ($p<0.001$) o la lisina sintética ($p<0.05$) al compararse con los grupos sin harina de pijiguo o sin lisina sintética.

Por otra parte, los cerdos alimentados con harina de pijiguo mostraron menor proporción de ácido linoléico ($p<0.001$) dentro del grupo de los ácidos grasos poliinsaturados (AGP). No se observaron efectos significativos de las dietas sobre el perfil de los ácidos grasos evaluados (Tabla 7).

Tabla 7. Efectos de la interacción entre harina de pijiguo (*Bactris gasipaes* Kunth) y lisina sintética sobre la concentración y composición de los lípidos sanguíneos de cerdos en etapa de engorde.

Lisina Sintética ¹	0			2.70			EE ³
	0	175	EE ³	0	175	EE ³	
Harina de Pijiguo ²							
CT (mmol/l)	2.47	2.52	2.46	2.59	0.10		
TAG (mmol/l)	0.46 ^a	0.39 ^b	0.37 ^b	0.36 ^b	0.01		
Ácidos grasos (% de área)							
Palmítico	1.26	1.58	1.03	1.66	0.29		
Palmitoleico	36.41	34.23	31.69	29.58	4.52		
Esteárico	0.17	0.38	0.52	0.34	0.13		
Oleico	30.72	39.89	36.56	43.09	2.17		
Linoleico	31.46	23.93	30.20	25.32	1.86		
AGS	1.43	1.95	1.55	2.01	0.30		
AGM	67.12	74.12	68.25	72.67	1.90		
AGP	31.46	23.93	30.20	25.32	1.86		

¹L-Lisina HCl (78% lisina) en g/kg añadida a expensas de harina de soya (46.5% PC); ²Valores obtenidos en g/kg al sustituir el 25% de la energía digestible (ED) de 14.75 MJ/kg aportada por el maíz (15) por la ED de la harina de pijiguo de 15.94 MJ/kg según González et al(3); ³EE=Error estándar. ^{ab}=Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas ($p<0.05$) para triacilgliceroles (TAG), sin efectos sobre colesterol total (CT); AGS=Ácidos grasos saturados; AGM=Ácidos grasos monoinsaturados; AGP=Ácidos grasos poliinsaturados.

DISCUSIÓN

Las concentraciones de colesterol total y triacilgliceroles para cerdos en crecimiento y engorde, se ubicaron dentro de los valores de referencia señalados por Dubreuil y

Lapierre (22), quienes reportaron un rango de 2.46-2.56 mmol/l y 0.36-0.42 mmol/l para colesterol y triacilgliceroles, respectivamente.

La reducción en las concentraciones séricas de colesterol total y triacilgliceroles se ha asociado al consumo de ácido oleico en humanos (8). Este ácido graso se encuentra en un 40.93% en la harina de pijiguo utilizada en el presente estudio, valor que se aproxima al encontrado en una de las variedades de pijiguo evaluadas en Brasil de 42.80% (9). En tal sentido, la proporción de ácido oleico presente en la harina de pijiguo permite sustentar la respuesta de menores concentraciones de colesterol y triacilgliceroles de los cerdos en crecimiento alimentados con este ingrediente. Aunque no existen evidencias previas referentes a los efectos de la harina de pijiguo sobre los lípidos sanguíneos en cerdos, se han evaluado los efectos del extracto acuoso del fruto de pijiguo sobre el metabolismo de ratas jóvenes (23), observándose una disminución en los niveles de triacilgliceroles, lo cual es coincidente con los resultados aquí obtenidos.

Por el contrario, en ese mismo estudio (23), se encontró un incremento en las concentraciones de colesterol en las ratas evaluadas, mientras que en pollos de engorde (7), la inclusión del aceite de pijiguo en las dietas no produjo variaciones significativas en el contenido total de colesterol al compararse con otras fuentes lipídicas.

Estos resultados difieren de la respuesta observada para esta variable en los cerdos de ambas etapas, lo que podría estar relacionado a variaciones entre especies o con el procesamiento del fruto de pijiguo utilizado.

Adicionalmente, los ácidos grasos saturados como el mirístico y el láurico están relacionados con incrementos en las concentraciones de colesterol (11), no obstante, el contenido de estos ácidos grasos en la harina de pijiguo fue relativamente bajo, por lo que al mezclarla con el resto de los ingredientes de las

dietas no se detectó la presencia de los mismos, argumento válido que podría explicar la disminución en las concentraciones de colesterol encontradas en el presente estudio.

La respuesta asociada con menores concentraciones de triacilgliceroles de los cerdos alimentados con harina de pijiguo y lisina sintética en la etapa de engorde, sugiere un efecto favorable al incluir ambos ingredientes en la dieta de cerdos próximos al sacrificio. Los ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico, presente en relativamente alta proporción en las dietas con harina de pijiguo, se han relacionado con reducciones en las concentraciones de triacilgliceroles (24), lo que conjuntamente con la disminución de la hiperlipidemia que genera la inclusión de lisina sintética en la dieta (25), posiblemente respalda la respuesta observada de menor concentración de triacilgliceroles al incluir harina de pijiguo y lisina sintética a la dieta.

La adición de lisina sintética en la forma L-lisina HCl a las dietas, no produjo variaciones en las concentraciones de colesterol total en ninguna de las dos etapas, respuesta que se sustenta con resultados obtenidos previamente, que no reportaron cambios significativos en los valores de esta variable al incrementar el contenido de lisina añadiendo L-lisina HCl en las dietas para cerdas (26).

De manera similar, en un estudio conducido para determinar la eficacia de dos fuentes de lisina sintética (L-lisina HCl y L-lisina sulfato) en la dieta de pollos, no se reportaron variaciones en los valores séricos de colesterol total (27).

Las variaciones en los valores sanguíneos de los ácidos grasos pueden atribuirse al contenido de los mismos en los ingredientes utilizados, ya que se ha determinado que los ácidos grasos presentes en la dieta, influyen directamente sobre los lípidos sanguíneos (24). En tal sentido, es posible explicar el incremento del ácido oleico al añadir 320 g/kg y 175 g/kg de harina de pijiguo en las dietas de los cerdos en crecimiento y engorde, respectivamente.

Asimismo, la disminución de los niveles de los AGP, específicamente el ácido linoleico en este caso, en los cerdos en etapa de engorde alimentados con harina de pijiguo, podría asociarse con el menor contenido de este ácido graso en las dietas que contenían este ingrediente.

Es limitada la disponibilidad de antecedentes científicos que sustenten el resultado de la interacción encontrada entre la harina de pijiguo y lisina sintética en la dieta sobre la reducción del ácido palmítico de cerdos en la etapa crecimiento. Aunque es relativamente alta la proporción de este ácido graso en la harina de pijiguo utilizada (32.84%), su contenido en las dietas experimentales de ambas etapas fue bajo en relación al resto de los ácidos grasos, exceptuando al ácido linolénico.

Aunque las concentraciones del ácido palmítico fueron mayores en los cerdos alimentados con harina de pijiguo sin lisina y el grupo de la dieta control, se evidencian reducciones importantes de este ácido graso en los cerdos alimentados con lisina sintética y harina de pijiguo. La lisina sintética en la forma de L-lisina HCl, como la utilizada en el presente estudio, se ha relacionado con la reducción de la síntesis de ácido palmítico al disminuir la concentración del malonil-CoA en el hígado por inhibición de la enzima acetil-CoA carboxilasa, vía proteína cinasa dependiente de AMPc (AMPK) en ratones (25), favoreciendo a su vez la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación. Por otra parte, la lisina es un aminoácido esencial utilizado para la síntesis de carnitina, la cual interviene en el transporte de ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial para su oxidación y posterior utilización para proveer energía (28).

La evidencia científica indica que el suministro de lisina sintética en la dieta puede aumentar la síntesis de L-carnitina y en consecuencia la β -oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, probablemente disminuyendo su concentración en suero sanguíneo; lo que, con-

comitantemente con una disminución de la síntesis del palmitato podría explicar el efecto encontrado como resultado de la interacción entre la harina de pijiguo y lisina sintética para el ácido palmítico, que se manifestó en los cerdos en crecimiento con pesos entre 30 y 67 kg.

Los resultados indican que al incluir harina de pijiguo a las dietas es posible reducir las concentraciones séricas de triacilgliceroles y colesterol en cerdos en etapa de crecimiento, respuesta que parece ser independiente de la inclusión de lisina sintética, mientras que el consumo de este aminoácido conjuntamente con la harina de pijiguo, podría disminuir las concentraciones séricas de ácido palmítico, probablemente debido a los efectos hipolipídicos de la lisina en forma libre.

Adicionalmente, en la etapa de engorde, el consumo de la harina de pijiguo y la lisina sintética podría disminuir las concentraciones de triacilgliceroles, probablemente como respuesta al elevado contenido de ácido oleico, cuya concentración sérica incrementa en respuesta al consumo de dietas con harina de pijiguo. De manera general, se puede afirmar que el pijiguo es un ingrediente con una relación de ácidos grasos insaturados:saturados que sugiere que es posible su incorporación a dietas para cerdos sustituyendo la energía aportada por el maíz como ingrediente energético principal, sin causar efectos negativos sobre los lípidos sanguíneos o dislipidemias.

En conclusión, las dietas con pijiguo y lisina sintética no causaron efectos negativos sobre los lípidos sanguíneos de cerdos.

Agradecimiento

Al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela (CDCH-UCV) por el financiamiento concedido para la ejecución del Proyecto de Investigación: PG Nro. 11-7137-2008.

REFERENCIAS

1. Leterme P, García M, Londoño A, Rojas M, Buldgen A, Souffrant W. Chemical composition and nutritive value of peach palm (*Bactris gasipaes* Kunth) in rats. *J Sci Food Agric* 2005; 85:1505-1521.
2. Gonzales L, Navarro D, Vásquez R. Deshidratación del *Bactris gasipaes* Kunth (pijuyao) por flujo de aire caliente y su empleo como sustituto del maíz en raciones para pollos parrilleros. *Revista Amazónica de Investigación Alimentaria RAIA* 2002; 2:67-87.
3. González C, Díaz I, Salas R. Determinación de la digestibilidad ileal aparente en cerdos de la harina de pijiguao (*Bactris gasipaes* H.B.K.). *Arch Latinoam Prod Anim* 1997; 5(Supl 1):283-284.
4. Rico D, Colina J, Araque H, Rossini M, Rueda de AE, León M. Comportamiento productivo de cerdos en crecimiento alimentados con harina de pijiguao (*Bactris gasipaes* H.B.K.) y lisina. *Rev Fac Agron (UCV)* 2009; 35:49-55.
5. Colina-Rivero J, Araque-Molina H, Jerez-Timaure N, Rico-Barreto D. Crecimiento y características de la canal de cerdos en engorde alimentados con harina de pijiguao (*Bactris gasipaes* H.B.K.) y lisina. *Rev Fac Agron LUZ* 2010; 27: 251-269.
6. Pizzani P, Blanco M, Malaver T, Godoy S, Matute I, Palma J, et al. Composición fitoquímica y nutricional de harina de pijiguao (*Bactris gasipaes* Kunth en H.B.K.). *Zootecnia Trop* 2008; 26:235-238.
7. Baldizán G, Oviedo M, Michelangeli C, Vargas RE. Effects of peach palm oil on performance, serum lipoproteins and haemostasis in broilers. *Br Poult Sci* 2010; 51:784-790.
8. Lopez-Huertas E. Health effects of oleic acid and long chain omega-3 fatty acids (EPA and DHA) enriched milks. A review of intervention studies. *Pharmacol Res* 2010; 61:200-207.
9. Yuyama L, Aguiar J, Yuyama K, Clement C, Macedo S, Fávaro D, et al. Chemical composition of the fruit mesocarp of three peach palm (*Bactris gasipaes*) populations grown in Central Amazonia, Brazil. *Int J Food Sci Nutr* 2003; 54:49-56.
10. French MA, Sundram K, Thomas M. Cholesterolaemic effect of palmitic acid in relation to other dietary fatty acids. *Asia Pac J Clin Nutr* 2002; 11:S401-S407.
11. German JB, Dillard CJ. Saturated fats: what dietary intake?. *Am J Clin Nutr* 2004; 80:550-559.
12. Casellas J, Noguera JL, Reixach J, Díaz I, Amills M, Quintanilla R. Bayes factor analyses of heritability for serum and muscle lipid traits in Duroc pigs. *J Anim Sci* 2010; 88:2246-54.
13. Averette Gatlin L, See MT, Hansen JA, Odle J. Hydrogenated dietary fat improves pork quality of pigs from two lean genotypes. *J Anim Sci* 2003; 81:1989-1997.
14. Colina J, Rossini M, Tovar C, Araque H. Peso de órganos y parámetros hematológicos de cerdos en engorde alimentados con harina de pijiguao (*Bactris gasipaes* H.B.K.) y lisina. *Arch Latinoam Prod Anim* 2009; 17(Supl 1):175-179.
15. NRC. Nutrient Requirements of Swine, 10th ed. Washington, D.C.: National Academy Press; 1998.

16. Murillo M. Utilización de la harina de pejibaye en la alimentación de aves y cerdos. En: Mora-Urpi J, Szott L, Murillo M, Patiño VM (eds): IV Congreso Internacional sobre Biología, Agronomía e Industrialización del Pijuayo. Iquitos, Perú. Primera edición. San José de Costa Rica: Universidad de Costa Rica; 1993.
17. AOAC. Official Methods of Analysis. 15th ed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists; 1990.
18. Allain ChC, Poon LS, Chan CSG, Richmond W, Fu PC. Enzymatic Determination of Total Serum Cholesterol. Clin Chem 1974; 20: 470-475.
19. Bucolo G, Harold D. Quantitative Determination of Serum Triglycerides by the Use of Enzymes. Clin Chem 1973; 19: 476-482.
20. Morrison WR, Smith ML. Preparation of fatty acid methyl ester and dymethylacetals from lipids with boron fluoride-methanol. J Lipid Res 1964; 53: 600-608.
21. Statistical Analysis System (SAS 9.1). SAS Institute Inc., SAS 9.1, Cary, NC: 2004. [Citado 2009 Dic 12]. URL disponible en: URL:<http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/index.html>.
22. Dubreuil P, Lapierre H. Biochemistry reference values for Quebec lactating dairy cows, nursing sows, growing pigs and calves. Can J Vet Res 1997; 61:235-239.
23. Gómez G, Quesada S, Nanne C. Efecto de factores antinutricionales en el pejibaye (*Bactris gasipaes*) sobre el metabolismo de ratas jóvenes. Agronomía Costarricense 1998; 22:191-198.
24. Salajpal K, Karolyi D, Dikić M, Kantura V, Kiš G, Sinjer Ž. Influence of acorn intake on blood lipid profile and longissimus muscle characteristics of black slavonian pig. Acta Agric Slov 2008; (Supl 2): 99-105.
25. Hirabayashi Y, Murakami H, Inoue Y, Fujieda T, Kobayashi H. Dietary L-lysine supplementation reduces de novo lipogenesis via AMPK activation and malonyl-CoA suppression. FASEB J 2009; 23:227.6.
26. Friesen KG, Nelssen JL, Goodband RD, Tokach MD, Unruh JA, Kropf DH, et al. The effect of dietary lysine on growth, carcass composition, and lipid metabolism in high-lean growth gilts fed from 72 to 136 kilograms. J Anim Sci 1995; 73:3392-3401.
27. Bahadur V, Haldar S, Ghosh TK. Assessment of the Efficacy of L-Lysine Sulfate vis-à-vis L-Lysine Hydrochloride as Sources of Supplemental Lysine in Broiler Chickens. Vet Med Int [en línea] 2010 July 28 [fecha de acceso 22 de enero de 2011]; 2010 (964076), 9 pages. URL disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913816/?tool=pmcentrez>.
28. Owen KQ, Jit H, Maxwell CV, Nelssen, JL, Goodband RD, Tokach MD, et al. Dietary L-carnitine suppresses mitochondrial branched-chain keto acid dehydrogenase activity and enhances protein accretion and carcass characteristics of swine. J Anim Sci 2001; 79: 3104-3112.