



Orinoquia

ISSN: 0121-3709

orinoquia@hotmail.com

Universidad de Los Llanos

Colombia

Guerrero Pinilla, Jorge A.; Campuzano, Luis F.; Rojas, Salvador; Pachon-García, Jorge
Caracterización Morfológica y Agronómica de la Colección Nacional de Germoplasma de Jatropha
curcas L.

Orinoquia, vol. 15, núm. 2, diciembre, 2011, pp. 131-147

Universidad de Los Llanos

Meta, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89621355002>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

 redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Caracterización Morfológica y Agronómica de la Colección Nacional de Germoplasma de *Jatropha curcas* L.*

Morphological and Agronomic Characterisation of the *Jatropha curcas* L. Colombian Germplasm collection

Jorge A. Guerrero Pinilla^{1*}, Luis F. Campuzano^{2*}, Salvador Rojas^{3*}
Jorge Pachon-García^{4*}

¹Ingeniero Agrónomo, Universidad de los Llanos

^{2,3}Ingeniero Agrónomos PhD, Corpóica

⁴Biólogo MSc. Universidad de los Llanos

*jotapachon@hotmail.com

Recibido: Agosto 23 de 2011. Aceptado: Noviembre 8 de 2011

RESUMEN

Con el objetivo de estimar la diversidad genética de la colección colombiana de germoplasma de *Jatropha curcas* L., con un total de 246 accesiones colectadas en estado silvestre en distintas regiones del país, se llevó a cabo una caracterización morfológica y agronómica mediante la medición de 27 características genéticas de tipo cualitativo y cuantitativo. El estudio se basó en métodos de estadística multivariada para hallar la variabilidad genética entre las accesiones. Las distancias obtenidas en el dendograma posibilitaron formar 18 grupos al estimar el coeficiente de disimilaridad DICE entre los caracteres asociados a componentes de producción, características agronómicas y descriptores de interés específico, asociados a 10 componentes principales que logran explicar el 78,25 % de la variación. La caracterización morfológica permitió determinar la variabilidad genética dentro de las accesiones en especial los descriptores de disposición de arquitectura de planta, porte de las plantas, longitud de la parte de la rama no lignificada y color del látex. La importancia del estudio radica en el manejo y uso de estas accesiones en programas de mejoramiento genético tradicional o asistido por marcadores moleculares conforme al aprovechamiento de la especie en la agroindustria con fines energéticos en la producción de agrocombustibles.

Palabras clave: Descriptores, Variabilidad Genética, *Jatropha curcas* L., Agrocombustibles.

ABSTRACT

In order to determine the genetic diversity of the colombian germplasm collection of *Jatropha curcas* L., established with a total of 246 wild accessions collected in different regions of the country, it was carried out a morphological and agronomical characterization using 27 genetic traits either qualitative or quantitative type. The study was based on multivariable statistics statistical to determine the genetic variability among accessions. The distances in the dendrogram made possible to establish 18 groups based on the DICE dissimilarity coefficient between the characters associated with yield components, agronomic characteristics, and specific descriptors of interest related to 10 principal components obtained from 20 quantitative evaluated descriptors. Morphological characterization allowed us to determine the presence of genetic variability within accessions especially descriptors available to plant architecture, plant size, length of the not lignified branch, latex color and this study of the *Jatropha* germplasm collection allows the handling and use of accessions in traditional plant and molecular markers assisted programs according to the use of the species for energy purposes in the production of agrofuels.

Key words: Descriptors, Genetic Variability, *Jatropha curcas* L., Agrofuels.

INTRODUCCIÓN

El uso de especies de uso agrícola en las últimas décadas para la producción de agrocombustibles ha generado una búsqueda intensa para identificar nuevos recursos fitogenéticos con un alto potencial en la producción de biocombustibles sin poner en riesgo la seguridad alimentaria de los países. El problema se ha convertido no solo en un asunto de carácter agroindustrial sino que ha tomado una dimensión ética al ocasionar una disminución en la oferta de alimentos para favorecer la producción de biodiesel o bioetanol. En este contexto, el caso de el piñón de purga, *Jatropha curcas* L., usado popularmente para fines medicinales (Adolf *et al.*, 1984), surge como una excelente alternativa no solo porque su composición de ácidos grasos lo hace ideal para producción de un biodiesel de notable calidad sino porque además, su uso podría disminuir la presión que se produce sobre la demanda de oleaginosas liberándolas para la alimentación humana y animal.

Jatropha curcas L., es una especie perenne de la familia *Euphorbiaceae*, que no ha sido caracterizada completamente y el conocimiento de sus características fenotípicas y genotípicas es limitado aunque se han documentado hasta el momento ciertas características botánicas. *J. curcas* es un arbusto de crecimiento rápido que alcanza en promedio seis metros de altura, su

corteza es blanco-grisácea y exuda un látex translúcido color ámbar o rojizo viscoso. Los tallos crecen de manera simpodial con una discontinuidad morfológica en cada incremento. Normalmente se forman cinco raíces de cada arbusto, una central y cuatro periféricas (Toral, 2008). Las hojas se forman generalmente con cinco a siete lóbulos acumulados pocos profundos y grandes, tienen pecíolos largos con una longitud de diez a quince centímetros; anchura de nueve a quince centímetro, de forma ovada, las cuales caen durante la época seca (Guerrero, 2010).

Las inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en las ramas, compuestas a manera de panícula, en la cual, el eje principal se ramifica una o más veces y puede sostener las umbelas. En flores hermafroditas se colocan diez estambres en dos espirales distintas de cinco cada uno en una sola columna en el androceo. En el gineceo, tres estilos delgados son conatos en aproximadamente dos tercios de su longitud, dilatando al estigma bifurcado macizo. Ambas flores, masculinas y femeninas, son pequeñas (6-8 mm), verdoso-amarillas en su diámetro y pubescente. Los frutos son cápsulas drupáceas y ovoides. Despues de la polinización se forma una fruta trilocular de forma elipsoidal. Las frutas son cápsulas inicialmente verdes que se tornan café

oscuro o negro en el proceso de maduración. Las cápsulas de los frutos son de 2.5 a 4 cm de largo por 2 cm de ancho, elipsoidales y lisas que al inicio son carnosas pero dehiscentes cuando son secas (Mishra, 2009). Cada inflorescencia rinde un manojo de aproximadamente 10 frutos ovoides o más. El desarrollo del fruto necesita 90 días desde la floración hasta que madura la semilla (Heller, 1996). La fruta produce tres almendras negras por lo general, cada una aproximadamente de 2 cm de largo y 1 cm de diámetro.

La semilla se cosecha cuando la cápsula está madura. La maduración se evidencia cuando esta cambia de verde a amarillo lo cual ocurre después de dos a cuatro meses de la polinización. Las semillas se usan comúnmente como laxante al tiempo que las evidencias actuales indican que estas presentan una proporción de aceite del 48 % (Panigrahi *et al.*, 1984).

La especie presenta actualmente limitantes de manejo en cultivo para fines industriales por su bajo nivel de domesticación. Se cree que la estructura genética de sus poblaciones es bastante heterogénea debido a que su asincronía floral (Downes y Wold, 1994). favorece el proceso de polinización cruzada. En *J. curcas* se presenta una gran divergencia durante el desarrollo de las fases masculina y femenina en la inflorescencia ya que se libera primero el polen a medida que se manifiesta el crecimiento de los estilos y los estigmas en el gineceo con una menor precocidad en el desarrollo de las papilas estigmáticas. Debido a esta

asincronía en la floración dentro de la inflorescencia, se origina gran una desuniformidad en los ciclos de producción y esto se convierte en una característica que se debe mejorar a la hora de hablar de esta especie como un posible cultivo de explotación comercial (Henning, 2004).

La necesidad de una caracterización primaria y secundaria se justifica entonces no solo por el conocimiento que se genera en la fenología de la especie sino que para propósito de mejoramiento genético es indispensable conocer la biología reproductiva y estructura genética de la especie. De esta manera, se podrá conocer el nivel de variación genética que existe dentro de especie y el potencial que presentan algunos de los materiales de la colección de germoplasma para que sean incorporados en un programa de mejoramiento genético. En ese orden de ideas vale la pena destacar los avances realizados por Brasil (Laviola *et al.*, 2011), la India (Gohil y Pandya, 2008) y Perú (Manco y Pérez, 2009). Colombia por su parte, ha iniciado sus esfuerzos con una caracterización morfofisiológica realizada por la Universidad Nacional de material proveniente del Brasil en el cual se evaluaron siete descriptores cualitativos en las ecoregiones de Vichada y Santander (Pedraza y Cayón, 2010).

El objetivo del presente estudio fue determinar la diversidad genética de la colección de germoplasma de *Jatropha curcas L.* del centro de investigaciones "La Libertad" de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Colección de germoplasma

Entre el año 2007 y 2008, se colectaron 246 accesiones de *Jatropha curcas L.*, en diversas zonas del país (Tabla 1). La colección se encuentra establecida en un lote de 2.5 ha. del Centro de Investigación "La Libertad" de La Corporación

Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, Villavicencio. Cada accesión cuenta con 12 plantas. Para los efectos de este trabajo se muestraron aleatoriamente 3 plantas por accesión.

Tabla 1. Resumen de colecta de accesiones

ZONA DE COLECTA	NÚMERO TOTAL DE ACCESIONES
Casanare	33
Caquetá	1
Guaviare	18
Meta	114
Vichada	35
Atlántico	8
Bolívar	9
Cesar	11
Guajira	13
Córdoba	9
Sucre	5
Antioquia	7
Boyacá	2
Caldas	2
Cundinamarca	2
Huila	1
Tolima	35
TOTAL	305

Fuente: Corpoica, 2009

Localización

La caracterización se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones “La Libertad”, ubicado en Villavicencio sobre la vía a Puerto López a una latitud de 4°03'40,25"N y longitud 73°26'57,82"W. Este sitio se caracteriza por presentar una alta pluviosidad (3000 a 4000 mm/año), humedad relativa superior al 85 %, alta radiación solar, y oxisoles con altos contenidos de arcilla y una saturación de aluminio superior al 70 %.

Caracterización morfológica y evaluación

La tabla 2 muestra los diferentes caracteres usados para la caracterización morfológica. Estos incluyeron tanto características cualitativas como cuantitativas. Las medidas se realizaron sobre el tercio medio de la planta para evitar escapes según los descrito por González y Fita (2001). Se seleccionaron 20

características de tipo cuantitativo y 7 cualitativos para un total de 27 posibles descriptores (Campuzano, 2009) agrupados en componentes de producción, características agronómicas y descriptores de interés específico (EMBRAPA, 2007).

Las particularidades y categorías de algunos descriptores que a continuación se describen se encuentran en la tabla 3. La altura de las plantas se determinó a los 12 meses después de germinadas las semillas y se establecieron cuatro categorías: Porte bajo (< 95 cm), medio (95-170 cm), alto (170 – 260 cm), muy alto (> 260). Con respecto a la tendencia del hábito de crecimiento de las plantas hay que tener en cuenta que debido al crecimiento simpodial las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal. Para este descriptor se tuvo en cuenta la particularidad del crecimiento, ya sea en Monocasio o Dicasio.

Tabla 2. Descriptores botánicos propuestos para *Jatropha (Jatropha curcas L.)*

DESCRIPTORES PROPUESTOS	TIPO DE CARACTERÍSTICA	
	CUANTITATIVA	CUALITATIVA
COMPONENTES DE RENDIMIENTO		
Número de Ramas /planta	*	
Número de Racimos / Rama	*	
Número de Frutos / Racimo	*	
Número de semillas / Fruto	*	
Peso de las Semillas	*	
Porte de la Planta		*
Tendencia del hábito de crecimiento simpodial		*
Longitud de rama foliar no lignificada		*
Disposición de arquitectura en la planta		*
Ángulo de bifurcación		*
Color del Látex		*
CARÁCTERISTICAS AGRONÓMICAS		
Altura de Plantas	*	
Diámetro del Tallo	*	
Proyección de la Copa	*	
Longitud de la Hoja	*	
Anchura de la Hoja	*	
Razón longitud / Anchura de la Hoja	*	
Días a floración	*	
Peso de Frutos	*	
Longitud de Frutos	*	
Anchura de Frutos	*	
Razón Longitud / Anchura de Frutos	*	
Longitud de las Semillas	*	
Anchura de las semillas	*	
Razón Longitud / Anchura de las Semillas	*	
DESCRIPTORES DE INTERÉS ESPECÍFICO		
Uniformidad de Maduración		*

Para la longitud de rama foliar no lignificada, se midieron dos ramas diferentes de la misma planta desde el ápice hasta el punto en que la rama cambia su textura herbácea blanda a una textura más rígida y lignificada (Tabla 3) se establecieron tres categorías: Larga (>50 cm), Mediana (25 y 50 cm) o Corta (< 25 cm). En la disposición de arquitectura de la planta se determinó si la tendencia del crecimiento era de tipo ortotrópico (vertical) o plagiotrópico. El ángulo de

bifurcación se estableció como el ángulo con que se desarrollan las ramas de la planta con respecto al eje principal del cual provienen y se asignó como recto (90°), agudo (15°- 90°) u obtuso (> 90° y < 180°).

El látex de *Jatropha* contiene en promedio un 10 % de pigmentos taninos (Heller 1996) y se clasificó de acuerdo con su apariencia como rojo o blanco ámbar.

La unidad de maduración de los racimos se estableció como el porcentaje de frutos maduros y se midió como alta (>75 %), media (75-25 %) y baja (<25 %).

Los datos se organizaron en una matriz para facilitar el almacenamiento, acceso y recuperación de los mismos. El análisis estadístico de la información se realizó mediante el programa INFOSTAT 2010. Los caracteres evaluados se evaluaron a través de los métodos de componentes principales y de correspondencia múltiple. Estos métodos se fundamentan en la reducción de la dimensionalidad de la estructura original de los datos de tal manera que se facilita la visualización de las interrelaciones

entre accesiones y entre descriptores. El análisis multivariado permitió establecer los caracteres con mayor capacidad discriminatoria y aquellos que lograron explicar la mayor parte de la variación. Se realizó un análisis de correlación entre todas las variables cuantitativas con la finalidad de detectar variables altamente correlacionadas y se establecieron los clusters que agrupaban a las accesiones con mayores similitudes.

Con la matriz de datos establecida se generó un dendograma a través de la técnica de agrupamiento aglomerativo de Ward, empleada comúnmente para conocer correlacionados entre grupos de poblaciones.

Tabla 3. Porcentaje de incidencia interespecífica de caracteres cualitativos

DESCRIPTOR	CUALIDAD	PORCENTAJE DE	
		INCIDENCIA	FRECUENCIA
INTERESPECÍFICA %			
Porte de la Planta	Bajo (< 95 cm)	1,72	4
	Medio (95 -170 cm)	14,22	33
	Alto (170 – 260 cm)	71,98	167
	Muy alto (> 260)	12,08	28
Tendencia del hábito de crecimiento simpodial	Dicasio	72,8	169
	Monocasio	27,2	63
Longitud de rama foliar no significada	(Larga (>50 cm)	5,17	12
	Mediana (25 y 50 cm)	13,8	32
	Corta (< 25 cm)	81,03	188
Disposición de arquitectura en la planta	Plagiotorpica	40,0	93
	Ortotrópica	60,0	139
Ángulo de bifurcación	Recto (90°)	18,1	42
	Agudo (15° - 90°)	50,4	117
	Obtuso (>90° y <180°)	31,5	73
Color del Látex	Rojo	0,43	1
	Blanco Ámbar	99,57	231
Uniformidad de Maduración / Racimo (porcentaje de frutos maduros)	Alta (> 75%)	30,6	71
	Media (75 – 25%)	65,95	153
	Baja (< 25%)	3,45	8

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Base de datos

La base de datos pertenece al grupo de investigación en *J. curcas* liderado por CORPOICA. Esta base contiene toda la información de las accesiones en cuanto a los datos de pasaporte y, los datos de la caracterización morfológica y evaluación agronómica.

Caracteres cualitativos

Los resultados de la caracterización de los caracteres cualitativos se encuentran reportados en la tabla 3. Los descriptores cualitativos propuestos fueron aplicados a cada carácter heredable previamente reportado, expresado morfológicamente por las plantas durante las observaciones en campo. El hábito de crecimiento de las plantas, el desarrollo vegetativo, la posición de la inflorescencia, los rasgos particulares

de la semilla en cada accesión, la longitud de rama foliar no lignificada; la disposición de arquitectura en la planta (Plagiotrópica – Ortotrópica); Ángulo de bifurcación; Color del Látex (Rojo – Blanco Ámbar); y la Uniformidad de Maduración / Racimo mostraron variaciones que permiten suponer que existen la suficiente variación genética dentro de la colección para establecer un programa de mejoramiento de dichas características.

Caracteres cuantitativos

Los resultados permitieron agrupar las 232 accesiones entre 18 grupos diferentes (tabla 8). Los valores propios de la matriz de correlaciones permiten establecer que 10 de los 20 descriptores aplicados logran explicar el 78,25 % de la variación (Tabla 4).

Tabla 4. Valores propios de la matriz de correlación

VALORES PROPIOS DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN

	Valor propio	Diferencia	Proporción	Acumulado
1	2,99440352	0,76055	0,1497	0,1497
2	2,23385348	0,2391375	0,1117	0,2614
3	1,99471601	0,2137604	0,0997	0,3611
4	1,78095563	0,4085034	0,089	0,4502
5	1,37245228	0,1705454	0,0686	0,5188
6	1,20190685	0,0856365	0,0601	0,5789
7	1,11627038	0,004971	0,0558	0,6347
8	1,11129935	0,1763765	0,0556	0,6903
9	0,93492284	0,0260102	0,0467	0,737
10	0,90891264	0,0627099	0,0454	0,7825
11	0,84620279	0,0706241	0,0423	0,8248
12	0,77557866	0,0265562	0,0388	0,8636
13	0,74902251	0,0453815	0,0375	0,901
14	0,70364103	0,2028513	0,0352	0,9362
15	0,50078977	0,1006928	0,025	0,9612
16	0,40009695	0,0993405	0,02	0,9813
17	0,30075643	0,2323001	0,015	0,9963
18	0,06845636	0,0633482	0,0034	0,9997
19	0,00510816	0,0044538	0,0003	1,000
20	0,00065438		0,0000	1,000

La identificación de estos caracteres permite entonces reducir el número de descriptores con alto valor discriminatorio para caracterizar en el futuro los materiales con alto un alto potencial para la producción de biodiesel. De acuerdo con sus valores propios, las características de mayor interés son: la longitud de la semilla, el ancho de la semilla, la relación largo y ancho de la semilla, número de semillas por fruto, peso de las semillas, número de frutos por racimo, número de ramas por planta, Enfocarse en estas

características permitirá reducir los costos a la hora de caracterizar los materiales.

Al organizar las accesiones en grupos según el poder discriminatorio de los caracteres heredables, se aplicaron estadísticos simples como la varianza y la relación de medias con el fin de conocer el rango de variación superior o inferior de los datos con respecto a la media aritmética para cada variable cuantitativa (Tabla 5).

Tabla 5. Estadísticos simples aplicados en variables cuantitativas a todas las accesiones

VARIABLES CUANTITATIVAS	MEDIA	ESTANDAR	DESVIACIÓN	LÍMITE	LÍMITE
			MÁXIMO	MÍNIMO	
Altura de Planta (cm)	205,225	49,762	99	344	
Diámetro del Tallo (cm)	7,157	1,199	44	111	
Proyección de la Copa (cm)	176,395	57,436	71	287	
Longitud de la 8a Hoja (cm)	13,900	2,548	8,6	18	
Ancho de la 8a Hoja (cm)	13,131	2,33	9,6	18	
Relación Largo /Ancho de la hoja	1,083	0,253	0,7	1,5	
Días a Floración	359,807	30,663	299,7	454	
Peso del Fruto (g)	7,828	2,066	4,6	13	
Longitud del Fruto (cm)	3,002	0,361	2,4	3,5	
Ancho del Fruto (cm)	2,754	0,441	1,6	3,4	
Relación Largo / Ancho del Fruto	1,105	0,139	0,9	2	
Longitud de la Semilla (cm)	1,795	0,045	1,4	1,8	
Ancho de la Semilla (cm)	0,900	0,007	0,8	0,9	
Relación Largo / Ancho de la Semilla	1,995	0,054	1,6	2,1	
Uniformidad de Maduración (%)	66,708	16,574	20,8	90,66	
Nº Ramas / Planta	3,446	0,807	1,6	5,8	
Nº Racimos / Rama	2,016	0,605	0,6	3	
Nº Frutos / Racimo	4,468	1,758	1,2	8	
Nº Semillas / Fruto	2,989	0,061	2	3	
Peso Semillas (g)	1,243	0,128	0,6	1,5	

Dentro de cada grupo en que se han clasificado las diferentes accesiones, se hizo una jerarquización según la cercanía de caracteres fenotípicos correlacionados entre sí, con lo cual se pueden estimar de manera comparativa en cada uno de los 18 grupos las accesiones con caracteres fenotípicos más incipientes, con base en la clasificación y selección de atributos obtenidos por conglomerados de Ward. Se encontró que el grupo de accesiones con mayor altura de plantas es el grupo 11, procedentes de Sucre, Córdoba, Cesar, Región Andina y Meta; cuyo promedio de altura es de 2,76 m, dentro de un rango que oscila entre 2,35 y 3,16 m a los 18 meses de edad (Tabla 6). En contraste con otros estudios realizados en condiciones del trópico húmedo de Brasil, se han encontrado grupos de accesiones en que la mayor altura es de 1.87 m al año después del trasplante (Laviola, et. al, 2011), en India, de los cinco clúster en que se agruparon las accesiones según sus características más afines la mayor altura se expresa en materiales con 1,53 m en plantas de un año después del trasplante, por lo tanto, hay que tener en cuenta que el porte de las plantas provenientes de la zona norte de Colombia son de mayor porte en comparación a las demás regiones del país e incluso las de India.

El mayor diámetro de tallo se observó entre las accesiones seleccionadas en el grupo 7, procedentes de zonas como la Guajira, Atlántico, Córdoba, Bolívar y sucre, excepto algunas procedentes de Vichada y Casanare con 84,5 mm, en promedio dentro de un rango de 78,4 mm y 90,7 mm a los 18 meses (Tabla 6). Dicho atributo en otras regiones como India presentan 13,57 cm de diámetro al año después del trasplante. La proyección de la copa con mayor cobertura la poseen las accesiones del grupo 12, provenientes de zonas del país como Córdoba, Sucre, Meta, Vichada y Antioquia, en las cuales el promedio fue 244 cm, dentro de un rango de variación que va desde 200 cm hasta 287 cm (Tabla 6). Con esta característica el contraste de los materiales de una y otra región dentro de Colombia presentan una mayor incidencia de crecimiento Plagiotrópico, muy semejante a lo reportado por los materiales caracterizados en Brasil donde la cobertura de la copa en plantas de un año alcanzan 197,5 cm, mientras que en India presentan una mayor proyección de

hasta 410 cm a los 16 meses luego del trasplante, siendo de vital importancia para designar distancias de siembra. En dicho grupo 12 la octava hoja presenta las mayores dimensiones con respecto a las demás accesiones, cuyo promedio de longitud oscila entre 15,22 cm y 17,88 cm, con 16,55 cm en promedio, mientras el ancho se estima en 16,68 cm, dentro de un rango de 16,09 cm y 17,27 cm. Por lo tanto la relación largo / ancho tiende a ser la más uniforme de los grupos obtenidos, cuyo índice es de 1,0 con una variación que va de 0,93 hasta 1,07 cm.

En cuanto a los días a floración las accesiones con mayor precocidad pertenecen al grupo 3, procedentes de Sucre, Meta, Guaviare, Casanare y Antioquia, las cuales en promedio a los 333 días contados desde su siembra en vivero empiezan a florecer después de germinar la semilla, dicho dato puede variar pues algunas emergieron entre 300 y 366 días (Tabla 6). Las accesiones menos precoces corresponden al grupo 1, provenientes de Antioquia y Meta, las cuales florecen 464 días después de germinar la semilla y su rango de variación está entre 438 y 490 días. Este dato contrasta con los materiales de menor precocidad reportados por Laviola en Brasil, de los cuales la juventud se estima en 206 días en promedio contados después del trasplante, debido a la arquitectura de dichos materiales y la distribución de las yemas florales en mayor número por rama, pero con menor tamaño de frutos y semillas con respecto a las accesiones colombianas.

El mayor peso de fruto se obtuvo entre las accesiones asociadas al grupo 9, procedentes de Cesar, Casanare, Vichada y Meta, con un peso promedio de cada fruto estimado en 11,97 g, dentro de un rango de variación de 10,9 g a 13 g (Tabla 6). En cuanto a las dimensiones del fruto la mayor longitud se presenta en el grupo 9 con 3,27 cm en promedio, dentro de un rango de 3,1 a 3,4 cm. El ancho de cada fruto en promedio es mayor en el grupo 3 con 3,15 cm, oscilando entre 3 y 3,3 cm. La mayor uniformidad de los frutos los presenta el grupo 8, compuesto por accesiones provenientes de Meta, Vichada, Casanare y Centroamérica, con un índice de uniformidad de 1,01, con una leve variación que se mantiene en el rango de 0,9 y 1,06 (Tabla 6). La longitud de la semilla en las accesiones del grupo 14 es mayor con respecto a los demás

Tabla 6. Procedencia de las accesiones de cada grupo con características significativas

GRUPO	ACCESIÓN	PROCEDENCIA	CARACTÉRISTICA	RANGO MÍNIMO MÁXIMO		
				MÉDIO	ÚLTIMO	ÚLTIMO
1	3,6,17,18,19,21,46,47,55,59,60,168. 138,137. 142 126,191,192,196,198.	META ANTIOQUIA REGIÓN ANDINA VICHADA GUAVIARE	> DIAS A FLORACIÓN	464,3	438,4	490,2
3	99 75 86,94,121,127,140,170,183. 97,167,199. 81,98 76 10,25,28,38,40,44,56,66,69,77,86.	SUCRE META CASANARE GUAVIARE BOLÍVAR META	ANCHO DE FRUTO (cms)	3,1518	3,0262	3,2778
4	67,217. 68 70,74 88,202,209,212. 208 29,53,54,64,107,108,116,135,155,165,223,225.	CASANARE CESAR REGIÓN ANDINA VICHADA SUCRE META CASANARE GUAVIARE	PESO DE SEMILLA (gns)	1,2839	1,2615	1,3063
5	139 146 157 158,159,179,226 180 106 110,113 123,187	SUCRE GUAVIARE Y ATLÁNTIC CESAR VICHADA ANTIOQUIA GUAVIARE Y ATLÁNTIC SUCRE BOLÍVAR	UNIFORMIDAD DE MADURACIÓN	85,01	81,07	88,96
7	129 148 149,177,181 163 175,188 23,26,30,31,32,33,35,39,41,49,51,65,71,73,80.	META GUAVIARE CASANARE CORDOBA VICHADA META	DIÁMETRO DE TALLO (mm)	84,54	78,42	90,66
8	72,102,114 87 174 105,213 131	CASANARE EXTRANJERAS VICHADA META CESAR	LARGO/ANCHO DE FRUTO	1,01	0,96	1,06
9	134,141,150,161,162 151,152,214,215 176 62 63,185,216 85,102,115,173	CASANARE VICHADA BOLÍVAR REGIÓN ANDINA CORDOBA META	LONGITUD DE FRUTO (cms)	3,274	3,128	3,42
11	120 122 124 172 210 61,22 93	CESAR CASANARE GUAVIARE Y ATLÁNTIC VICHADA SUCRE CORDOBA VICHADA	ALTURA DE PLANTA (cms)	275,64	235,45	315,84
12	126,203 193 201 221 52,119	META ANTIOQUIA CORDOBA SUCRE META	PROYECCIÓN DE COPA (cms)	243,75	200,44	287,06
13	164 171 178 15,43,45,143,166	GUAVIARE Y ATLÁNTIC VICHADA CASANARE META	LONGITUD DE HOJA (cms)	16,55	15,22	17,88
14	92 133 242 27	ANTIOQUIA CORDOBA SUCRE META	ANCHO DE HOJA (cms)	16,68	16,09	17,27
16	91 147 241	GUAVIARE REGIÓN ANDINA EXTRANJERAS	LARGO/ANCHO DE HOJA	1,001	0,931	1,072
17	94,48,57,58,101,153	META	NÚMERO DE RAMAS/PLANTA	4,6	3,9	5,3
			LONGITUD DE SEMILLA (cms)	1,8167	1,7772	1,8561
			ANCHO DE SEMILLA (cms)	0,93	±	±
			LARGO/ANCHO DE SEMILLA	1,72	1,59	1,85

grupos, con un promedio de 1,82 cm, encontrándose semillas con una longitud desde 1,78 hasta 1,86 cm, la procedencia de dicho grupo es de la región Andina, Meta y Centroamérica. El ancho de la semilla es mayor en aquellas accesiones pertenecientes al grupo 16, procedentes de la región Andina, Meta y Centroamérica con 0,93 cm en promedio, sin presentar variación alguna. La dimensiones largo / ancho tienden a manifestarse de manera más uniforme en el grupo 17, provenientes del Meta con un índice de uniformidad de 1,72, variando entre 1,59 y 1,85. La uniformidad de maduración es mayor en las accesiones del grupo 5 con el 85 % de uniformidad entre los frutos de cada racimo, oscilando entre 81,0 % y 88,96 %, cuyas entradas proceden de Sucre, Antioquia, Meta, Vichada y Casanare. Este carácter en las accesiones caracterizadas en Colombia presenta un menor tamaño en relación con los reportados en las accesiones colectadas y establecidas en Perú (Manco y Pérez, et. al, 2009), los cuales llegan a medir 1,94 cm de largo y 1,18 cm de ancho, con un índice de uniformidad de 1,63.

El mayor número de ramas por planta se encontró en las accesiones del grupo 13, procedente de Guajira, Atlántico, Meta, Casanare y Vichada, con 4,6 ramas en promedio oscilando entre 4 a 5 ramas por planta. El mayor racimo de frutos por rama se halló entre las accesiones del grupo 8, procedente de Casanare, Meta y Vichada en el cual el promedio fue de 3 racimos. En cuanto al número de frutos por racimo en el grupo 4, procedente de Casanare, Meta, Vichada y Guaviare se encontró el mayor promedio, el cual es de 7 frutos, con semillas que en promedio pesan 1,31 g, dentro de un rango de 1,24 g y 1,38 g.

En el estudio de las características morfológicas y agronómicas cuantitativas se presentan los promedios estimados a nivel general para todas las accesiones, con lo cual se encontró que las accesiones midieron en promedio 205,22 cm al aplicar el descriptor Altura de Planta (**AP**). Al comparar dicho promedio entre las accesiones colectadas en Colombia, aquellas que proceden de zonas como Córdoba, la Región Andina, Vichada

y Casanare presentan los niveles máximos de crecimiento en altura, las cuales poseen un porte muy alto, superior a 260 cm de longitud, mientras que las plantas de las accesiones que se encuentran por debajo del promedio proceden con mayor incidencia de Centro América. El Diámetro de Tallo (**DT**), entre las distintas accesiones evaluadas presenta en promedio de 7,16 cm con una desviación estándar poco significativa de $\pm 1,2$ cm, así mismo es evidente la gran diversidad de plantas con proyección de copa diferentes, que con respecto al promedio (176,395 cm), los datos colectados tienden a estar $\pm 57,436$ cm respecto al promedio, lo cual es evidente al incidir en la tendencia del crecimiento simpodial ya sea dicotómico en Monocasio o en dicasio, debido a su arquitectura Plagiotorpica, para algunas accesiones y Ortotorpica para otras. En cuanto a los descriptores longitud y ancho de la octava hoja después de la inflorescencia, se encontraron promedios poco diferenciables para la gran mayoría de accesiones; con 13,9 cm, y 13,131 cm correspondientemente, con lo cual, se obtuvo un índice de relación entre el largo y ancho de la hoja de 1,1, lo que permite tener una percepción de las hojas con tendencia a ser más largas que anchas, con un área laminar siempre dispuesta a capturar la presencia de luz gracias a su ubicación helicoidal siempre hacia el extremo de las ramas, haciéndose más escasa la presencia de hojas después de la octava hoja, ya que cuando las hojas alcanzan dicha posición en las ramas, las hojas presentan su mayor área láminar adquirida durante su crecimiento (Tabla 5).

Los días a floración de manera general en las accesiones evaluadas se estima en un periodo cercano al año, ya que en promedio las plantas florecen por primera vez 360 días después de germinar la semilla, con una desviación estándar que manifiesta la tendencia a seguir produciendo las primeras inflorescencias 31 días antes o después. El peso del fruto para todas las accesiones evaluadas se promedia en 7,828 g, con $\pm 2,066$ g de desviación, lo que indica la gran diversidad del peso del fruto entre todas las accesiones. Mientras que el índice de uniformidad del fruto, estimado mediante la relación largo y

ancho, se promedia en 1,1, lo cual indica la tendencia a encontrar entre las accesiones frutos más largos que anchos, los cuales, en promedio tienen 3,00 cm de longitud y 2,754 cm de ancho. El índice de uniformidad de las semillas se estima en promedio en 2 tendiendo a una forma elíptica con un promedio de 1,975 cm a lo largo y 0,9 cm de ancho, $\pm 0,054$ cm, esta es una característica poco variable entre las accesiones. La uniformidad de maduración es un descriptor cualitativo que se ha estimado como cuantitativo, al tener en cuenta la incidencia de frutos fisiológicamente maduros respecto a los frutos verdes en el mismo racimo, al ser evaluados en porcentajes de incidencia, de lo cual se encontró que en promedio el 66,72%, de los frutos por racimo entre las accesiones tienden a estar maduros, mientras que el 33,29% de los frutos restantes, suelen encontrarse en estados fisiológicamente inmaduros. Dicho descriptor de uniformidad de maduración fue tomado tres meses después de contar el número de racimos de flores por rama, aplicado a plantas que presentaban inflorescencias en aquel momento entre 12 y 18 meses después de germinadas las semillas. Las 232 accesiones evaluadas poseen en promedio 3,5 ramas principales por planta según el descriptor número de ramas por planta, dicho dato varía $\pm 0,8$ ramas con respecto al promedio según la accesión evaluada. El número de racimos contados por rama, se estima en un promedio de 2,02 racimos en cada rama de las plantas, $\pm 0,6$ racimos respecto al promedio. De dichos racimos se ha estimado un promedio de 4,5 frutos bien formados por racimo, con tendencia a presentar ± 2 frutos. El número de semillas por fruto, entre las accesiones es de 2,99 semillas por fruto, este dato puede variar en $\pm 0,06$ semillas, ya que la tendencia de cada planta a producir 3 semillas dentro de sus frutos es casi constante, pero puede presentarse una probabilidad muy pequeña de obtener frutos con dos semillas, e incluso cuatro, dichos caracteres aunque se han manifestado en los frutos colectados de algunas accesiones, no descartan la posibilidad de ser un fenómeno inducido por el ambiente de colecta.

En Colombia a partir de los 18 clusters jerarquizados, se acudió al diseño y elaboración

de un dendograma, realizado con base en el cálculo de la media de todas las variables aplicadas a cada grupo o “cluster”. Los clusters que se formaron fueron aquellos que obtuvieron el menor incremento en la suma de las distancias al cuadrado dentro de cada grupo. Teniendo en cuenta que la distancia euclídea al cuadrado depende de la medición de cada variable y el dato promedio obtenido en la aplicación de cada descriptor, con dicho cálculo se buscó estandarizar los datos con el fin de evitar que las variables tuvieran valores muy distintos a los reales en el cálculo de la distancia estimadas por el coeficiente de Nei y Li (Nei y Li, 1979). Se obtuvo el coeficiente de correlación cofenética, el cual permitió medir la correlación entre las interdistancias gráficas en el dendograma, siguiendo las características fenotípicas de cada accesión dentro de una matriz de distancias Euclídeas expresadas por el Coeficiente de Dice, las cuales evidencian que tan cercanos se encuentran los caracteres genéticos con respecto a la matriz de correlación, al presentarse mayor o menor variabilidad de estos entre las accesiones, lo cual contribuye a su expresión en el fenotipo valorado mediante los 20 descriptores cuantitativos (Figura 1). En contraste con otros estudios similares se reporta que en Brasil la caracterización de los 175 materiales estudiados, presentan una diferencia significativa del 5% de probabilidad entre accesiones para tomar las variables validadas, un coeficiente de variación de 72,3% y una heredabilidad del 27,16%, menor a la estimada en la colección colombiana de CORPOICA.

Matriz de correlación entre descriptores cuantitativos

Se observó según el comportamiento de los datos, que existe un incremento directamente proporcional con respecto a la proyección de la copa, el diámetro de tallo, largo y ancho de la octava hoja y el peso del fruto con respecto a la altura de la planta. El diámetro del tallo tiende a incrementarse de manera directamente proporcional según la altura de la planta, la proyección de la copa, el número de ramas por

planta, el número de racimos por planta y la uniformidad de maduración. Con los resultados se observó la correlación inversa de los días a floración con respecto las alturas de las plantas. La proyección de la copa tiende a incrementarse proporcionalmente de acuerdo a variables como la altura de la planta, el diámetro del tallo, la longitud y el ancho de la octava hoja, así mismo se ha encontrado directamente correlacionada con las dimensiones de los frutos, el peso de los frutos, el número de las semillas y el peso de las mismas. Sin

embargo, se observa que los días a floración tienen una correlación inversa con respecto a la proyección de la copa. La longitud de la octava hoja, tiende a incrementarse de manera directamente proporcional con la altura de la planta, proyección de la copa, ancho de la octava hoja, el peso y las dimensiones del fruto. Al analizar los datos se observó entre los datos que al incrementar la medida del diámetro de los tallos en las accesiones la longitud de la octava hoja tiende a disminuir.




Figura 1. Grupos de accesiones jerarquizadas con base en el estudio de componentes principales al estimar las distancias Euclidianas, las cuales son explicadas con un 84 % de disimilaridad entre el total de los grupos

El ancho de la octava hoja aumenta, con el ancho del fruto y los días a floración de manera generalizada entre todas las accesiones. No obstante la relación largo / ancho de la hoja se ve correlacionado directamente con características como dimensiones del fruto y número de frutos por racimo (Tabla 7).

Con respecto a los resultados de correlación del peso del fruto, se encontró que este dato se incrementa en la medida en que se presentan accesiones con plantas de mayor altura, mayor proyección de copa, longitud de la octava hoja y ancho del fruto. Por otro lado, la longitud del fruto presentaba datos cada vez mayores al encontrar accesiones donde tienden a incrementarse la proyección de la copa, la longitud de la octava hoja, el ancho del fruto y el peso de la semilla.

Tabla 7. Matriz de correlación entre los descriptores cuantitativos aplicados

MATRIZ DE CORRELACION ENTRE CARACTERES CUALITATIVOS											
DESCRIPCIÓN	ALTIURA DE PLANTA	DIMÉTRO DEL TALLO	PROTECCIÓN DE LA COPA	LARGO DE LA COPA	LARGO DE LA HOJA	LARGO ANCHO DEL HOJA	LARGO FRUITO				
ALTIURA DE PLANTA	1,0000	0,692	0,6019	0,1465	0,692	0,136	-0,213	0,4452	0,952	-0,666	0,139
DIMÉTRO DEL TALLO	0,4892	1,0000	0,281	-0,1023	0,0302	-0,123	-0,22	0,057	-0,073	-0,125	-0,032
PROTECCIÓN DE LA COPA	0,6619	0,2981	1,0000	0,3784	0,2246	-0,1559	0,177	0,068	0,27	-0,461	-0,039
LARGO DE LA HOJA	0,1446	0,1083	0,3734	1,0000	0,3188	0,1411	-0,114	0,1285	0,167	-0,076	-0,033
LARGO ANCHO DEL HOJA	0,2245	0,1302	0,2245	0,0001	1,0000	0,4021	0,46	0,0472	0,5441	-0,1472	-0,027
LARGO FRUITO	0,1253	0,1253	0,1253	0,021	0,4411	-0,137	0,658	0,186	0,133	-0,167	0,021
ANCHO FRUITO	0,1159	0,1159	0,1159	0,140	0,146	-0,157	1,0000	0,222	0,185	-0,116	0,067
PROFUNDIDAD FRUITO	0,1483	0,172	0,122	0,0472	0,453	-0,0322	0,0001	0,32	0,166	-0,0372	0,034
LARGO FRUITO	0,078	0,0723	0,0708	0,1656	0,1435	0,0818	0,1000	0,748	-0,276	0,1116	0,0322
ANCHO FRUITO	0,062	0,0697	0,0697	0,145	0,2441	0,1506	0,1193	0,194	0,0001	0,0561	0,045
LARGO FRUITO	0,174	0,1627	0,1627	0,2076	0,1472	0,0687	0,067	0,929	-0,276	-0,4593	-0,0812
ANCHO FRUITO	0,0759	0,0724	0,0724	0,0816	0,0727	0,1221	0,0685	-0,372	-0,1116	0,065	-0,0233
PROFUNDIDAD FRUITO	0,0638	0,0632	0,0632	0,0843	0,0633	0,063	0,063	0,032	0,047	-0,463	-0,0235
ANCHO DE LA SEMILLA	0,0654	0,0628	0,0628	0,174	0,0627	0,0233	0,0622	0,036	-0,045	0,0233	-0,0237
NÚMERO DE SEMILLAS	0,0716	0,0714	0,0714	0,0622	0,0622	0,0622	0,0622	0,0622	0,0622	0,0622	0,0622
PLANTA	0,0641	0,0622	0,0622	0,0627	0,0625	0,0624	0,0624	0,0624	0,0624	0,0624	0,0624
NÚMERO DE SEMILLAS	0,0645	0,1518	0,1518	0,2114	-0,234	0,0615	0,0615	-0,037	-0,16	0,0453	0,0367
PROFUNDIDAD DE LA SEMILLA	0,056	0,0611	0,0611	0,1263	-0,234	0,0615	0,0615	-0,037	-0,16	0,0453	0,0367
NÚMERO DE FRUITOS POR RACIMO	0,0616	0,0611	0,0611	0,1263	-0,234	0,0615	0,0615	-0,037	-0,16	0,0453	0,0367
NÚMERO DE SEMILLAS POR FRUITO	0,0592	0,0592	0,0592	0,1212	-0,234	0,0615	0,0615	-0,037	-0,16	0,0453	0,0367

Tabla 8. Número total de accesiones agrupadas en cada clúster

GRUPO	ACCESIONES	Nº TOTAL DE ACCESIONES	COLOR EN DENDROGRAMA
1	3, 6, 17, 18, 19, 21, 46, 47, 55, 59, 60, 137, 138, 168.	14	
2	81, 83, 84, 89, 100, 103, 117, 136, 144, 154, 182, 184, 189, 190, 194, 204, 211, 218, 219, 222, 224, 240.	22	
3	75, 86, 94, 97, 99, 121, 126, 127, 140, 142, 167, 170, 183, 191, 192, 196, 198, 199.	18	
4	10, 25, 28, 38, 40, 44, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 81, 86, 88, 98, 202, 209, 217, 208, 212.	15	
5	29, 53, 54, 64, 107, 108, 109, 116, 125, 135, 139, 145, 146, 155, 157, 158, 159, 165, 179, 180, 223, 225, 226.	23	
6	7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 36, 37, 42, 50, 111, 118, 2.	17	
7	106, 110, 113, 123, 129, 148, 149, 163, 175, 177, 181, 187, 188.	13	
8	23, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 49, 51, 65, 71, 72, 73, 80, 87, 112, 114, 174.	20	
9	105, 131, 134, 141, 150, 151, 152, 161, 162, 176, 213, 214, 215.	13	
10	104, 130, 132, 160, 169, 195, 230, 234, 235, 238, 243, 244, 245.	13	
11	62, 63, 85, 102, 115, 120, 122, 124, 172, 173, 185, 210, 216.	13	
12	61, 93, 128, 193, 201, 203, 220, 221.	8	
13	52, 119, 164, 171, 178	5	
14	15, 43, 45, 92, 133, 143, 166, 242.	8	
15	1, 20, 186, 227.	4	
16	27, 91, 147, 241.	4	
17	94, 48, 57, 58, 101, 153.	6	
18	197	1	

Los resultados obtenidos con respecto a la uniformidad de maduración revelan que al ser mayor el diámetro del tallo y número de semillas por fruto, la uniformidad de los frutos en cada racimo es mayor. Además, el número de frutos por racimo tiende a un aumento proporcional según el número de racimos por planta. La caracterización muestra que el peso de cada semilla tiende a aumentar de manera directamente proporcional el ancho y largo del fruto (Tabla 7).

Sumado a los resultados obtenidos, se proponen descriptores para estimar su poder discriminatorio

al evaluar la incidencia de protandria entre accesiones como fenómeno reproductivo en la inflorescencia de *Jatropha curcas* L., debido a que las flores hermafroditas presentan asincronía floral durante el desarrollo de las fases masculina y femenina, ya que se libera primero el polen a medida que se manifiesta el crecimiento del Gineceo en los estilos y los estigmas, desarrollándose con menor precocidad las papilas estigmáticas. Se recomienda tomar los datos del conteo realizado al número de granos de polen adheridos, tanto al estilo como al estigma, el número de granos de polen germinados y el número

de tubos polínicos que han aumentado su tamaño en longitud, haciéndose observable este fenómeno con el aumento de la longitud del estilo. No obstante, se ha observado que al valorar la incidencia de polinizadores incrementa la viabilidad reproductiva de la especie, sin embargo esto provoca una reducción en el número de flores que llegan a convertirse en frutos, ya que en promedio por cada 12 flores que se producen por umbela en el racimo se forman entre 6 y 8 frutos aproximadamente. Aunque el polen se conserva por un periodo corto en las anteras, una vez el androceo ha llegado a su etapa dehiscente los estigmas de la flor se hacen receptivos, presentando muy poca probabilidad de autopolinizaciones ya que la flor hermafrodita está iniciando la fase femenina (Bertín, 1993).

Las flores de *Jatropha* presentan 10 estambres, los cuales se hacen visibles con ayuda de una lupa, estos se hacen evidentes una vez la flor hermafrodita acaba de abrir, en un comienzo los estambres se elongan separando sus anteras mediante la dehiscencia longitudinal. En dicho momento el gineceo presenta

los estilos de un tamaño muy pequeño, lentamente los estilos van creciendo, mientras que el resto de los estambres maduran y liberan el polen. Una vez se ha producido la senescencia de las anteras, los estilos alcanzan su tamaño ideal y con las papilas ya desarrolladas. En dicho acto es necesario tomar una lupa para observar detalladamente la presencia de papilas ya desarrolladas. A lo largo del estilo se observan papilas a las cuales se les adhieren los granos de polen cuando ya están desarrolladas. Por lo tanto, es necesario conocer la longitud del estilo para analizar la longitud adecuada para la adhesión de los granos de polen y de igual manera conocer la presencia de tubos polínicos ya fecundados acudiendo al método de epifluorescencia (Kearns y Inouye, 1993). Con dichos descriptores se busca encontrar si existe realmente protandria en la accesión a estudiar, realizando el análisis previo a la receptividad del estigma, así como a la incidencia del polen en el estigma, y el periodo en que se hace posible la autogamia espontánea, aun conociendo que en la especie predomina la alogamia como método de multiplicación natural.

CONCLUSIONES

Se determinaron 18 grupos fenotípicos diferentes entre 232 accesiones para 20 características cuantitativas. Las características morfológicas con mayor poder discriminatorio fueron aquellas relacionadas con la disposición arquitectónica de la planta y mayor variabilidad en los grupos fenotípicos 2, 4, 5, 6, 7 y 12, lo que manifiesta la diversidad genética estimada con 24 descriptores con buen poder discriminatorio de los 26 aplicados durante la caracterización primaria (morfológica) y la evaluación caracterización secundaria. Al identificar los caracteres morfológicos con mayor poder discriminatorio para establecer diferencias entre las accesiones, se encontró que entre las características cuantitativas evaluadas, la mayor variabilidad para los caracteres con valores propios que explican el 78,25 % de la variación genética para 10 características en relación con 20 características propiamente morfológicas concernientes a los descriptores agronómicos, componentes de rendimiento y uniformidad de maduración como descriptor de interés específico; ya que la incidencia de caracteres dentro de las descriptores manifestaron polimorfismos expresados

en el fenotipo de las plantas entre accesiones con sólo el 50 % del total de las características evaluadas.

Para concluir las apreciaciones obtenidas acerca de las características expresadas en las flores de la planta de Piñón (*Jatropha curcas* L.), se ha manifestado divergencia durante el desarrollo de las fases masculina y femenina de cada inflorescencia en una misma cohorte, al realizar reiterativamente observaciones en campo y aplicar los descriptores concernientes a los componentes de rendimiento, ya que se libera primero el polen de las flores masculinas en la medida en que se manifiesta el crecimiento del Gineceo y la maduración de los estilos y los estigmas, desarrollándose con menor precocidad las papilas estigmáticas. Es necesario tener en cuenta para posteriores estudios basados en la reproducción de la especie los descriptores propuestos en el presente trabajo para estimar la incidencia de la asincronía floral.

Por último, se debe prever que al ser *Jatropha curcas* L. una especie poco domesticada con polinización

cruzada, su estructura genética es bastante heterogénea y se puede suponer que muchos de sus genes se encuentran en condición de heterocigosis. Desde esta perspectiva, se requieren estudios que permitan establecer el efecto deletéreo que la homocigosis de algunos de sus loci pueda causar al obtener líneas endogámicas. La obtención

de líneas endocriadas es absolutamente necesaria en programas de mejoramiento tradicional para formar un banco de progenitores a partir del cual se puedan obtener generaciones segregantes que exploten la variación genética de la colección sobre la cual realizar procesos de selección que permitan desarrollar óptimamente el potencial de esta especie para la producción de biodiesel.

REFERENCIAS

- Adolf W, Opferkuch HJ, Hecker E. Irritant phorbol derivatives from 4 *Jatropha* species. *Phytochemistry* 1984; 23 (1): 129- 132.
- Bertin RI. Incidence of monoecy and dichogamy in relation to self-fertilization in angiosperms. *American Journal of Botany* 1993; 80: 537-560.
- Campuzano LF. Perspectivas de la investigación de *Jatropha curcas* L. en Colombia PARTE I: Componente Genético. *Revista Facultad Nacional de Agronomía*, Medellín. 2009; 62 (3): 51-63.
- Consejo Agropecuario del Sur (CAS). 2009. Red de Coordinación de políticas Agropecuarias (REDPA). Grupo de trabajo sobre Políticas públicas en Agroenergía – GT 6: p. 15- 18.
- Downes RD y Wold C. Biodiversity prospecting rules of the game. *BioScience*. 1994; 44(2): 95-98.
- Fox JL. Biodiversity promises great prospecting. *Bio / Technology*. 1995; 13(6):544-545.
- Gohil RH, Pandya JB. Genetic Diversity Assessment in physic nut (*Jatropha curcas* L.). Central Salt and Chemical Research Institute (SCRI). *Journal Bhavnagar India*. 2008; 2(4): 321-326.
- González F, Fita JM. 2001. Conservación y caracterización de recursos fitogenéticos. Madrid: INIA, 279 p.
- Guerrero JA. 2010. Tesis "Caracterización Morfológica y Agronómica de la Colección Nacional de Germoplasma del Piñón (*Jatropha curcas* L.), de Corpoica-La Libertad. Universidad de los Llanos (Unillanos). Villavicencio, Colombia. 150 p.
- Heller, J. 1996. Physic nut; *Jatropha curcas* L. IPGRI IPK Italy Germany © International Plant Genetic Resources Institute, p. 24-29.
- Kearns CA, Inouye DW. 1993. Techniques for pollination biologists, University Press of Colorado, Niwot, Colorado. 80544, U.S.A, p.112- 115.
- Laviola, G. Bruno, Bhering, L. Leonardo, Mendoncal Simone, Rosado, B. Tatiana y Albrecht, Julio Cesar. Caracterização Morfo-Agronômica do Banco de Germoplasma de Pinhão Manso na Fase Jovem. EMBRAPA. *Biosci J Uberlândia*. 2011; 27 (3): 371-379.
- Manco E, Pérez D. 2009. Implementación de un Banco de Germoplasma de ecotipos de Piñón en Perú. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Innovación Agraria. San Martín, Perú. 46 p.
- Martin G, Mayeux A. Reflexiones sobre cultivos oleaginosos energéticos. "Il Piñón de la India (*Jatropha curcas* L.). Un carburante posible". *Oleagineux*. 1984; 39 (5): 283-287.
- Mishra D. Selection of candidate plus phenotypes of *Jatropha curcas* L. using method of paired comparisons. *Biomass and Bioenergy* 2009; 33: 542-545.
- Nei M, Li WH. 1979. Mathematical model for studying genetic. Variation in terms of restriction endonucleases. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 76(10): 5269-5273.
- Panigrahi S, Francis BJ, Cano LA, Burbage MB. Toxicity of *Jatropha curcas* seeds from Mexico to rats and mice. *Nutr Rep Int*. 1984; 29(5):1089-1099.
- Pedraza EA, Cayón DG. Caracterización morfológica de *Jatropha curcas* L. variedad Brasil cultivada en dos zonas de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. *Acta Agronomica*. 2010; 59 (1): 30-36.
- Toral O. *Jatropha curcas* L., una especie arbórea con potencial energético en Cuba. *Pastos y Forrajes*. 2008; 31 (3): 191.